This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

3 2044 106 461 205

FΠ
49.3
G 68
1781



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

FLORA
VII PROVINCIARUM
BELGII FOEDERATI
INDIGENA.

Digitized by Google

IN EFFIGIEM
DAVIDIS GORTERI.

Doctus opes carae miras qui Chloridos auget,
Quemque vocat Phœbus, quemque Hygiea ſuum;
Talis Mentorea GORTERVS cernitur arte,
Naturæ et pandit grande potentis opus.
Donec ab Hoc creſcet ducens GORTERIA famam,
Æmula LINNÆO nomina, Belga, cole.

HENR. JOAN. ARNTZENIVS
ICtus et Anteceſſ. Groning.

IN EANDEM EFFIGIEM.

Haec eſt GORTERI Floram meditantis imago
Indigenam. Hic Batavi Laus adamata ſoli.
Rusſorum Princeps Medicum veneratur amica.
Patria dum merito cingit honore caput.

PETRUS DREUX.

Digitized by Google



DAVID DE GORTER.

A. L. M. Phil. & Med. Doct. antehac in Academia Duc. Gelr. & Com. Zutph. quæ Harderovici est, Med. & Botan. Prof. ord. dein. Auguſtiſſimæ Ruſſorum Imperatricis Archiater. Acad. Cæs. Nat. Cur. Acad. Imper. Scient. Petropol. Acad. Reg. Stockholm. Societ. Reg. Londin. Batavo-Harlem. Zeeland. Rotterod. et Agriculturæ Amſtelod. Membrum.

...ldenbach ad vir. del. C. H. Bohn et Filius excud. J. Houbraken fecit.

Digitized by Google

DAVIDIS DE GORTER,

A. L. M. Phil. & Med. Doct. antehac in Acad. Harderovicena Med. & Botan. Prof. ord. dein Auguſtiſſimæ Ruſſorum IMPERATRICIS *Archiatri; Acad. Caeſ. Nat. Cur. Imper. Scient. Petropol. Reg. Stockholm. Societ. Reg. Londin. Harlem. Roterod. Fleſſing. Agriculturæ Amſtelod. Membri*

FLORA

VII PROVINCIARUM

BELGII FOEDERATI

INDIGENA.

HARLEMI
Apud C. H. BOHN & FILIUM, Bibliopolas,
MDCCLXXXI.

Digitized by Google

Feb. 1911
23624

Digitized by Google

ILLUSTRISSIMO

ET

GENÆROSISSIMO.

DOMINO.

GUILIELMO HENRICO

BARONI

DE ROUWENOORT.

TOPARCHÆ. IN. UILENPAS. ORDINIS. TEUTONICI EQUITI. COADJUTORI. ET. DIERÆ. MAGISTRO. ORDINI EQUESTRI. CO-

† MI-

Digitized by Google

MITATUS. ZUTPHANIÆ. AD-
SCRIPTO. INTRA. ET. EXTRA.
ZUTPHANIAM PRÆTORI. COL-
LEGII PRÆPOTENTIUM. DE-
PUTATORUM. COMITATUS. OR-
DINUM. PRAESIDI. AD. RES.
RHENI. INFERIORIS. ET. YSA-
LÆ. CURANDAS. DELEGATO.
CIVITATIS. DOTECHEMENSIS.
CONSULI. SOCIETATIS. SCIEN-
TIARUM. BATAVO-HARLEMEN-
SIS. DIRECTORI. Cet. Cet. Cet.

Digitized by Google

DEDICATIO.

Septimus & triceſimus volvitur annus, ex quo TU, VIR ILLUSTRISSIME! me haud diu ante in Academia Harderovicena creatum Botanices Profeſſorem invitaſti in Hortum TUUM UILENPASSIANUM. Vidi tunc eum, et deinceps multoties vidi, ſed ſemper ſummo cum oblectamento, ſummaque admiratione; in eo enim tanquam in cultiſſimo Paradiſo, quicquid eximii habet vel hic, vel alter orbis, uno intuitu contemplari licet. Nec parcis adhuc ſumtibus aut induſtriæ, rariores Plantas ex omni terrarum angulo conquirendi; easdemque ita excolis Ipſe, ut in tanto faſtigio vix æmulum reperias. Excepiſti inſuper me per tam longam annorum ſeriem ſingulari ſemper benevolentia & amicitia. Quin et me, dum in Ruſſicis terris degebam, commercio litterario honorare non intermiſiſti. Hæ mihi cauſæ ſunt, VIR ILLUSTRISSIME! quare hunc laboris mei Botanici fructum, cui &

Digitized by Google

DEDICATIO.

TU Ipſe non parum contribuiſti, TU(Nomini inſcribere auſus ſim, hoc ſolo titu lo, ut exſtet, & poſt fata perennet, ob ſervantiæ, debiti honoris, reverentiæ & animi mei in TE grati, monumentum publium: TU vero, MÆCENAS OPTIME! accipias quæſo hoc munuſculum hilari & benigno vultu; TUque, ut adhuc diu in ſalutem Patriæ ſoſpes & incolumis vivas, opto.

ILLUSTRISSIMI TUI
NOMINIS

Zutphaniæ
III Novembris
1781.

cultor humillimus
D. de GORTER.

L. S.

Opuſculum hoc originem ſuam debet Excurſionibus Botanicis, quas Anno 1735 comite Ill. LINNÆO circa Harderovicum feci. Ab Anno 1743, quo mihi Botanices docendæ munus in Academia Harderovicena demandatum fuit, Gelriam latius peragravi, Plantas in ea obvias ſtudioſe annotavi, ſicque Anno 1745 in lucem prodiit *Flora Gelro-Zutphanica*, continens Plantas 604. qui numerus ad 682. increverat Anno 1754. quo ad Aulam Imperialem Ruſſicam ab ELISABETA MAGNA *Glor. mem.* evocatus, Gelriæ valedixi. In Ruſſia degens Catalogum illarum 78. Plantarum, quem penes me in peregrinis terris latere nolebam, in propriam ipſarum Patriam tranſmiſi, ubi Anno 1757. Harderovici, titulo *Appendicis ad Floram Gelro-Zutphanicam* typis divulgatus eſt. Anno 1764 ego in Patriam redux, & apud Batavoduranos dehinc vivens, Diœceſin *Ultrajectinam*, Comitatum Buranum, Cuilenburgenſem, & Leerdamenſem, aliaque loca vicina, Plantas indigenas inveſtigandi præſertim cauſſa, inviſi.

Ex

Digitized by Google

Ex Plantis illic, et aliis antea in Gelria alibiqu me lectis, tum ex C. Peleterii *Synonymia Pl tarum Valachriæ*, H. Brumani *Indice ſtir um circa Zuollam naſcentium*, I. Commeli *Catalogo Plantarum indigenarum Hollandiæ*, Boerhaave *Indice altero Plantarum Horti Lu duno-batavi*, (in quo indigenæ Bataviæ Stirp ſigno † notantur,) D. Meese *Flora Friſica*, atq ex incerti Auctoris, ſed periti methodoque Rajar addicti Botanici Manuſcripto, in quo plures plan rariores in *Tranſyſalania* naſcentes deſignan confeci *Floram Belgicam*, Anno 1767 typis e cuſam, quam 1768 Supplemento primo, et 17 Supplemento altero auxi. Quumvero nec om Belgium peragrare, nec omnes in eo meandr perſcrutari mihi datum fuerat, non defuerunt m ſculi Floræ Satellites, qui plures a me omiſſ Plantas, tum & aliarum locos natales benevo communicarunt, ſicque Rem Herbariam Belgica magnopere ditarunt.

Inter hos commemorare licet Perilluſtrem Eq tem G. H. *Baronem de* Rouwenoort, Domin *Uilenpaſſiæ*, *reliqua*, Virum non modo Natali & Munerum ſplendore inſignem, ſed & Botan totiusque Hiſtoriæ Naturalis peritiſſimum, id q Theſaurus Naturalium & Hortus Uilenpaſſia

abunde teſtantur; tum & Illuſtriſſimum Ejus Filium H. A. G. *Baronem de* ROUWENOORT, Dominum in *Lange*; qui Viri Comitatus Zutphaniæ rariores Plantas, alibi in Belgio vix aut non reperiundas, mecum communicarunt.

Vir Ampliſſimus J. DEUTZ, Senator & Scabinus Amſtelodamenſis, Rei Botanicæ ſcientia optime imbutus, qui omnis generis exoticas Plantas in amoeniſſimo ſuo Prædio Harlemum inter & Velſam conſito colit, varias indigenas ibidem in vicinia a Se lectas rariores, & ab aliis prætervisas, benevole ſuppeditavit.

Nobiliſſimus W. FABRICIUS SIX, Dominus in *Oterleek*, nulli in diligenti ſtirpium indigenarum inquiſitione & cognitione ſecundus, bene multas utriusque Hollandiæ Plantas contulit.

Summus Botanicus, Cel. D. VAN ROYEN Profeſſor Leydenſis, Hortique Academici Præfectus, pluribus non ſolum plantis indigenis, ſed & egregiis obſervationibus Botanicis Suppellectilem meam auxit.

Celeberrimus Vir M. W. SCHWENCKE, inclytus apud Haganos Medicinæ Practicus, Botanicesque Profeſſor, amicus meus colendiſſimus, multas egregias Stirpes circa Hagam Comitum & in Delflandia collegit, earumque Syllabum benevole mihi miſit.

M.

M. Houttuyn Medicus Amſtelodamenſis, ampliſſimo opere Hiſtoriæ Naturalis, ſecundum Linnæi *Syſtema* digeſto, cui etiamnum inſudat, clarus, Plantarum complurium, quas in Hollandia boreali offendit, locos natales gratioſiſſime mihi ſignificavit.

Clariſſimus M. van Marum Phil. & Med. Doct. & apud Harlemenſes Matheſios & Philoſophiæ Lector, cum Groningæ degebat, Plantas iſtius Provinciæ, & præſertim eas, quæ circa Metropolin creſcunt, exquiſivit, earumque locos natales mihi impertiit: quod beneficium eo gratius erat, quum de Plantis ibi indigenis mihi, qui juvenis non niſi ſemel illam Provinciam inviſi, nihil innotuerat.

Expertiſſimo G. I. Rink, Medicinam Tielæ Gelrorum cum laude facienti, acceptam refero accuratam deſignationem Plantarum in locis illi Urbi circumjacentibus creſcentium.

Diligentiſſimus N. Meerburgh, primarius in Horto Academico Lugduno-batavo Hortulanus, ſimulque peritus Botanicus, Pictor & Chalcographus, multas rariores plantas, præſertim Muſcos, in Hollandia legit, quibus meam Collectionem ditavit.

Denique, ſed non abſque triſti recordatione, com-

commemoro Virum, intima mihi ab aliquot annis devinctum amicitia, D. Fred. Rainville, Botanicum conſummatiſſimum, Societati Phyſices experimentalis, quæ Rotterodami floret, adſcriptum, aſt eheu Anno 1779. Die Sexto menſis Junii, poſtquam diutiſſime gravi cum aſthmate conflictaverat, vitamque pane ſolo & lacte toleraverat, rebus humanis ereptum. Incredibile eſt, quanta induſtria & ſolertia optimus ille Vir Plantas Belgii indigenas indagavit; Graminibus interim colligendis & extricandis præſertim intentus, quorum omnium, quotquot in Belgio pluribus annis legerat, ſpecimina ſicca mihi miſit, doctiſſimaſque de difficilioribus ſubjunxit obſervationes. Me inſuper rogante Anno 1772 adiit Provinciam Groninganam, quam itinere pedeſtri ad Dollerdum usque emenſus fuit; indeque redux mihi Catalogum Plantarum ſub illo itinere lectarum accuratiſſimum tradidit.

Quid vero quisque horum Virorum contulerit, nomina ſynbolis ſuis in hoc opuſculo adſcripta Lectorem certiorem facient.

A triennio tandem ego, cum bonis avibus priſtinam meam Gelriam repeteram, inque amœniſſima & ſaluberrima Urbe Zutphania domicilium elegeram, viribus meis, quæ jam ab aliquo

tem-

Digitized by Google

tempore labefactatæ multum erant, recuperatis, vegetus iterum pro ætate factus, et ſingulari heic Procerum in me benevolentia gaudens, occaſionem nactus fui varias in Comitatu Zutphaniæ creſcentes Plantas accuratius inveſtigandi, imo nonnullas olim prætervilas detegendi.

Hiſce nunc omnibus adminiculis inſtructus, Elenchum hunc Plantarum indigenarum in Septem Belgii foederati Provinciis hucusque repertarum compoſui, inque eo cives illos ſyſtematice diſpoſui, ſequutus Methodum Sexualem Perilluſtris mei quondam Præceptoris b. LINNÆI, qua faciliorem aut tutiorem inter hactenus publicatas non inveni; cujusque amplam explicationem in uſum meorum popularium propediem prelo committere decrevi, perſuaſus hujus ope multis in poſterum Floram hanc majori fore uſui.

Ex *Speciebus Plantarum* (*Sp.*) LINNÆI mutuatus ſum Differentias ſpecificas, quas juxta Syſtematis Vegetabilium Editionem 13^tiam^ a Cl. MURRAY evulgatam, paſſim emendavi. Citavi ubique *Specierum* illarum paginam cum numero præfixo; huncque ſequitur numerus Plantæ in *Flora Gelro-zutphanica* (*Gelr.*) et MEESE FLORA FRISICA (*Friſ.*) Paſſimque adduxi *Floram Ingricam* (*Ingr.*) ut obſervationes, quæ de iſtis Plantis a Cl. KRA-

Digitized by Google

KRASCHENINNIKOW & a me in Ruſſia factæ ſunt, conferri poſſent.

Synonyma non alia adduxi, quam quæ neceſſaria, ne mole ſua flores venantem premeret libellus. In omnibus Plantis, quæ C. BAUHINO innotuerunt, ejus *Pinnacem* (*Baub. pin.*) citavi, huic que adpoſui COMMELINI *Catalogum plantarum indigenarum Hollandiæ* (*Comm. holl.*) ut ita hujus Viri in Rem Herbariam Belgicam merita conſtarent. Porro DODONÆUM, MORISONUM, RAJUM, PLUKNETIUM, OEDERUM, &c. et in *Muscis* ubique DILLENIUM adduxi, ut Planta obvia icone expreſſa conferri, tum etiam, ut optima cujusdam Auctoris deſcriptio conſuli poſſet.

Nomina Vernacula in vulgus recepta, aut a ruricolis impoſita, in variis locis ſæpe diverſa, nec eandem ſemper diſignantia Plantam, quotquot mihi obvenerunt, adpoſui, de illorum bonitate aut etymologia haud ſollicitus; nec nova cudere volui.

Varietates ſuis Speciebus ſubjunxi, græcisque præfixis literis diſtinxi.

Loca Natalia Belgico expreſſi idiomate, tum quia multa vix in linguam latinam transferri patiuntur, tum quia ſpecialis eorum deſignatio Popularibus meis præſertim inſervire poteſt. Mo-

nen-

Digitized by Google

nendum vero Loca illa Plantarum minus fixa, & variationi ſæpius obnoxia eſſe. Licet enim in incultis diutiſſime ſpecies conſerventur & multiplicentur, in terris tamen ab hominibus frequentatis & laboratis, ſæpe ſolum mutatur, vertitur ſubinde campus & ex pratenſi fit agrarius, vel ericeta & teſqua coluntur, aut arboribus, quæ nunc laudabilis cura Magnatum eſt, conſeruntur, quaque Plantæ indigenæ ſæpe exulare jubentur: ſicque non mirum, multas in locis a COMMELINO indicatis non amplius reperiri, ut ipſe circa Harlemum veſtigia iſtius Vri relegens expertus ſum. Et hinc etiam frequentiam cujuslibet ſpeciei non prætereundam judicavi, qua ſimul melius ſive patri familias ſive medico innoteſcit, ſufficientem Plantæ copiam in uſum oeconomicum, medicum, vel alium liberali manu natura quærentibus offerat, nec ne. Sunt vero B. L. variæ Plantæ, quas ſola fide Magni BOERHAAVII huic Floræ inſertas, & cruce † ad Ejus imitationem inſignitas offendes, quum mihi illarum habitationes adhuc non innotuerint. Quasdam tamen omiſi, quibus, utpote certe exoticis, ex incuria forſan Typographi ſignum † præfixum fuit. Illæ ſunt *Polycarpon tetraphyllum*, quod *Herniaria alſines folio. Boerh. lugdb.* 2. p. 96. *Cotyledon Umbilicus veneris*, quæ

Co-

Cotyledon major. Boerh. lugdb. 1. p. 287. *Salvia Sclarea*, quæ *Sclarea. Boerh. lugdb.* 1. p. 163. *Polypodium aculeatum*, quod *Lonchitis aculeata major. Boerh. lugdb.* 1. p. 25. huicque præfixum † ſignum potius ad *Trichomanem* ibi mox ſubſequentem pertinet. Præterii deinde *Ulmum pumilam*, *Blitum capitatum & virgatum*, *Stellariam dichotomam*, a D. MEESE inter indigenas Friſiæ, citatas Plantas, quas crediderim olim ex Hortis aufugas fuiſſe. Nec Floræ huic inſerui eas, quæ culturam hominum in hortis aut agris expoſcunt, ſolas ſpontaneas enumeraſſe contentus.

Superſunt quoque nonnullæ Plantæ indigenæ ab Anteceſſoribus deſignatæ, quas ad ſua Genera & Species minus certe amandare valui; tum & aliæ ad Zoophyta nunc relatæ. Utrarumque harum Catalogum ad calcem hujus opuſculi ſubnexum invenies.

Porro cunctis Plantis Officinalibus nomen Pharmaceuticum (Pharm.) adpoſui, & partes, quæ proſtant, enumeravi, utſcirent Pharmacopoei, quas in ſuum commodum intra Patriam legere poſſint.

Obſervationes ex nuperis meis ſchedis collectas, aut ab aliis liberaliſſime mecum communicatas paſſim ſuis locis inſerui.

Uſum quoque Medicum & œconomicum quarun-

rundam Plantarum apud Ruricolas receptum ſparſim indicavi: perfectam enim omnium materiem medicam tradendo, extra ſcopum divagatus fuiſſem.

En iterum L. B. botanicum laboris mei foetum; Scias autem me eo non novam, ut forſan exſpectas, adornaſſe Floræ Belgicæ editionem; tunc enim totum Foederatum Belgium peragrare, ut antea animus erat, debuiſſem, ſed intra Septem Provincias me detinui: interim tamen in præſenti Flora numerum Plantarum, neglectis etiam quas cultura profert, majorem reperies; et hinc alio etiam titulo inſignitum hoc opuſculum in lucem prodit.

Denique deprecor menda typographica, quæ in abſentia mea irrepſerunt, & Lectores obſecro, ut potiora ex mea emendatione, quæ opuſculo ſubjecta eſt, corrigant.

CLAS-

CLASSIS I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

SALICORNIA.

1. SALICORNIA herbacea patula, articulis apice compreſſis emarginato-bifidis. *Sp.* 3. n. 1. *Gelr.* 605. *Friſ.* 1. *herbacea.*
Salicornia articulis apice craſſioribus obtuſis. *Ger. prov.* 328. *Baſter ſubſ.* 2. *p.* 105. *t.* 50.
Salicornia. *Dod. pempt.* 82.
Kali geniculatum majus. *Baub. pin.* 289. *Comm. boll.* 61.
Oed. *dan. t.* 303.
Zee-Kraal, Kraal-Kruid, Krabbe-Kwaad, Zee-Grappe. Belg.
Overvloedig langs de Zee- en Maas-ſtrand omtrent 's Gravezande; *op de weg naar de* Helder *op 't* Koegras; *aan de Stranden in* Zeeland; *aan de Zeedyk tuſſchen* Harlingen *en* Roptazyl; *aan vochtige kanten van Koornlanden buiten* Franeker; *aan de Zeekant van* Groningen *by de* Soltekamp, Warſum; Delfzyl, Ooſtwolde, *en elders, meeſt buitendyks, aan de quelders: ook aan de Zeekant by* Harderwyk, *doch niet veel.*
Pharm. KALI *herb. Sal Alkali Souda.*
Aceto condita eſculenta Zeelandis.

HIPPURIS.

2. HIPPURIS. *Sp.* 6. *n.* 1. *Gelr.* 1. *Friſ.* 2. *vulgaris.*
Equiſetum paluſtre, brevioribus foliis, polyſpermum. *Baub. pin.* 15. *theatr.* 242. *Comm. boll.* 31.
Polygonum femina. *Dod. pempt.* 113. *Cam. epit.* 689.
Oed. dan. t. 87.
Duizent-Knoop Wyfje. Belg.
Aan de kanten der Rivieren, en in ſtaande Wateren op verſcheide plaatſen, overvloedig aan de Zeek by Zoe-

Zoelen *in de* Betuwe; *in de Sloot achter* Zorgvliet *by* 's Gravenhage; *in de Graft te* Leerdam; *in de Slooten by 't Huis te* Marquette; *in de Vyvers van 't Huis te* Zandhorſt; *en overvloedig in de modderige Slooten van* Noord-Holland; *als ook langs het Horenſche-diep, en in de zoogenaamde bronlanden by de Water-huizen in de Provintie* Groningen.

Articuli digito compreſſi, cum ſtrepitu diſſiliunt; qua nota ab Equiſetis facile diſtinguitur. (*Gouan. h. monſp.* 3.)

Nemauſii in Galliis ad ambuſta crebro formâ unguenti uſurpatur. (RAZOUX *Tables Noſologiques, p.* 109.)

DIGYNIA.

CALLITRICHE.

verna. 3. CALLITRICHE, foliis ſuperioribus ovalibus, floribus androgynis. *Sp.* 6. *n.* 1. *Gelr.* 2.

Stellaria aquatica. *Baub. pin.* 141. *Comm. holl.* 108.

Alſine aquis innatans, foliis longiuſculis. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 786.

Zeer gemeen in de Slooten op veele plaatſen.

autumnalis 4. CALLITRICHE foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Sp.* 6. *n.* 2. *Gmel. ſib.* 3. *t.* 1. *f.* 2.

Alſine aquatica minor ſ. fluitans. *Baub. pin.* 257.

Lenticula paluſtris anguſtifolia, folio in apice diſſecto. *Loes. pruſſ.* 140. *t.* 38.

By de voorgaande.

Digitized by Google

CLASSIS II.

DIANDRIA MONOGYNIA.

LIGUSTRUM.

5. LIGUSTRUM. *Sp.* 10. *n.* 1. *Gelr.* 3. *Friſ.* 5. *vulgare.*
Liguſtrum germanicum. *Baub. pin.* 475. *biſt.* 3. *p* 533. *Comm. boll.* 65.
Keel-Kruid, *Mondbout*, *Liguſter*. Belg.
In de Boſſchadie by Zuideras *in 't Graafſchap*-Zutphen; *in de Duinen by* Waſſenaar; *tuſſchen* Haarlem *en* Zantvoord; *in de Bosjes te* Bergum, *en by* 's Heerenveen *in* Friesland; *op de* Mickelhorſt *agter* Haren *by* Groningen.
Pharm. LUGUSTRI *flor.*
Perperam hunc fruticem Belgii civem eſſe negat KNOOP. *Dendrol. p.* 97.

CIRCAEA.

6. CIRCAEA caule erecto, racemis pluribus, foliis ovatis. *Sp.* 12. *n* 1. *Gelr* 4. *lutetiana.*
Circæa lutetiana. *Lob. biſt.* 137.
Solanifolia Circæa dicta major. *Baub. pin.* 168. *Comm. boll.* 107.
Herba divi ſtephani. *Tab. biſt.* 730.
Oed. dan. t. 210.
In verſcheide Boſſchen op donkere vochtige plaatſen op 't Loo, Uilenpas, Engelenborg *in* Gelderland; *by* Gornichem, Haarlem, *'t Huis te* Brederoode *in* Holland.

VERONICA.

7. VERONICA ſpicis terminalibus, foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis acuminatis. *Sp.* 13. *n.* 5. *Gelr* 5. *longifolia.*

Digitized by Google

Veronica I erectior latifolia. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 346.
Veronica ſpicata latifolia. *Baub. pin.* 246.
Te Heemze *langs de* Vecht *in* Overyſſel.
Variat foliis latioribus & anguſtioribus; colore florum cæruleo intenſiore & dilutiore.

ſpicata. 8. VERONICA ſpica terminali, foliis oppoſitis crenatis obtuſis, caule adſcendente ſimpliciſſimo. *Sp.* 14. *n.* 7. *Gelr.* 6. *Ingr.* 2.
Veronica ſpicata minor. *Baub. pin.* 247.
Oed. dan. t. 52.
In de Laan voor den Huize Uilenpas *in de Graafſchap* Zutphen; *ook op* Eſſenburg *by* Harderwyk.

officinalis. 9. VERONICA ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente. *Sp.* 11. *n.* 9. *Gelr.* 7. *Friſ.* 6.
Veronica mas ſupina & vulgatiſſima. *Baub. pin.* 246. *Comm. holl.* 114.
Oed. dan. t. 248.
Eeren-prys Manneken. Belg.
Overvloedig in de Duin-Valeyen van Holland, *en elders op dorre zandige plaatſen.*
Pharm VERONICÆ herb.

ſerpyllifolia. 10. VERONICA racemo terminali ſubſpicato, foliis ovatis glabris crenatis. *Sp.* 15. *n.* 14. *Gelr.* 8. *Friſ.* 7.
Veronica pratenſis ſerpyllifolia. *Baub. pin.* 247. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 319. *ſ.* 3. *t.* 22. *f.* 8.
Oed. dan. t. 492.
Eeren-prys Wyfje. Belg.
In de Weiden by 't Huis te Zandhorſt *in* Holland; *te* Heemze *in* Overyſſel; *en aan de wegen en kanten der Slooten, ook in de Moesboven op ſommige plaatſen.*

Beccabunga. 11. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Sp.* 16. *n.* 15. *Gelr.* 9. *Friſ.* 8.
Anagallis aquatica major, folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 252. *hiſt.* 3. *p.* 791. *Comm. holl.* 9.
Oed. dan. t. 511.
Beeke-boom, Beek-punge, Water-punge. Belg.
β. Anagallis aquatica minor, folio ſubrotundo. *Baub. pim.* 252. *Comm. holl.* 9.
Op veele plaatſen aan de Beekjes, en op laage natte gronden en plaatſen, alwaar 's Winters water ſtaat.

Pharm

Pharm. BECABUNGÆ herb.

12. VERONICA racemis lateralibus, foliis lanceolatis ſerratis, caule erecto. *Sp.* 16. *n.* 16. *Gelr.* 9. *α.β.* & 606. *Friſ.* 9. *Anagallis.*

Veronica aquatica major, folio oblongo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 323. *ſ.* 3. *t.* 21. *f.* 25.

Anagallis aquatica major, folio oblongo. *Baub. pin.* 252. *Comm. holl.* 9.

β. Anagallis aquatica minor, folio oblongo. *Baub. pin.* 252. *Comm. holl.* 10.

Aan de Slooten en Graften op verſcheide plaatſen als de voorgaande.

13. VERONICA racemis lateralibus alternis, pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Sp.* 16. *n.* 17. *Friſ.* 10. *ſcutellata.*

Anagallis aquatica anguſtifolia ſcutellata. *Baub. pin.* 252. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 780. *Comm. holl.* 9.

Oed. *dan.* *t.* 209.

Op veele plaatſen langs de Zuider-Zeekant by Enkhuiſen, Muiderberg, Stavoren, Harlingen, *op* Vlieland; *in de Slooten van 't* Haagſche-Boſch; *en in de Moeraſſen by* Groningen.

Folia omnia denticulis minimis ſemper inſtructa ſunt.

14. VERONICA racemis lateralibus, foliis oblongo-ovatis ſerratis, caulibus proſtratis. *Sp.* 17 *n.* 22. *proſtrata.*

Veronica anguſtifolia minor. *Riv. t.* 95.

Chamædrys ſpuria minor anguſtifolia. *Baub. pin.* 249. *prodr.* 117. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 287.

Op het Gebergte te Bronsbergen *buiten* Zutphen. (*Nob. Baro & Eques de* ROUWENOORT, *Dominus Uilenpaſſiæ.*)

15. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis rugoſis dentatis ſeſſilibus, caule bifariam piloſo. *Sp.* 17. *n.* 23. *Gelr.* 10. *Friſ.* 11. *Chamædrys.*

Veronica minor, foliis imis rotundioribus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 320. *ſ.* 3. *t.* 23. *f.* 12.

Chamædrys ſpuria minor rotundifolia. *Baub. pin.* 249. *Comm. holl.* 24.

Oed. dan. t. 448.

Gamanderlyn. Belg.

Digitized by Google

β. Chamædrys ſpuria minor latifolia. *Baub. pin.* 249. Teucrium 5. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 350.
Veel op ſchaduwachtige plaatſen; aan den boogen Sypel by Harderwyk; *in 't* Haagſe Boſch; *in den* Haarlemmer-hout; *ook in de Provintien* Utrecht *en* Friesland; β. *In* Overyſſel *by* Zwoll.

agreſtis. 16. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo brevioribus. *Sp.* 18. *n.* 26. *Gelr.* 12. *Friſ.* 13.
Alſine chamædryfolia, floſculis pediculis oblongis inſidentibus. *Baub. pin.* 250. *Comm. boll.* 6.
Alſine ſerrato folio glabro. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 366.
Oed. dan. t. 449.
β. Veronica floſculis oblongis pediculis inſidentibus, chamædryos foliis alternis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 226. *n.* 22.
In veele Hoven en Bouw-landen.

arvenſis. 17. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo longioribus. *Sp.* 18. *n.* 27. *Gelr.* 13. *Friſ.* 14.
Alſine veronicæ foliis, floſculis cauliculis adhærentibus. *Baub. pin.* 250 *Comm. boll.* 7.
Alſine folio ſerrato hirſutiori, floribus & loculis cauliculis adhærentibus. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 367.
In de Zaai-landen buiten Harderwyk, Naarden, *en elders.*

hederæfolia. 18. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. *Sp.* 19. *n.* 28. *Gelr.* 11. *Friſ.* 15.
Alſine hederulæ folio. *Baub. pin.* 250. *Comm. boll.* 6.
Oed. dan. t. 423.
Muur met bladeren van Klim of Veil. Belg.
In de Bouw-landen, en ook op ruwe plaatſen.

triphyllos. 19. VERONICA floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus. *Sp.* 12. *n.* 19. *Gelr.* 15.
Alſine triphyllos cærulea. *Baub. pin.* 250.
Alſine folio profunde ſecto, flore purpureo ſeu violaceo. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 367.
Oed. dan. t. 252
Onder 't Koorn te Dieze *in* Overyſſel.

Digitized by Google

20. VERONICA floribus ſolitariis ſeſſilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtuſis integerrimis, caule erecto. *Sp.* 20. *n.* 33. *Friſ.* 16. *Peregrina.*

Veronica terreſtris annua, folio polygoni, flore albo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 322. *ſ.* 3. *t.* 24. *f.* 19. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 225. *n.* 17.

Oed. dan. t. 407.

Zomtyds in de Koorn-landen, het meeſt in de Hoven; thans zeer gemeen in de Provintien Friesland *en* Groningen.

GRATIOLA.

21. GRATIOLA floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ſerratis. *Sp.* 24. *n.* 1. *Officinalis.*

Gratiola. *Dod. pempt.* 362.

Gratiola centauroides. *Bauh. pin.* 279. *Comm. holl.* 55.

Gods-Genade. Belg.

Tandpyn-wortel. Ruſticis Gorcomienſibus.

Overvloedig aan de Dyken omtrent Gornichem.

Pharm. GRATIOLÆ *rad. herb.*

Radix denti cavo indita contra odontalgiam Ruſticis Gorcomienſibus in uſu.

PINGUICULA.

22. PINGUICULA nectario cylindraceo longitudine petali. *Sp.* 25. *n.* 2. *Gelr.* 607. *Vulgaris.*

Pinguicula. *Cluſ. hiſt.* 311.

Sanicula montana, flore calcari donato. *Bauh. pin.* 243.

Oed. dan. t. 93.

Butter-wortel, Berg-Sanikel. Belg.

Kievits-vet. Vulgo.

Tuſſchen Groenloo *en* Borkeloo, *als ook op één Boeren-erf agter* Doetinchem, *genaamt de Steenbouwer, gelegen in 't buurſchap* Brunsveld *by den* Slangenburg, *als mede op de* Bakermarkt, *en by* Zelhem *in 't Graafſchap* Zutphen.

UTRICULARIA.

23. UTRICULARIA nectario conico, ſcapo pauciſloro. *Sp.* 26. *n.* 3. *Friſ.* 17. *Vulgaris.*

Lentibularia. *Hall. jen.* 237. *Lind. alſ.* 242. *t.* 11.

Digitized by Google

Millefolium aquaticum lenticulatum. *Baub pin.* 141. *Oed dan. t.* 138.
Water-Duizend-blad met geele bloemen. Belg.
Overvloedig in Slooten, Vyvers en Water-dobben, voornaamlyk by Vorden *in 't Graafſchap* Zutphen; *omtrent de* Bontenbok *buiten* Gorradyk, *en op 't* Orange Woud *in* Friesland; *in de Slooten van de bronlanden by de Waterbuizen buiten* Groningen.

VERBENA.

officinalis. 24. VERBENA tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule ſolitario. *Sp.* 29. *n.* 15. *Gelr.* 15.
Verbena communis, flore cæruleo. *Baub. pin.* 269. *Comm. boll.* 114.
Verbena recta. *Dod. pempt.* 150.
Yzer-kruid, Yzer-bard. Belg.
Te Zandwyk *by* Tiel; *aan den Dyk by* Lienden, Driel, Elden, *omtrent 't Huis de* Nevel *in de* Betuwe; *langs de wegen by* 's Hage; *op dorre heuvelen by 't Gerecht buiten* Naarden; *aan ſommige Duinkanten buiten* Haarlem; *op de Wallen te* Utrecht; *en elders.*
Pharm. VERBENÆ *herb.*

LYCOPUS.

europaeus. 25. LYCOPUS foliis ſinuato-ſerratis. *Sp.* 30. *n.* 1. *Gelr.* 16. *Friſ.* 18.
Marrubium paluſtre glabrum. *Baub. pin.* 230. *Comm. boll.* 72.
Marrubium aquaticum quorundam. *Baub. biſt.* 3. *p* 318.
Water-Andorn, of *Malrove.* Belg.
β. Lycopus foliis in profundas lacinias diſſectis. *Tourn. inſt.* 191. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 186.
Aan de kanten der Slooten, ook aan den Yſſel *op verſcheide plaatſen.*

SALVIA.

pratenſis. 26. SALVIA foliis cordato-oblongis crenatis: ſummis amplexicaulibus, verticillis ſubnudis, corollis gelea glutinoſis. *Sp.* 35. *n.* 12. *Gelr.* 17.
Horminum pratenſe, foliis ſerratis. *Baub. pin.* 238.
Or-

Digitized by Google

Orvala ſylveſtris, ſpecies quarta. *Dod. pempt.* 293.
Veld-Salie. Belg.
Op verſcheide plaatſen omtrent Zutphen, *en elders in 't Graafſchap* Zutphen; *en omtrent* Salk *in* Overyſſel.

27. SALVIA foliis ſerratis ſinuatis læviuſculis, corollis calyce anguſtioribus. *Sp.* 35. *n.* 14. *Gelr.* 18. *Verbenaca.*
Horminum ſylveſtre, lavandulæ flore. *Baub. pin.* 239.
Hormini ſylveſtris quarti, ſpecies quinta. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 31.
By Uilenpas, Enghuiſen, *en elders in* Gelderland.

D I G Y N I A.

A N T H O X A N T H U M.

28. ANTHOXANTHUM ſpica oblonga ovata, floſculis ſubpedunculatis ariſta longioribus. *Sp.* 40. *n.* 1. Gelr. 608. *Friſ.* 19. *Schreb. gram.* 1. *t.* 5. *Stillingf. miſcell. t.* 1. *odoratum.*
Gramen ſpicatum pratenſe, ſpica flaveſcente. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 43.
Veel in de Wei-landen en aan de kanten der Boſſchen en Wegen; ook aan de Duinkant buiten Haarlem, *in 't Voorjaar.*
Ariſta ſemper calyce longior eſt, ut probe attendenti patet. In ſolo pingui hac planta ſæpe profert ſpicam vere paniculatam.

CLASSIS III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

VALERIANA.

dioica. 29. Valeriana floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis. *Sp.* 44. *n.* 4. *Gelr.* 20.
Valeriana paluſtris minor. *Baub. pin.* 164. *Comm. boll.* 113.
Valeriana minima. *Dod. pempt.* 350.
Kleine wilde Valeriane. Belg.
In vochtige Weilanden buiten Amſterdam; *in de Duin-valeyen by* Zorgvliet; *aan den Horenſche-dyk nevens* Haren; *ook aan de Ooſtkant van* Haren *aan de dykjes buiten* Groningen; *en elders.*

officinalis. 30. Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Sp.* 45. *n.* 5. *Gelr.* 19. *Friſ.* 20.
Valeriana ſylveſtris major. *Baub. pim.* 164. *Comm. boll.* 113.
Oed. dan. t. 570.
Wilde Valeriane. Belg.
β. Valeriana major ſylveſtris montana. *Baub. pin.* 164. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 74.
Aan de kanten der Slooten en Graften op veele plaatſen.
Pharm. Valerianæ sylvestris rad.

Locuſta. 31. Valeriana floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Sp.* 47. *n.* 16.
olitoria. α. fructu ſimplici. *Sp.* 47. *n.* 16. α. *Gelr.* 21. *Friſ.* 21.
Valeriana campeſtris inodora major. *Baub. pin.* 165. *Comm. boll.* 113.
Olus album. *Dod. pempt.* 646.
Veld Sala, Koorn-Sala, Vet, Vettik, Vette-koes. Belg.

In

In de Koorn-landen en Moes-hoven.

I R I S.

32. IRIS corollis imberbibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus. *Sp.* 36. *n.* 10. *Gelr.* 22. *Fris.* 22. *Pſeudacorus.*

Acorus adulterinus. *Bauh. pin.* 34. *theatr.* 634. *Comm. holl.* 4.

Oed. dan. t. 494.

Geel-Liſch, Valſch-Lis. Belg.

Pinxter-Bloemen. vulgo.

Overvloedig in ondiepe Slooten en laage vochtige landen in de Betuwe; *tuſſchen* Harderwyk *en* Nykerk; *tuſſchen* Rotterdam *en* Gouda; *by* 's Hage; *buiten* Alkmaar *in de* Egmonder-Meer; *aan de kant van den* Huigen-dyk; *en van de* Alkmaarder-Vaart; *en elders in* Noord Holland; *ook veel in de Provincien* Utrecht, Friesland, *en in 't* Goregt *buiten* Groningen.

Pharm. ACORI ADULTERINI rad.

33. IRIS corollis imberbibus, petalis interioribus patentiſſimis, caule unangulato, foliis enſiformibus *Sp.* 57. *n.* 11. *foetidiſſima*

Spatula foetida. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 31.

Gladiolus foetidus. *Bauh. pin.* 30. *theatr.* 560. *Comm. holl.* 44.

Wandluis-Kruid. Belg.

Aan de kant van de Vaart tuſſchen Haarlem *en* Leiden.

S C H O E N U S.

34. SCHOENUS culmo tereti, foliis margine dorſoque aculeatis. *Sp.* 62. *n.* 1. *Mariſcus.*

Cyperus longus inodorus germanicus. *Bauh. pin.* 14. *theatr.* 221. *Comm. holl.* 30.

Cyperus longus inodorus major, foliis & carina ſerratis. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 237. *ſ.* 8. *t.* 11. *f.* 24. *altera bona.*

Wild Galigaan zonder reuk. Belg.

Aan de kanten der Rivieren en ſtaande Wateren op verſcheide plaatſen.

35. SCHOENUS culmo tereti nudo, capitulo ovato, in- *nigricans.*

involucri diphylli valvula altera ſubulata longa. *Sp.* 64. *n.* 5.
Juncus lævis minor, panicula glomerata nigricante. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 233. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 28.
Overvloedig in de Zee-Duinen by Velzen.

compreſſus. 36. SCHOENUS culmo ſubtriquetro nudo, ſpica diſticha, involucro monophyllo. *Sp.* 65. *n.* 10.
Gramen Cyperoides, ſpica ſimplici compreſſa diſticha. *Pluk. alm.* 173. *t.* 34. *f.* 9 *Scheuch. gram.* 490.
Te Hillegom *tuſſchen* Leiden *en* Haarlem, *langs een beekje aan één Weide, loopende naar de* Haarlemmer-Meyr. (D. RAINVILLE.)

glomeratus 37. SCHOENUS culmo triquetro folioſo, floribus faſciculatis, foliis planis, pedunculis lateralibus geminis. Sp. 65. *n.* 11.
In de Weiden by Nymegen. (D. RAINVILLE.)

CYPERUS.

flaveſcens. 38. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis ſimplicibus inæqualibus, ſpicis confertis lanceolatis. *Sp.* 68. *n.* 15.
Gramen Cyperoides minus, panicula ſparſa ſubflaveſcente. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 88. *t.* 88. *Comm. holl.* 52.
Klein Riet-Gras. Belg.
In vochtige Zand-gronden aan de Duinkant, en in de Meben by Harderwyk.

fuſcus. 39. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis ſimplicibus inæqualibus, ſpicis confertis linearibus. Sp. 69. *n.* 16.
Gramen Cyperoides minus, panicula ſparſa nigricante. *Baub. pin.* 6.
Oed. dan. t. 179.
By de voorige, waar van weinig verſchilt.

SCIRPUS.

paluſtris. 40. SCIRPUS culmo tereti nudo, ſpica ſubovata terminali. *Sp.* 70. *n.* 2. *Gelr.* 27. *Friſ.* 23.

Gra-

Juncus capitulis equiſeti major. *Baub. pin.* 12. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 164.

Juncellus cyperoïdes, capitulo ſimplici. *Loes. pruſſ.* 131. *t.* 36.

Oed. dan. t. 273.

Kleine Water-Bieſe. Belg.

Aan de Oevers van de Maas *by het Huis* ten Donk, *en* Delfshaven; *in de Weilanden by* Velzen; *in ondiepe Slooten aan het Veld te* Dalfſen *in* Overyſſel; *ook op verſcheide plaatſen in* Friesland.

Differt valde longitudine & craſſitie culmorum & ſpicarum pro diverſitate loci & ſoli.

41. Scirpus culmo ſtricto nudo, ſpica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus ſquamula interſtinctis. *Sp.* 71. *n.* 6. *caeſpitoſus.*

Gramen junceum, foliis & ſpica junci, minus. *Baub. pin.* 6. *Comm. holl.* 50.

Oed. dan. t. 167.

In de buitendykſe landen aan de Ykant; en overvloedig in vogtige Weiden in de Provincien Friesland *en* Groningen.

42. Scirpus culmo tereti nudo ſetiformi, ſpica ovata bivalvi, ſeminibus nudis. *Sp.* 71. *n.* 7. *acicularis.*

Juncus inutilis ſeu Chamæſchenus. *Baub. theatr.* 183.

Oed. dan. t. 287.

In een Rieſwaard aan de Leck *by* Wyk te Duurſtede, *tuſſchen de Stad en het Veer.* (*Filius Peter de Gorter.*)

Culmi hic interdum ſpithamam longitudine æquant.

43. Scirpus culmis teretibus nudis alternis, caule folioſo flaccido. *Sp.* 71. *n.* 8. *Friſ.* 24. *fluitans.*

Juncellus, capitulis equiſeti, minor fluitans. *Baub. pin.* 12. *prodr.* 23.

Gramen junceum clavatum minimum. *Raj. hiſt.* 1310. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 230. *S.* 8. *t.* 10. *f.* 31. *Pluk. alm.* 180. *t.* 35. *f.* 1.

In Friesland *omtrent* Bergum *op laage natte plaatſen, en voor aan in laagtens op de Heide aldaar.*

44. Scirpus culmo tereti nudo, ſpicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. *Sp.* 72. *n.* 9. *Gelr.* 26. *Friſ.* 25. *lacuſtris.*

Jun-

Juncus maximus ſeu Scirpus major. *Baub. pin.* 12. *Comm. holl.* 61. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 231. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 1.
Matte Bieſen, Stoele Bieſen Belg.
β. Juncus, ſive Scirpus medius. *Baub. pin.* 12. *Comm. holl.* 61. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 231. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 2.
Zeer veel aan de Rivieren, Meyren, Vaarten, Graften, Slooten; ook aan de Beeken by Harderwyk, *en op het Biesboſch by* Dordrecht.
β. *Aan de Rivier 't* Spaarne *by 't Huis te* Heemſtede; *ook aan de* Vecht *en* Maas.

Holoſchoenus. 45. Scirpus culmo tereti nudo, ſpicis ſubgloboſis glomeratis pedunculatis, involucro diphyllo inæquali mucronato. *Sp.* 72. *n.* 10.
Juncus acutus maritimus, capitulis rotundis. *Baub. pin.* 11. *theatr.* 17. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 164.
Oed. dan. t. 454.
† *Volgens* Boerhaave.

ſetaceus. 46. Scirpus culmo nudo ſetaceo, ſpica terminali ſeſſili. *Sp.* 73. *n.* 12.
Gramen junceum minimum, capitulo ſquamoſo. Baub. *pin.* 6. *prodr.* 13.
Gramen junceum minimum maritimum. C. B. *Comm. holl.* 50.
Oed. dan. t. 311.
In de Zee-Duinen by Zandvoort *en* Muiderberg, *en by ter* Goes *in* Zeeland. (*Baub. prodr.* 13.)

triqueter. 47. Scirpus culmo triquetro nudo, ſpicis ſubſeſſilibus pedunculatiſque, mucronem æquantibus. *Linn. mant.* 29.
Juncus acutus maritimus, caule triquetro molli, procerior. *Pluk. alm.* 200. *t.* 40. *f.* 2.
In menigte aan de Oevers van de Maas *langs den Hoogendyk by* Rotterdam. (D. Rainville.)

mucronatus. 48. Scirpus culmo triangulo nudo acuminato, ſpicis conglomeratis ſeſſilibus lateralibus. *Sp.* 73. *n.* 15.
Juncus acutus maritimus, caule triangulo. *Baub. pin.* 11 *prodr.* 22. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 232. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 20.
Te Overmaas *langs de Rivier.* (D. Rainville.)

49. Scir-

Digitized by Google

49. SCIRPUS culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, ſpicularum ſquamis trifidis: intermedia ſubulata. *Sp.* 74. *n.* 21. *Gelr.* 25. *Friſ.* 26. *maritimus.*

α. Cyperus rotundus inodorus germanicus. *Baub. pin.* 14. *theatr.* 215. *Comm. boll.* 30.

Water Cyperus van Nederland. Belg.

β. Cyperus rotundus inodorus anglicus. *Baub. pin.* 14. *Comm. boll.* 31.

Ronde Cyperus zonder reuk Belg.

γ. Gramen Cyperoides panicula ſparſa majus. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 86. *Comm. boll.* 51.

Wild Galigaan Gras. Belg.

α. & β. *Aan de kanten van verſcheide Rivieren en ſtaande Wateren.* γ. *Aan ſtilſtaande Wateren en Slooten.*

50. SCIRPUS culmo triquetro folioſo, umbella foliacea, pedunculis nudis ſupradecompoſitis, ſpicis confertis. *Sp.* 75. *n.* 24. *Gelr.* 24. *ſylvaticus.*

Cramen Cyperoides miliaceum. *Baub. pin.* 6. *Comm. boll.* 52.

Oed. dan. t. 307.

Grasachtig Galigaan. Belg.

In vochtige laage Weilanden.

ERIOPHORUM.

51. ERIOPHORUM culmis vaginatis teretibus, ſpica ſcarioſa. *Sp.* 76 *n.* 1. *vaginatum*

Gramen tomentoſum alpinum & minus. *Baub. pin.* 5. *prodr.* 10.

Juncus alpinus. capitulo lanuginoſo Schoenolagurus. *Baub. pin.* 12. *prodr.* 23. *theatr.* 188. *Scheuch. gram.* 302. *t.* 7. *f.* 1.

Oed. dan. t. 236.

Op Staal-duin by 's Hage. (*Cel.* SCHWENCKE.)

52. ERIOPHORUM culmis teretibus, foliis planis, ſpicis pedunculatis. *Sp.* 76. *n.* 2. *Gelr.* 28. *Ingr.* 8. *Friſ.* 27. *polyſtachion.*

Gramen eriophorum. *Dod. pempt.* 522.

Gramen pratenſe tomentoſum, panicula ſparſa. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 60. *Comm. boll.* 50.

Wolle-gras, Wolle-Vlas, Matte-Vlas, Dottergras. Belg.

Veen-

Digitized by Google

Veen-Hamels, Veen-Pluis. Ruſticis.
De Moeren. Drenthinis.
Overvloedig in vochtige dorre Landen en Heigronden by Harderwyk, Barneveld, Scherpenzeel, Veenendaal, *en elders in* Gelderland; *buiten* Amſterdam *op de Weg naar* Amſtelveen, *aan de Meyrkant*; *in de Weiden by 't Huis te* Marquette; *buiten* Alkmaar *by* Heiloo; *in de* Schermer, *op 't* Koegras *in* Noord-Holland; *te* Boxtel *in de* Meyry; *in de Wouden in* Friesland; *in de laage Hooy- en Bronlanden by* Haren, *en elders buiten* Groningen; *en op veele plaatſen in* Drenthe.
Ruſtici nonnulli ad ericeta habitantes pulvinaria ſua & lectos ex pappo bujus graminis conficiunt.

NARDUS.

ſtricta. 53. Nardus ſpica ſetacea recta ſecunda. *Sp.* 77. *n.* 1. *Gelr.* 29. *Ingr.* 9. *Schreb. gram.* 1. *t.* 7.
Gramen ſparteum juncifolium. *Baub. pin.* 5. *theatr.* 69. *Comm. boll.* 49.
β. Gramen ſparteum hollandicum, ſive capillaceo folio minus. *Baub. pin.* 5. *prodr.* 11. *Comm. boll.* 49. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 217. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 8.
In de Gagel-Kampen by Harderwyk, *en op veele plaatſen in de Duinen, onder het Moſch.* β. *In de Duinen by* Heemſtede.

DIGYNIA.

PHALARIS.

arundinacea. 54. Phalaris panicula oblonga ventricoſa ampla. *Sp.* 80. *n.* 6.
Gramen arundinaceum ſpicatum. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 94. *Comm. boll.* 52.
Riet-gras. Belg.
β. Gramen arundinaceum, Calamagroſtis dictum, ſpica multiplici. *Baub. pin.* 6. *Comm. boll.* 52. *Oed. dan. t.* 259.
γ. Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Baub. pin* 3. *Comm. boll.* 47.
Op vochtige zandige plaatſen by Doesburg, Harderwyk, Wageningen; *aan de Duinkant by* Haarlem; *in*

in de Laanen tuſſchen het beghout by de Slooten op S. Hacken-goedt *by* Zwol.

55. PHALARIS panicula effuſa, glumarum carinis ciliatis. *Sp.* 81. *n.* 8. *Schreb. gram.* 6. *t.* 12. *oryzoides.*

Gramen paluſtre, panicula ſpecioſa. *Baub. pin.* 3. *prodr.* 17.

Homolocenchrus. *Mieg. act. helv.* 4. *p.* 307. *Hall. hiſt.* 1411.

Aan den Beukelsdyk *langs de Sloot, en beneden aan den* Hoogendyk, *digt by het einde van de Rivier, aan geene zyde van* Boſchjes-Eiland *buiten* Rotterdam. (D. RAINVILLE.)

Floret ſero, & matureſcit raro.

PANICUM.

56. PANICUM ſpica verticillata, racemulis quaternis, involucellis unifloris biſetis, culmis diffuſis. Sp. 82. *n.* 3. *verticillatum.*

α. Panicum ſpiculis ſpicatis ſcabritie adhærentibus. *Linn. h. Cliff.* 27. *Act. ſtokb.* 1741. *p.* 183.

Gramen paniceum, ſpica aſpera. *Baub. pin.* 8. *theatr.* 139. *t.* 139.

β. Panicum vulgare, ſpica ſimplici veſtibus non adhærente. *Dalib. par.* 21.

γ. Glumis muticis, nullatenus ariſtatis.

Gemeen in de Moeshoven, en van zelfs op de Broeybedden.

α. Habet glumas ariſtatas; ariſtæ hamis armantur, qui verſus ariſtarum baſin reflectuntur. β. Hami ariſtarum verſus earundem apicem inflectuntur.

57. PANICUM ſpicis alternis conjugatisque, ſpiculis ſubdiviſis, glumis ariſtatis hiſpidis: rachi quinquangulari. *Sp.* 83. *n.* 8. *Gelr.* 35. *Friſ.* 28. *Crusgalli.*

Gramen paniceum, ſpica diviſa. *Baub. pin.* 8. *Comm. holl.* 54. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 189. *ſ.* 8. *t.* 4. *f.* 15.

β. Gramen paniceum, ſpica ariſtis longis armata. *Baub. pin.* 8. *Comm. holl.* 54. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 189. *ſ.* 8. *t. f.* 16.

Wild Panik-Koorn. Belg.

γ. Gramen ſorghi effigie. *Lob. ic.* 5.

Gramen ſorghi panicula erectum. *Baub. pin.* 8. *Comm. holl.* 55.

Digitized by Google

Sorgh - Zaad - Gras. Belg.
In de Hoven en Moes-hoven, en andere bebouwde gronden. β. *omtrent het* Oranje-wout *tuſſchen het koorn.* γ. *op dorre zandige velden.*
D. RAINVILLE *in horto ampliſſ. Viri Conſularis* D. VAN DER HEIM *varietatem hujus reperit vere giganteam, quæ ad altitudinem 5 & 6 pedum excreverat.*

ſanguinale. 58. PANICUM ſpicis digitatis baſi interiore nodoſis, floſculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. *Sp.* 84. *n.* 13. *Gelr.* 36. *Schreb. gram.* 119. *t.* 16.
Gramen dactylon, folio latiore. *Bauh. pin.* 8. *theatr.* 114. *Comm. boll* 53.
Oed. dan. t. 388.
Komt van zelfs voort in de Hoven.

P H L E U M.

pratenſe. 59. PHLEUM ſpica cylindrica longiſſima ciliata, culmo erecto. *Sp.* 87. *n.* 1. *Gelr.* 30. *Friſ.* 29. *Schreb. gram.* 103. *t.* 14.
Gramen typhoides aſperum primum. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 51. *Comm. boll.* 48.
β. Gramen typhoides maximum, ſpica longiſſima. *Bauh. pin.* 4. *prodr.* 10. *theatr.* 49. *Comm. boll.* 48. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 193. *ſ.* 8. *t.* 4. *f* 1.
Langs de Wegen en in zandige Weilanden op verſcheide plaatſen.
Varietas minor, rigidior, ſpica breviore, occurrit in Sabuloſis Dunis circa Harlemum & Scheveningam.
Ill. HALLERUS *hiſt.* 1528. & 1531. *ex hoc Phleo duas facit ſpecies.*

nodoſum. 60. PHLEUM ſpica cylindrica, culmo adſcendente, foliis obliquis, radice bulboſa. *Sp.* 88. *n.* 2.
Phleum ſpica cylindracea brevi, radice nodoſa. *Berg viad.* 318.
Gramen typhoides aſperum alterum. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 52.
Gramen nodoſum, ſpica parva. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 3. *theatr.* 20. *Comm. boll.* 47. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 194. *ſ.* 8. *t.* 4. *f.* 3.
Oed. dan. t. 380.
β. Gramen typhoides culmo reclinato. *Bauh. pin.* 4. *Comm. boll.* 49.
Gramen cum cauda muris, foliis hirſutis. *Bauh. hiſt.*

Digitized by Google

hiſt. 2. *p.* 471.
Buiten Haarlem *aan de zandige wegen, en op ruwe plaatſen.*

61. PHLEUM ſpica ovata ciliata, culmo ramoſo. *Sp.* 88. *n.* 4. *Gelr.* 31. *arenarium.*
Gramen typhinum maritimum minus. *Raj. ſyn.* 392. *Pluk alm.* 177. *t.* 33. *f.* 8.
In de Zee-duinen.

ALOPECURUS.

62. ALOPECURUS culmo ſpicato erecto, glumis villoſis, corollis muticis. *Sp.* 88. *n.* 1. *Gelr.* 32. *Friſ.* 30. *Schreb. gram.* 133. *t.* 19. *f.* 1. *pratenſis.*
Gramen phalaroides, ſpica molli ſ. germanicum. *Bauh. pin.* 4. *prodr.* 10.
Gramen myurum, ſpica molli candicance villoſa. *Scheuch. gram.* 70.
Gramen typhoides molle. *Bauh. pin.* 4. *Comm. holl.* 48. *ſecundum Hall. hiſt.* 1539.
Gramen typhoides ſpica anguſtiore. C. B. *Comm. holl.* 48.
Op zandige wegen en ruwe plaatſen, omtrent Haarlem, Zwol, *en elders; ook in Weilanden even buiten* Franeker.

63. ALOPECURUS culmo ſpicato erecto, glumis lævibus. *Sp.* 89. *n.* 2. *agreſtis.*
Alopecurus myoſuroides. *Schreb. gram.* 140. *t.* 19. *f.* 2
Gramen typhoides, ſpica anguſtiore. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 53.
Oed. dan. t. 228.
In de Koornlanden te Maarſſen. (*Nob.* D. FABRICIUS SIX.)

64. ALOPECURUS culmo ſpicato infracto, corollis muticis. *Sp.* 89. *n.* 3. *Gelr.* 33. *geniculatus.*
Gramen aquaticum geniculatum ſpicatum. *Bauh. pin.* 3. *theatr.* 42. *Comm. holl.* 48.
Oed. dan. t. 564.
Veel in de Moeraſſen.

65. ALOPECURUS panicula ſubſpicata, glumis villoſis, corollis ariſtatis. *Sp.* 90. *n.* 5. *paniceus.*

Digitized by Google

Gramen paniceum ſ. Panicum ſylveſtre ſimplici ſpica. *C. B. Comm. holl.* 54.
Gramen alopecurinum minus, ſpica vireſcente divulſa. *Barr. ic.* 115. *f.* 2.
In de Hoven en Moeshoven, en andere bebouwde gronden.
Ill. LINNÆUS *hanc plantam olim ad Cynoſuros retulit, et omnino alia adpoſuit ſynonyma, quæ nunc ad Panicum verticillatum & Panicum viride amandavit; quare ad evitandam confuſionem plura non adduxi ſynonyma.*

M I L I U M.

effuſum. 66. MILIUM floribus paniculatis diſperſis muticis. *Sp.* 90. *n.* 1. *Gelr.* 37. *Friſ.* 31.
Gramen ſylvaticum, panicula miliacea ſparſa. *Bauh. pin.* 8. *theatr.* 141. *Comm. holl.* 55. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 197. *ſ.* 8. *t.* 5. *f.* 10.
Hirs-Gras, Zaad-Gras. Belg.
In den Enck by Harderwyk; *in den* Haarlemmer Hout; *in de Hooilanden om* Utrecht; *en in* Friesland; *ook op veele andere plaatſen in de boſſchen, en by de Wegen.*

A G R O S T I S.

ſpica venti. 67. AGROSTIS petalo exteriore ariſta erecta ſtricta longiſſima, panicula patula. *Sp.* 91. *n.* 1. *Gelr.* 39. *Friſ.* 32.
Gramen ſegetum altiſſimum, panicula ſparſa. C. B. *Comm. holl.* 47. *Scheuch. gram.* 144. *t.* 10. *f.* 3.
In de Koornlanden onder de Haver en Garſt; overvloedig omtrent Heemſtede *in* Holland, *en by* Duirswoude, Haule, Wyſel, Kooten, &c. *in* Friesland.

ſtolonifera. 68. AGROSTIS panicula ramulis patentibus muticis, culmo repente, calycibus æqualibus. *Sp.* 93. *n.* 8. *Gelr.* 38. *Ingr.* 10.
Gramen caninum ſupinum minus. *Scheuch. gram.* 118 *non* C. B.
Veel in de Duinen buiten Haarlem, *en by* Scheveningen.
Ill. HALLERUS *hiſt.* 2. *p.* 223. *ex fide horti ſicci C. B.*

B. monet Gramen caninum ſupinum, *idem eſſe cum* Gramine pratenſi paniculato minore, ſeu Poa annua.

69. AGROSTIS panicula capillari patente, calycibus ſubulatis aequalibus hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis. *Sp.* 93. *n.* 9. *Ingr.* 10. *Stillingfl. miſc. t.* 3. *capillaris.*
Gramen montanum panicula ſpadicea delicatiore. *Baub. pin.* 3. *prodr.* 12. *theatr.* 36. *Scheuch. gram.* 129. *t.* 3. *f.* 5.
Oed. dan. t. 163.
Aan een ſloot langs de Meerburger-Watering *buiten* Leyden; *dog meer aan de ſlooten, loopende bezyden de* Leede *naar de* Zyl. (*Cel.* D. VAN ROYEN.)
In 't Haagſche Boſch; *by* Zorgvliet; *aan de weg tuſſchen* Gouda *en* Bodegrave. (D. RAINVILLE.)
Gramen hocce vel e longinquo ſe prodit herba ſua latiſſima virente, panicula vero purpureo-pulla. (*Cel.* D. VAN ROYEN.)

70. AGROSTIS panicula coarctata mutica, calycibus æqualibus virgineis corolla brevioribus foecundatis duplo longioribus. *Sp.* 1665. *ſylvatica.*
Gramen miliaceum ſylveſtre, glumis oblongis. *Raj. angl.* 3. *p.* 404.
In 't Haagſche-Boſch. (D. RAINVILLE.)

71. AGROSTIS panicula laxa, calycibus muticis æqualibus, culmo repente. *Sp.* 93. *n.* 10. *alba.*
Gramen miliaceum majus, panicula ſpadicea & viridi. *Pet. gram.* 118. 119. *Raj. angl.* 3. *p.* 404.
In 't Haagſche-Boſch, *te* Voorburg. (D. RAINVILLE.)

72. AGROSTIS floſculis oblongis mucronatis, culmo obtecto foliis breviſſimis. *Mant.* 30. *ſerotina.*
Feſtuca ſerotina. *Sp.* 111. *n.* 16.
Gramen loliaceum ſerotinum, panicula diſpanſa. *Segu. ver.* 3. *p.* 146. *t.* 3. *f.* 2.
Te Zorgvliet *by* s' Hage. (D. RAINVILLE.)

AIRA.

73. AIRA panicula patente, corollis muticis lævibus ca- *aquatica.*

Digitized by Google

calyce longioribus, foliis planis. *Sp.* 95. *n.* 6. *Gelr.* 42. *Jngr.* 11.
Gramen caninum ſupinum paniculatum dulce. *Baub. pin.* 1. *prodr.* 2. *theatr.* 13. *Baub. biſt.* 2. *p.* 459. *Comm. boll.* 45.
Oed. dan. t. 381.
In vochtige Bouw- en Weilanden.

ſubſpicata. 74. Aira foliis planis, panicula ſpicata, floſculis medio ariſtatis: ariſta reflexa laxiore. *Sp.* 95. *n.* 7.
Gramen avenaceum paniculatum alpinum humile, locuſtis in ſpicam collectis varicoloribus ariſtatis. *Scheuch. gram.* 221. *Baub. prodr.* 24. *t.* 6.
Oed. dan. t. 228.
Op de Duinen by Hillegom. (D. Rainville.)
Pleræque Airæ ariſtatæ *babent ariſtam dorſalem contortam, adeoque vix genere ab Avena diſtinguenda.*

cæſpitoſa. 75. Aira foliis planis, panicula patente, petalis baſi villoſis ariſtatisque: ariſta recta brevi. *Sp.* 96. *n.* 8.
Gramen ſegetum panicula arundinacea. C. B. *Comm. boll.* 47. *Scheuch. gram.* 244. *t.* 3. *f.* 2. 3.
Oed. dan. t. 240.
Aan de kanten van de Bouw- en Weilanden.

flexuoſa. 76. Aira foliis ſetaceis, culmis ſubnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuoſis. *Sp.* 96. *n.* 9.
Gramen nemoroſum, paniculis albis, capillaceo folio. *Baub. pin.* 7. *prodr.* 14. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 200. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 9.
Oed. dan. t. 157.
Op de Heide by Nymegen; *en overvloedig in den* Haarlemmer-hout, *en in de Duinen by* Haarlem.
Cl. Scheuchzer *Agroſt. p.* 218. *dicit ariſtam prodire ex baſi dorſi exterioris petali; ſed in noſtra planta, ariſta ſupra baſin e dorſo petali exit.*

montana. 77. Aira foliis ſetaceis, panicula anguſtata, floſculis baſi piloſis ariſtatis: ariſta tortili longiore. *Sp.* 96. *n.* 10. *Stillingfl. gram. t.* 4.
Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis. *Baub. pin.* 10. *theatr.* 155. *Comm. boll.* 55.
Overvloedig op de Heide buiten Nymegen *en* Groningen; *ook op* Muiderberg, *en in den* Haarlemmer-hout.

78. Ai-

78. AIRA foliis ſetaceis, ſummo ſpathaceo panicu- *caneſcens.*
lam inferne obvolvente. *Sp.* 97. *n.* 12. *Gelr.* 41.
Gramen foliolis junceis oblongis, radice alba. *Baub. pin.* 5. *theatr.* 72. *Comm. boll.* 49. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 200. *ſ.* 8 *t.* 3. *f.* 10. *Scheuch. gram.* 242. *t.* 4 *f.* 29. 30.
β. Gramen ſparteum variegatum. *Baub. pin.* 5 *theatr.* 72. *Comm boll.* 49.
Op 's Heeren-Loo *by* Harderwyk, *en overvloedig langs 't Voetpad in den* Haarlemmer-hout *naar* Heemſtede, *op koude donkere plaatſen.* β. *In de Duinen niet verre van* Zandvoort.

79. AIRA foliis ſetaceis, panicula divaricata, flori- *caryophyllea.*
bus ariſtatis diſtantibus. *Sp.* 97. *n.* 14. *Stillingſl. miſcell. t.* 5.
Caryophyllus arvenſis glaber minimus. *Baub. prodr.* 105.
Oed. dan. t. 382.
Langs de zandige wegen by Velzen *buiten* Haarlem. (D. FABRICIUS SIX.) *In de Duinen by* 's Gravenhage *omtrent* Langenhorſt. (*Hortulanus* MEERBURG.)

M E L I C A.

80. MELICA panicula coarctata, floribus cylindricis. *cærulea.*
Mant. 335.
Aira cærulea. *Sp* 95. *n.* 3. *Friſ.* 33. *Belg.* 64.
Gramen arundinaceum enode minus ſylvaticum. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 97.
Oed. dan. t. 239.
In de Duinen en Weilanden by Velzen; *veel in vochtige landen by den* Yſſel *in 't Graafſchap* Zutphen, *en aan de gemeene wegen en velden zo op de* Kley, *als in de* Wouden *in* Friesland.

P O A.

81 POA panicula diffuſa, ſpiculis ſexfloris lineari- *aquatica.*
bus. *Sp.* 98. *n.* 1. *Gelr.* 44. *Friſ.* 34.
Gramen paluſtre paniculatum altiſſimum. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 38. *Comm. boll.* 47. *Scheuch. gram.* 191. *t.* 4. *f.* 1.
Aan de kanten van Vaarten, Graften en Slooten, en

in natte Landen op zeer veele plaatſen.

trivialis. 82. Poa panicula diffuſa, ſpiculis trifloris baſi pubeſcentibus, culmo erecto tereti. *Sp.* 99. *n.* 4. *Gelr.* 613.
Gramen pratenſe paniculatum medium. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 30. *Comm. boll.* 47.
In de Weilanden.
Variat altitudine ratione ſoli.

anguſtifolia 83. Poa panicula diffuſa, ſpiculis quadrifloris pubeſcentibus, culmo erecto tereti. *Sp.* 99. *n.* 5. *Gelr.* 614.
Gramen pratenſe paniculatum majus, anguſtiore folio. *Baub. pin.* 2. *prodr* 5. *theatr.* 29.
Gemeen in de Weilanden en by de wegen.
Variat longitudine culmorum, foliis lævibus aut aſperis; culmis foliis & glumis viridibus aut purpureis.

pratenſis. 84. Poa panicula diffuſa, ſpiculis quinquefloris glabris, culmo trecto tereti. *Sp.* 99. *n.* 6. *Gelr.* 611. *Jngr.* 12. *Friſ.* 35.
Gramen pratenſe paniculatum majus latiore folio, Poa theophraſti. *Baub. pin.* 2. *Comm. boll.* 47.
Eerſt of gemeen Beemdt-Gras. Belg.
Niets gemeener in vette Weilanden.
Variat magnitudine & craſſitie omnium partium.

annua. 85. Poa panicula diffuſa angulis rectis, ſpiculis obtuſis, culmo obliquo compreſſo. *Sp.* 99. *n.* 7. *Gelr.* 612. *Friſ.* 36.
Gramen pratenſe paniculatum minus. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 31. *Comm. boll.* 47. *Scheucb. gram.* 189. *t.* 3. *f.* 17. *E.*
Stillingfl. t. 7.
Zeer veel langs de Wegen en Paden, en aan Wallen, en tuſſchen de Steenen der Straaten.

compreſſa. 86. Poa panicula coarctata ſecunda, culmo obliquo compreſſo. *Sp.* 101. *n.* 16. *Gelr.* 610. *Friſ.* 37.
Gramen murorum, radice repente. *Baub. pin.* 2. *prodr.* 2. *Comm. boll.* 46.
Gramen paniculatum, radice repente, culmocompreſſo. *Vaill. par.* 91. *n.* 63. *t.* 18. *f.* 5.
Aan 't Huis te Brederode *in Holland, en elders op oude*

Digitized by Google

oude muuren en ſteenachtige plaatſen; ook aan drooge wallen en wegen buiten Franeker.

87. Poa panicula coarctata, calycis altera valvula duplo longiore, ſurculis proſtratis. *maritima.*

Te Delfzyl *op de Wallen, en noch meer op het Zand langs den* Dollart. (D. Rainville.)

E Radice *fibroſa plures prodeunt ſurculi articulati, ſæpe geniculati, humi proſtrati, ad ſummum usque ſtriatis foliorum vaginis veſtiſti.* Folia *oblongo-lanceolata ſtriata.* Culmus *terminatur panicula oblonga, cujuſ rami ante floreſcentiam culmo approximantur, tempore floreſcentiæ ad angulum rectum recedunt, & poſt foecundationem ſæpe verſus radicem reflectuntur.* Paniculæ *rami ſunt bini & alterni; quandoque tertius adeſt ramulus brevius pedunculatus.* Glumæ *margine ſcariſſæ.* Calyx 6-12 *florus.*

Gramen huic omnino ſimile, eodemque nomine inſignitum, ſed aliunde allatum Clar. D. Banks *dedit* D*no* Rainville.

88. Poa panicula attenuata, ſpiculis ſubbifloris mucronatis ſcabris, culmo incurvo. *Sp.* 93. *n.* 18. *nemoralis.*

Gramen paniculatum anguſtifolium alpinum, locuſtis rarioribus & anguſtioribus non ariſtatis. *Scheuch. gram.* 164. *t.* 2.

In de Velden buiten Nymegen; *ook op de Muuren van de Kerk te* Perſingen. (D. Rainville.)

Calyx 2, 3, 4, 5 *florus.*

89. Poa panicula patentiuſcula ſecunda, ſpiculis quadrifloris. *Sp.* 102. *n.* 19. *bulboſa.*

Gramen arvenſe, panicula criſpa. *Bauh. pin.* 3. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 162. *n.* 6. *Barr. ic.* 703.

Gramen cum panicula molli rubente. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 464.

† *Volgens* Boerhaave.

90. Poa panicula ſpicata, floribus ſubulatis, floſculis remotis. *Mant.* 32. *ſpicata.*

Op de Wallen en onder aan de Muuren in 't Zand te Delfzyl *aan den* Dollart; *ook by* Franeker. (D. Rainville.)

91. Poa panicula ſpicata, calycibus ſubpiloſis ſubqua- *criſtata.*

Digitized by Google

quadrifloris pedunculo longioribus, petalis ariſtatis. *Syſt.* 94.
Aira *criſtata Sp.* 94. *n.* 2.
Gramen ſpica criſtata ſubhirſutum. *Baub. pin.* 13. *prodr.* 8. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 194. *ſ.* 8. *t.* 4. *f.* 7.
Gemeen in de Duinen *by* 's Hage, Hillegom, Haarlem.

B R I Z A.

media. 92. Briza ſpiculis ovatis, calyce floſculis (7) breviore. *Sp.* 103. *n.* 3. *Gelr.* 48.
Gramen tremulum majus. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 22.
Oed. dan. t. 258.
Trillend-Gras. Belg.
Veel op zandige plaatſen by 't Huis te Dorth *in 't Graafſchap* Zutphen; *by* Wageningen; *en buiten* Alkmaar *tuſſchen* Egmond op den Hoef *en* Bergen.

D A C T Y L I S.

glomerata. 93. Dactylis panicula ſecunda glomerata. *Sp.* 103. *n.* 2. *Gelr.* 47. *Friſ.* 38. *Schreb. gram.* 68. *t.* 8. *f.* 2.
Gramen ſpicatum, folio aſpero. *Baub. pin.* 3. *prodr.* 9. *theatr.* 45. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 202. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 38.
Op de Wallen te Amſterdam, Wyk by Duurſtede, Zwol, *en aan drooge Wallen en kanten van Koornvelden om* Franeker, *en op andere plaatſen.*

C Y N O S U R U S.

criſtatus. 94. Cynosurus bracteis pinnatifidis. *Sp.* 105. *n.* 1. *Friſ.* 39. *Schreb. gram.* 69. *t.* 8. *f.* 1.
Gramen pratenſe criſtatum ſ. ſpica criſtata. *Baub. pin.* 2. *prodr.* 8. *theatr.* 42. *Comm. boll.* 48.
Oed. dan. t. 238.
Stillingfl. miſc. t. 11.
Buiten Haarlem, *in de zandige Weilanden aan het* Spaarne; *ook veel in* Friesland.

F E S T U C A.

ovina. 95. Festuca panicula ſecunda coarctata ariſtata, cul-

Digitized by Google

culmo tetragono nudiuſculo, foliis ſetaceis. *Sp.* 108. *n.* 1. *Gelr.* 43. *Friſ.* 41.
Gramen foliis junceis brevibus majus, radice nigra. *Baub. pin.* 5. *prodr.* 24.
Gramen foliolis junceis brevibusminus. C. B. *Comm. boll.* 50.
Gramen criſtatum, radiculis nigricantibus. *Loeſ. pruſſ.* 110. t. 24.
Stillingfl. miſc. t. 8.
Amelands - Gras. Friſiis.
Veel op de Heide buiten Nymegen, Harderwyk, Naarden, &c. *op dorre zandige plaatſen in het Veld aan den* Haarlemmer - hout; *aan de Zee - kuſt in* Friesland; *en veel in dorre Zandgronden op* Ameland.
Ariſtæ floſculorum fragiles, poſt foecundationem evaneſcunt.
Culmus in juniori planta ſtriatus, hiſpidus, in adultiori cylindricus & lævis eſt.

96. FESTUCA panicula ſecunda oblonga, ſpiculis oblongis lævibus, foliis ſetaceis, *Sp.* 108. *n.* 3. *duriuſcula.*
Gramen foliolis junceis brevibus minus. *Baub. pin* 5.
Gramen pratenſe, panicula duriore laxa unam partem ſpectante. *Raj. hiſt.* 1286. *angl.* 3. *p.* 413. *t.* 19. *f.* 1.
Langs de Meerburger - Watering *tegens de Kaadyk, en aan de Vliet by* Lammen *buiten* Leyden. (*Cel.* D. VAN ROYEN.) *tuſſchen het Gras by het Huis te* Zwieten. (Hortulanus MEERBURG.)

97. FESTUCA panicula ſpicata, calycibus minutiſſimis muticis, floribus ſcabris: ariſtis longis. *Sp.* 109. *n.* 8. *Myurus.*
Gramen avenaceum murorum, ſpica longiſſima nutante ariſtata. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 215. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 43.
Zeer gemeen te Leyden *op de Stads - muur tuſſchen de Witte en Koepoorten.* (*Cel.* D. VAN ROYEN.) *op Zandige plaatſen by* Nymegen. (D. RAINVILLE)

98. FESTUCA panicula erecta, ſpiculis ſubovatis muticis, calyce floſculis majore, culmo decumben- *decumbens.*
te

te. *Sp.* 110. *n.* 12.
Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non ariſtatis. *Raj. angl.* 3. *p.* 408. *hiſt.* 1288. *Pluk. alm.* 174. *t.* 34. *f.* 1.
Oed. dan. t. 162.
In het Zand tuſſchen Nymegen *en* Hulſen; *ook by* Franeker. (D. RAINVILLE.)

elatior. 99. FESTUCA panicula ſecunda erecta, ſpiculis ſubariſtatis: exterioribus teretibus. *Sp.* 111. *n.* 13. *Friſ.* 43. *Schreb. gram.* 34. *t.* 2.
Gramen loliaceum, ſpica diviſa, pratenſe majus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 183. *ſ.* 8. *t.* 2. *f.* 15.
Menigvuldig in Weilanden en langs de Wegen.

fluitans. 100. FESTUCA panicula ramoſa erecta, ſpiculis ſubſeſſilibus teretibus muticis *Sp.* 111. *n.* 14. *Gelr.* 46. *Friſ.* 42. *Schreb. gram.* 37. *t.* 3.
Gramen aquaticum fluitans, multiplici ſpica. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 41. *Comm. holl.* 48.
Stillingfl. miſc. t. 20.
Oed. dan. t. 237.
Vlot-Gras. Belg.
In ſtilſtaande Wateren en Slooten op veele plaatſen.

BROMUS*.

ſecalinus. 101. BROMUS panicula patente, ſpiculis ovatis, ariſtis rectis, ſeminibus diſtinctis. *Sp.* 112 *n.* 1.
α. Feſtuca graminea, glumis hirſutis. *Bauh. pin.* 9. *theatr.* 143. *Comm. holl.* 37. *Scheuch. gram.* 250.
Dravik. Belg.
β. Bromus (hordeaceus) panicula erecta coarctata. *Sp.* 1. *p* 77. *n* 8. *Friſ.* 45.
α. *Gemeen in de Koornlanden onder de Rogge en Haver.* β. *Aan hooge drooge Wallen op veele plaatſen.*

mollis. 102. BROMUS panicula erectiuſcula, ſpicis ovatis pubeſcentibus, ariſtis rectis, foliis molliſſime villoſis. *Sp.* 112. *n.* 2. *Schreb. gram.* 60. *t.* 6.
Gramen avenaceum pratenſe, panicula ſquamata &

* *Genus hoc difficulter diſcernendum ſummo ſtudio extricavit Cl.* C. E. WEIGEL, *Medicus Suudenſis. Obſerv. botan. Gryphiæ.* 1772. 4°.

& villoſa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 213. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 18.
In meenigte omtrent Amſterdam, *vooral buiten de Muiderpoort aan den Zee-dyk.* (*Nob.* D. FABRICIUS SIX.)

103. BROMNUS panicula patula, ſpiculis oblongis diſtichis, glumis ſubulato-ariſtitatis. *Sp.* 113. *n.* 6. *ſterilis.*
Feſtuca avenacea ſterilis elatior. *Baub. pin.* 9. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 212. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 11.
In den Haarlemmer-hout, *en aan den Weg tuſſchen* 'sHage *en* Voorburg.

104. BROMUS panicula nutante, ſpiculis ovato-oblongis. *Sp.* 113. *n.* 7. *Gelr.* 50. *arvenſis.*
Feſtuca graminea, juba effuſa. *Baub. pin.* 9. *prodr.* 19. *Scheuch. gram* 262. *t.* 5. *f.* 15.
Feſtuca avenacea ſterilis elatior ſeu Bromos dioſcoridis. C. B. *Comm. holl.* 37.
Oed. dan. t. 293.
Naakte of Ydele Haver. Belg.
In de Zaailanden onder de Haver en Garſt.

105. BROMUS panicula nutante, ſpiculis linearibus. *Sp.* 114. *n.* 8. *tectorum.*
Feſtuca avenacea ſterilis, ſpicis erectis. *Raj. angl.* 3. *p.* 413. *Pluk. alm.* 174. *t.* 299. *f.* 2.
Feſtuca avenacea ſterilis, pediculis brevioribus & ſpicis erectis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 212. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 13.
Op de daken der boere-wooningen, op oude muuren en dorre plaatſen, veel omtrent Haarlem, *en te* Zutphen.

106. BROMUS panicula nutante, ſpiculis quadrifloris: ariſtis brevioribus. *Sp.* 114. *n.* 12. *Schreb. gram.* 88. *t.* 11. *giganteus.*
Gramen ſylvaticum glabrum, panicula recurva. *Vaill. par.* 93. *t.* 18. *f.* 3.
Hier en daar in 't Haagſche-Boſch. (*Cel.* D. VAN ROYEN.) *by het Huis ten* Donk *te* Overmaas, *en op* Boſchjes-Eiland *by* Rotterdam. (D. RAINVILLE.)

107. BROMUS racemo ſimpliciſſimo, pedunculis unifloris, floribus ſexfloris lævibus ariſtatis. *Sp.* 114. *n.* 13. *racemoſus.*

Fe-

Feſtuca avenacea ſpicis ſtrigoſioribus e glumis glabris compactis. *Raj. angl.* 3. *p.* 414.
Op de Wallen te Nymegen. (D. Rainville.)

pinnatus 108. Bromus culmo indiviſo, ſpiculis alternis ſubſeſſilibus teretibus ſubariſtatis. *Sp.* 115. *n.* 14. *Gelr.* 51.
Gramen, ſpica brizæ, majus. *Baub. pin.* 9. *prodr.* 19. *theatr.* 133. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 477. *Comm. holl.* 55.
Oed. dan. t. 164.
In de zandige Weilanden by den Haarlemmer-hout, *en elders.*

A V E N A.

elatior. 109. Avena paniculata, calycibus bifloris, floſculo hermaphrodito ſubmutico, maſculo ariſtato. *Sp.* 117. *n.* 2. *Gelr.* 55. *Schreb. gram.* 25. *t.* 1.
Gramen nodoſum, avenacea panicula. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 18. *Scheuch. gram.* 239. *t.* 4. *f.* 27. 28.
Oed. dan. t. 165.
Op verſcheide plaatſen in de Velden onder andere Graſen.

loeflingiana 110. Avena panicula contracta, floſculis binis, altero pedunculato, apice biariſtatis, dorſo ariſta reflexa. *Sp.* 118. *n.* 4.
Overvloedig in 't Haagſche-Boſch *onder de boomen; en op de Duinen, by 't Dorp* Hillegom; *alwaar het Zand met moſch bedekt is.* (D. Rainville.)
Planta noſtra omnibus characteribus convenit cum deſcriptione ab Ill. Linnæo *in Spec. plant. data, ſed major eſt, interdum ſpithamæ longitudine.*

nuda. 111. Avena paniculata, calycibus trifloris receptaculo calycem excedente, petalis dorſo ariſtatis, tertio floſculo mutico. *Sp.* 118. *n.* 6.
Avena nuda. *Baub. pin.* 23. *Dod. pempt.* 511. *Comm. holl.* 15. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 209. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 4.
Naakte Haver. Belg.
Buiten Haarlem *aan den weg naar* Overveen.
Locum creſcendi ex Commelino mutuavi, ſed ego ibidem

Digitized by Google

dem eam non vidi: et an vere indigena apud nos ſit, dubito.

112. AVENA paniculata, calycibus ſubtrifloris, floſculis omnibus ariſtatis, receptaculis barbatis. *Mant.* 34. *ſeſquitertia.*
Gramen pratenſe villoſum panicula denſa ex argenteo dilute ſpadicea ſ. fuſca. *Scheuch. gram.* 220. *t.* 4. *f.* 17. A. B.
By Haarlem. (D. RAINVILLE.)
Ill. HALLERUS *hiſt.* 1497. *habet pro Varietate Avenæ flaveſcentis.*

113. AVENA paniculata, calycibus trifloris, floſculis omnibus ariſtatis baſi piloſis. *Sp.* 118. *n.* 7. *Gelr.* 54. *Schreb. gram.* 109. *t.* 15. *fatua.*
Feſtuca utriculis lanugine flaveſcentibus. *Bauh. pin.* 10. *theatr.* 149. *Comm. holl.* 37.
Onder de Rogge, Haver en Garſt; als ook in de Tabaks-landen.

114. AVENA panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, floſculis omnibus ariſtatis. *Sp.* 118. *n.* 9. *Schreb. gram.* 72. *t.* 9. *flaveſcens.*
Gramen avenaceum ſpica ſparſa flaveſcente, locuſtis parvis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 215. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 42.
In de Heide by Nymegen, *en op de Muur van den Hoogendyk by* Rotterdam. (D. RAINVILLE.)

LAGURUS.

115. LAGURUS ſpica ovata ariſtata. *Sp.* 119. *n.* 1. *Schreb. gram.* 143. *t.* 19. *f.* 3. *ovatus.*
Alopecuros genuina. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 191. *ſ.* 8. *t.* 4. *f.* 1.
Gramen alopecuroides, ſpica rotundiore. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 56. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 158. *n* 7.
† *Volgens* BOERHAAVE.

ARUNDO.

116. ARUNDO calycibus quinquefloris, panicula laxa. *Sp.* 120. *n.* 3. *Gelr.* 56. *Friſ.* 48. *phragmites*
Arundo vulgaris ſ. phragmites dioſcoridis. *Bauh.*

pin.

pin. 17. Comm. holl. 13.
Arundo vulgaris paluſtris. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 485. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 218. *ſ.* 8. *t.* 8. *f.* 1.
Gemeen Riet of Dek-Riet. Belg.
Overvloedig langs de Rivieren, Meiren, Vaarten, Graften en Slooten, en in veele laage Landen.

epigejos. 117. Arundo calycibus unifloris, panicula erecta, foliis ſubtus glabris. *Sp.* 120. *n.* 4.
Gramen montanum, panicula flaveſcente, modo ariſtata, modo ariſtis carente. *Mont. gram.* 58. *f.* 86.
In de Duinen buiten 's Hage *tuſſchen de Helm.* (Hortul. Meerburg.)

Calamagroſtis. 118. Arundo calycibus unifloris lævibus, corollis lanuginoſis, culmo ramoſo. *Sp.* 121. *n.* 5.
Gramen arundinaceum, panicula molli ſpadicea, majus. *Baub pin.* 7. *theatr.* 94. *Comm. holl.* 52. *Scheuch. gram.* 222. *t.* 3. *f.* 5.
Oed. dan. t. 280.
Pluim-Riet-Gras. Belg.
In vette vogtige Akkers en Velden by Delft, *en in de* Betuwe; *ook te* Zorgvliet *by* 's Gravenhage.
Variat magnitudine & craſſitie totius plantæ, tum & colore paniculæ viridi, purpureo, rubiginoſo &c.

arenaria. 119. Arundo calycibus unifloris, foliis involutis mucronato-pungentibus. *Sp.* 121. *n.* 6. *Gelr.* 18. *Friſ.* 49.
Gramen ſparteum ſpicatum, foliis mucronatis longioribus ſ. ſpica ſecalina. *Baub. pin.* 5. *theatr.* 67. *Comm. holl.* 49.
Helm. Belg.
β. Gramen ſparteum ſpicatum latifolium. *Baub. pin.* 5. *theatr.* 68. *Comm. holl.* 49.
Duin-Helm. Belg.
γ. Gramen ſparteum ſpicatum, foliis mucronatis breviorisbus. *Baub. pin.* 5. *Comm. holl.* 49.
δ. Gramen ſparteum ſ. Spartum maximum maritimum hollandicum, ſpica ſecalina. *Raj. hiſt.* 1260. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 180.
Op veele plaatſen in de Zee- en Binnen-Duinen. β. *Digt aan het Zee-ſtrand by* Zandvoort, *op de* Dui-

Duinen; *als ook in 't* Aanſtooter-Zand *op de* Veluwe. γ. *By en onder de voorige by* Heemſtede *in de Duinen.* δ. *By* Scheveningen. *Vide Moriſ. l. c.*

Habitat etiam hæc planta in mari prope Stauriam Friſiæ, ubi habetur pro Tritico ſterili, quod fabulantur ortum eſſe ex frumento luxurioſe ibidem in mare projecto. Vide, ſi lubet, Chr. Schotani Kerkelyke en Weereldlyke Geſchiedenisſen van Friesland, VI. Boek, p. 195. F. Sjoerd's Hiſtor. Jaarboeken van Friesland. I. Deel. p. 94. en II. Deel. p. Nieuwe Vaderlandſche Letteroeff. III. Deel. p. 552.

Magni uſus in Belgio planta ad domandam dunarum arenam mobilem.

L O L I U M.

120. Lolium ſpica mutica: ſpiculis compreſſis multifloris. *Sp.* 122. *n.* 1. *Gelr.* 60. *Friſ.* 50. *perenne.*

Gramen loliaceum, anguſtiore folio & ſpica. *Baub. pin.* 9. *theatr.* 127. *Comm. boll.* 53. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 182. *ſ.* 8. *t.* 2. *f.* 2.

Muiſen-Koorn. Belg.

β. Gramen loliaceum majus, ſpicis rarius diſpoſitis. *Park. theatr.* 1146. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 182. *ſ.* 8. *t.* 2. *f.* 2. *a.*

Gramen loliaceum majus, ſpicis longius diſtantibus. *Tourn. inſt.* 516.

γ. Gramen loliaceum ſpicis brevioribus & latioribus compreſſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 182. *ſ.* 8. *t.* 2. *f.* 2. *b.*

Gramen loliaceum ſpica lata ex plurimis ſpicis duplice verſis diſpoſitis conſtante. *Scheucb. gram. t.* 1. *f.* 7 *D.*

δ. Gramen loliaceum, ſ. Phoenix multiplici ſpicata panicula. *Park. theatr.* 1145. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 182. *ſ.* 8. *t.* 2. *f.* 2. *c.*

Gramen loliaceum, panicula multiplici & ſpicata. *Tourn. inſt.* 516.

In de Zaailanden en langs de Wegen zeer menigvuldig. β. *Veel in de Weilanden om* Rotterdam. γ. *Gemeen op de Dyken aldaar.* δ. *Op vochtige en ſchaduwagtige plaatſen, alwaar een vette grond is.*

Nullum in Belgio eſt Gramen, quod tot admittit va-

varietates luſusque naturæ, quam boc Lolium perenne. Variat foliis latioribus & anguſtioribus; ſpica latiore, ſtrictiore, bifida, paniculata; ſpiculis craſſioribus, tenuioribus, longioribus, brevioribus, ovatis, obtuſis, aggregatis, ſimplicibus, oppoſitis, verſus unum latus intortis ſeu veluti ſecundis; calyce ſpiculam æquante aut ſuperante, aliisque vix definiendis modis. Præcipuas harum varietatum, numero ſexdecim, mecum communicavit D. RAINVILLE, *qui et ad me miſit Gramen a ſe lectum in muro vetuſto aggeris alti prope Villam* Donk *extra* Rotterodamum, *quod facie ſuâ exteriore Lolio perenni quam ſimillimum eſt, ſed calyce bivalvi et floſculis ſubſeſſilibus inſtructum, adeoque ad Feſtucas referendum: an boc ſit nova Feſtucæ ſpecies, vel planta bybrida ex patre Lolio perenni et matre forte Feſtuca quadam, ulterius inquirendum.*

tenue. 121. LOLIUM ſpica mutica tereti: ſpiculis trifloris. *Sp.* 122. *n.* 2.

Graminis loliacei anguſtiore folio & ſpica varietas. *Baub. pin.* 9. ſpica tereti anguſtiſſima. *Scheucb. gram.* 28.

Te Nymegen *op de Wallen onder de groote boomen in de ſchaduwe.* (D. RAINVILLE.)

temulentum. 122. LOLIUM ſpica ariſtata: ſpiculis compreſſis multifloris. *Sp.* 122. *n.* 3. *Gelr.* 59. *Friſ.* 51.

Gramen loliaceum, ſpica longiore, ſ. Lolium dioſcoridis. *Baub. pin.* 9. *theatr.* 121. *Comm. boll.* 53. *Scheucb. gram.* 31. *t.* 1. *f.* 7. *E. F.*

Oed dan. t. 160.

Dolyk. Belg.

In de Koorn-landen tuſſchen de Haver en 't Vlas.

ELYMUS.

arenarius. 123. ELYMUS ſpica erecta arcta, calycibus tomentoſis floſculo longioribus. *Sp.* 122. *n* 1.

Triticum foliis acuminatis pungentibus. *Roy. lugdb.* 71.

Gramen caninum maritimum, ſpica triticea noſtras. *Raj. biſt.* 1256. *Scheucb. gram.* 6.

Zee-Haver. Gelris.

Over-

Overvloedig aan de Zeekant by Harderwyk, *en in de Zee-Duinen van* Holland.

An huc referendum Gramen caninum maritimum ſpicatum C. B. & Gramen caninum maritimum ſpica foliacea. C. B. *Comm. holl.* 46? *ſed ſynonymum I. B. et nomen belgicum obſtat.*

HORDEUM.

124. HORDEUM floſculis lateralibus maſculis ariſtatis, involucris intermediis ciliatis. *Sp.* 126. *n.* 6. *Gelr.* 66. *Friſ.* 53. *murinum.*

Gramen hordeaceum minus & vulgare. *Baub. pin.* 8. *theatr.* 134. *Comm. holl.* 54.

Gramen ſecalinum vulgatiſſimum viarum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 179. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 4.

Baſtard-Garſt. Belg.

β. Gramen ſpicatum ſecalinum minus. *Scheucb. gram.* 17. *Vaill. par.* 83. *t.* 17. *f.* 6.

Overvloedig langs de wegen, paden, muuren, aan hooge drooge Wallen, en in dorre Weilanden.

TRITICUM.

125. TRITICUM calycibus quadrifloris ventricoſis villoſis imbricatis obtuſis. *Sp.* 126. *n.* 3. *turgidum.*

Triticum ſpica villoſa quadrata breviore & turgidiore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 175. *ſ.* 8. *t.* 1. *f.* 8.

In en om Nymegen *op verſcheide plaatſen.*

126. TRITICUM calycibus quinquefloris truncatis, foliis involutis. *Sp.* 128. *n.* 8. *junceum.*

Gramen anguſtifolium ſpica tritici muticæ ſimili. *Baub. pin* 9. *theatr.* 132. *prodr.* 18. *t.* 17. *Scheucb. gram.* 7. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 156. *n.* 2.

In de Duinen by Scheveningen.

127. TRITICUM calycibus quadrifloris ſubulatis acuminatis, foliis planis. *Sp.* 128. *n.* 9. *Gelr.* 61. *Friſ.* 56. *repens.*

Gramen caninum arvenſe ſ. Gramen dioſcoridis. *Baub. pin.* 1 *Comm. holl.* 45. *Scheucb. gram.* 5.

Gramen caninum repens vulgatius. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 178. *ſ.* 8. *t.* 1. *f.* 8.

Honds-Gras, Leed-Gras, Lidt-Gras, Puin-

 Gras,

Gras, *Peen-Gras*, *Kruip-Koorn*, *Queeck*. Belg.

β. Gramen latifolium ſpica triticea latiore compacta. *Baub. pin* 8. *prodr.* 17. *theatr.* 31. *Comm. boll.* 54. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 177. *ſ.* 8. *t.* 1. *f.* 1. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 156. *n.* 2.

γ. Gramen maritimum vulgato canario ſimile. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 178. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 156. *n.* 7.

δ. Gramen geniculatum parvum arenoſum aggerum maritimorum Zelandiæ, longius radicatum. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 178. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 156. *n.* 8.

Gemeen in de Bouw-landen en Hoven. β. *Aan de kanten der Bouw-landen op verſcheide plaatſen.* γ. *Aan de Zee-dyk, en ook wel tuſſchen de Balſteenen genoegzaam in Zee, niet verre van* Ropta-Zyl *in* Friesland. δ. *Aan de Zee-dyken in* Zeeland.

Pharm. GRAMINIS *rad. berb.*

Variat magnitudine & craſſitie totius plantæ, ariſtis longioribus & brevioribus, numeroque floſculorum in ſingula ſpicula.

caninum. 128. TRITICUM calycibus quadrifloris ſubulatis ariſtatis. *Sp. edit.* 1. *p.* 86.

Triticum radice perenni, ſpica ſubnutante, ſpiculis erectis: ariſtis longiſſimis. *Schreb. ſpicileg. p.* 51.

Elymus ſpica nutante arcta, ſpiculis rectis involucro deſtitutis, infimis geminis. *Sp. edit.* 2. *p.* 124.

Gramen caninum non repens elatius, ſpica ariſtata. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 177. *ſ.* 8. *t.* 1. *f.* 2. *Buxb. cent.* 4. *p.* 29. *t.* 50.

Gramen loliaceum radice repente ſ. Gramen officinarum, longioribus ariſtis donatum. *T. Vaill. par.* 81. *t.* 17. *f.* 2.

Veel aan de kanten der Slooten om Rotterdam, Utrecht, Franeker, *en elders.*

Ob ſpiculas inferiores geminas boc Gramen Ill. LINNÆUS *a Triticis removit, & ad Elymos amandavit; potiori vero jure inter Tritica relinquendum eſſe ſentio, quippe Doctiſſimus Botanicus.* D. RAINVILLE *in literis ad me datis, teſtatur ſe inter numeroſas quas examinavit bujus ſpeciei plantas, nequidem unicam reperiſſe, quæ characterem eſſentialem Elymi babebat; neque unquam plures, quam unam*

unam alteramve ſupra eandem plantam, ſpicas, quæ geminas ſeu combinatas ferebant ſpiculas, basque non ſemper inferiores, ſed modo in medio, modo verſus ſummitatem ſpicæ poſitas, absque ulla certa lege, ſicuti idem non raro in Lolio perenni videre eſt. Imo Cl. SCHREBERUS *numquam ſpiculas geminas ſe vidiſſe ait, ſed ſemper aliquantulum diſtantes, ſpicamque raram efficientes.*

TRIGYNIA.

MONTIA.

129. MONTIA. *Sp.* 129. *n.* 1. *Friſ.* 58.
Montia aquatica minor. *Mich. gen.* 18. *t.* 13. *f.* 2.
Portulaca arvenſis. *Baub. pin.* 288.
Oed. *dan. t.* 131.
Te Heemze *by* Zwol, *en elders in Slooten, waar in weinig water is; op natte en ſchaduwachtige plaatſen in de Wouden, op Zand- on Veen-gronden, omtrent de* Joure *en* Donkerbroek, *en digt by de Rivier de* Kuinder *of* Tjonger *in* Friesland; *op Veengronden by* Groningen.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

GLOBULARIA.

vulgaris. 130. Globularia caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis; caulinis lanceolatis. *Sp.* 139. *n.* 3. *Gelr.* 67.
Scabioſa, bellidis folio, humilis, Globularia dicta, caule folioſo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 51. *ſ.* 6. *t.* 15. *f.* 46.
Bellis cærulea, caule folioſo. *Baub. pin.* 262.
By 's Gravenhage *in de Duinen tuſſchen de Heide; by* Zwol *achter den* Kranenberg, *en te* Heemze.

DIPSACUS.

fullonum. 131. Dipsacus foliis ſeſſilibus ſerratis. *Sp.* 140. *n.* 1. *Gelr.* 68. *Friſ.* 59.
Dipſacus ſylveſtris aut Virga paſtoris major. *Baub. pin.* 385. *Comm. boll.* 31. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 158. *ſ.* 7. *t.* 36. *f.* 3.
Kaarden, Kannewaſſers. Belg.
Aan de Dyken en Wegen in de Betuwe, *by* Zutphen, Harderwyk, Naarden, Muiderbergh, Overſchie, Velzen, Cuylenborg, Leerdam, Utrecht, Jutphaas, Zwol; *by* Haren *buiten* Groningen; *achter* 's Gravezande *langs de Zee- en Maas-dyk, en op Staalduin.*

132. Dip-

132. DIPSACUS foliis petiolatis appendiculatis. *Sp.* 141. *n.* 3. *Gelr.* 69. *piloſus.*
Dipſacus ſylveſtris, capitulo minore, vel Virga paſtoris minor. *Baub. pin.* 385. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 158. *ſ.* 7. *t.* 30. *ſ.* 5.
In de Fortificatien om Arnhem; *ook buiten* Naarden *en* Utrecht *by de voorgaande.*

SCABIOSA.

133. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Sp.* 142. *n.* 6. *Gelr.* 71. *Friſ.* 60. *Succiſa.*
Succiſa glabra. *Baub. pin.* 269. *Cam. boll.* 108.
Succiſa ſ. Morſus diaboli. *Cam. epit.* 397.
Oed. dan. t. 279.
Duivels-beet. Belg.
β. Succiſa birſuta. *Baub. pin.* 269.
Veel in de Weilanden tuſſchen Harderwyk *en* 's Heeren-Loo; *in 't* Clarenbeekſche-Boſch *by* Arnhem, *in de Duin-Valeyen en Velden by* 's Hage, Brederode, Alkmaar, Utrecht; *op Heivelden in* Friesland; *by* Haren *buiten* Groningen; *en op meer andere plaatſen.*
Pharm. SCABIOSÆ SUCCISÆ ſ. MORSUS DIABOLI. *rad. herb.*
Variat corollis cæruleis, albis & carneis. Folia plerumque integra, rarius laciniata.

134. SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis inciſis, caule hiſpido. *Sp.* 143. *n.* 10. *Gelr.* 70. *arvenſis.*
Scabioſa pratenſis hirſuta. *Baub. pin.* 269. *Comm. boll.* 103.
Scabioſa major communior hirſuta, folio laciniato. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 45. *ſ.* 6. *t.* 13. *f.* 1.
Oed. dan. t. 447.
Schurft Kruid. Belg.
β. Scabioſa major communior hirſuta, folio non laciniato latifolia. *Baub. biſt* 3. *p.* 2. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 129.
Aan de kanten der Akkers en Zaai-landen by Zutphen, Harderwyk, Zwol, Groningen; *te* Dartḣuiſen *en* Leerzum *in de Provincie* Utrecht; *in de Duinen by* 's Hage, Velzen, Overveen; *en elders.*

Pharm. Scabioſæ *herb.*

columbaria. 135. Scabioſa corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis ſetaceis. *Sp.* 134. *n.* 12. *Friſ.* 61.
Scabioſa, capitulo globoſo, major. *Baub. pin.* 270.
Scabioſa minor. *Cam. epit.* 711.
Oed. dan. t. 314.
Middel-Scabieuſe, of *Schaaps-Scabieuſe*, Belg.
In Frieſland *by de Scabioſa Succiſa.* (Meese.)

ASPERULA.

cynanchica. 136. Asperula foliis quaternis linearibus: ſuperioribus oppoſitis, caule erecto, floribus quadrifidis. *Sp.* 151. *n.* 6.
Gallium album minus. *Tabern. hiſt.* 433. *t.* 433. *f.* 2. *Comm. holl.* 43.
Wit-Walſtroo. Belg.
Aan de kanten van de zandige Bouw-landen by Velzen *buiten* Haarlem; *by* Zwol; *en op de Stads-muuren te* Utrecht.

GALIUM.

paluſtre. 137. Galium foliis quaternis obovatis inæqualibus, caulibus diffuſis. *Sp.* 153. *n.* 3. *Gelr.* 71. *Friſ.* 62.
Gallium paluſtre album. *Baub. pin.* 335. *Comm. holl.* 43.
Oed. dan. t. 423.
Water-Walſtroo. Belg.
Aan de kanten van de Sypel by Harderwyk; *aan ſtilſtaande Slooten, in waterachtige Velden, en moeraſſige Veen-gronden buiten* Amſterdam, Haarlem, Utrecht, Zwol, Groningen; *in de Wouden buiten* Franeker; *in de Slooten aan de Duinkant by* 's Hage.

uliginoſum. 138. Galium foliis ſenis lanceolatis retrorſum ſerrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Sp* 153. *n.* 7. *Friſ.* 63.
Gallium album minus. *Pet. herb. n.* 30. *f.* 6.
Aparine paluſtris minor pariſienſis, flore albo. *Tourn. inſt.* 114. *Vaill. par.* 14.
By Harderwyk *op de Stads-weide; aan de kanten der*

der Slooten buiten Franeker, *en elders; ook langs de Duinen.*

139. GALIUM foliis octonis linearibus ſulcatis, ramis floriferis brevibus. *Sp.* 155. *n.* 12. *Gelr.* 72. *Friſ.* 64. *verum.*
Gallium luteum. *Baub. pin.* 335. *Comm. boll.* 43.
Gallium. *Dod. pempt.* 335.
Walſtroo. Belg.
Op ruwe zandige en ſteenige gronden; overvloedig op de barre Duinen; op de Wallen te Harderwyk; *op de Muuren der Stad* Utrecht; *en elders.*

140. GALIUM foliis octonis ovato-linearibus ſubſerratis, caule flaccido, ramis patentibus. *Sp.* 155. *n.* 14. *Gelr.* 75. *Jngr.* 22. *Mollugo.*
Mollugo belgarum. *Lob. ic.* 802.
Rubia ſylveſtris lævis. *Baub. pin.* 333.
Oed. dan. t. 455.
β. Mollugo montana anguſtifolia, vel Gallium album latifolium. *Baub. pin.* 331.
By Zandvoort *op de Weg aan de Duinen; te* Harderwyk *aan de Wal buiten de grooſe Poort; aan de Dykjes by* Haren *buiten* Groningen. β. *Omtrent* Zwol.

141. GALIUM foliis octonis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis villoſis, fructibus hiſpidis. Sp. 157. *n.* 22. *Gelr.* 76. *Friſ.* 65. *Aparine.*
Aparine. *Dod. pempt.* 353.
Aparine vulgaris. *Baub. pin.* 334. *Comm. boll.* 11.
Oed. dan. t. 495.
Kleef-Kruid, Klet, Katte-Klaauwen. Belg.
β. Aparine ſemine coriandri ſaccharati. *Park. theatr.* 547.
Overvloedig by de Wegen, in de Heggen, Boſſchen, Hoven, bebouwde en onbezaaide landen. β. *Gemeen te* Overmaas *in 't Koorn.*
Varietas β ſemper minor eſt, ſed rigidior &c. ſcabrior.

PLANTAGO.

142. PLANTAGO foliis ovatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis. *Sp.* 163. *n.* 1. *Gelr.* 77. *major.*

Digitized by Google

Friſ. 66.

Plantago latifolia ſinuata. *Baub. pin.* 189. *Comm. boll.* 89.

Oed. dan. t. 461.

Weegbree. Belg.

β. Plantago marina magna. *Baub. biſt.* 3. *p.* 504. *Comm. boll.* 89.

Zee-Weegbree. Belg.

By de Wegen, aan de Wallen, in de Weilanden, en in de Hoven. ♃. *Aan de Zeekant by* Muiderberg, Amſterdam, Zandvoort, *op 't Eiland* Wieringen, *en elders.*

Pharm. Plantaginis *rad. berb. ſem.*

media. 143. Plantago foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti. *Sp.* 163. *n.* 3. *Gelr.* 78.

Plantago latifolia incana. *Baub. pin.* 189. *Comm. boll.* 89. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 259. *ſ.* 8. *t.* 15. *f.* 6.

Oed. dan. t. 581.

Ruige Weegbree Belg.

β. Plantago latifolia hirſuta minor. *Baub. pin.* 189. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 100. *n.* 5.

Als vooren; veel op Staal-duin *buiten* 's Hage.

maritima. 144. Plantago foliis ſemicylindraceis integerrimis baſi lanatis, ſcapo tereti. *Sp.* 165. *n.* 11. *Gelr.* 81. *Friſ.* 68.

Plantago marina. *Lob. ic.* 306. *Tab. ic.* 733.

Coronopus maritimus major. *Baub. pin.* 190. *Comm. boll.* 29.

Oed. dan. t. 243.

Zee-Harts-boorn. Belg.

Krokkeling. Enchuſanis.

Aan de kant van de Zuider-Zee onder 't Gras by Harderwyk, Muiderberg, Naarden, Enkhuizen; *aan de Noord-Zee op den Haack achter* 's Gravezande, *en te* Delfzyl; *aan de Zeedyk by* Harlingen, Roptazyl, Dykshoek; *als mede op ſommige plaatſen in de* Wouden *in* Friesland.

Nonnullis pro acetario comeſta placet. Vaccæ, quæ bac planta veſcuntur, optimum ac copioſum lac præbent.

coronopifolia. 145. Plantago foliis linearibus dentatis, ſcapo te-

tereti. *Sp.* 166. *n.* 14. *Gelr.* 80. *Friſ.* 69.
Coronopus ſylveſtris hirſutior. *Baub. pin.* 190.
Herba ſtella ſ. Cornu cervinum. *Dod. pempt.* 109.
Harts-boorn, Gravinne-Kruid. Belg.
β. Coronopus hortenſis. *Baub. pin.* 190. *Comm. boll.* 29.
Langs de Weg tuſſchen Zutphen *en* Doesburg; *op de Wallen te* Harderwyk; *achter* Zorgvliet *buiten* 's Hage, *en op de Taraſſen aldaar*; *te* Heemze *in* Overyſſel; *by Harender Moolen in 't Heideveld, en in 't witte Veen tuſſchen* Haren *en de* Waterhuizen *buiten* Groningen. β. *In de Bouwlanden en op zandige gronden by* Haarlem.

C E N T U N C U L U S.

146. Centunculus. *Sp.* 169. *n.* 1. *Dill giſſ.* 161. *gen.* 111. *Eph. Nat. Cur. cent.* 5. *app.* 32. *t.* 10. *f.* 30. *minimus.*
Anagallis paludoſa minima, foliis rotundis alternatis. *Vaill. par.* 12. *t.* 4. *f.* 2.
Alſine paluſtris minima, floſculis albis, fructu coriandri exiguo. *Mentz. pug. t.* 4. *f.* 5.
Oed. dan. t. 177.
Te Heemze *in* Overyſſel *op 't Veld, alwaar plaggen afgemaait zyn.*

S A N G U I S O R B A.

147. Sanguisorba ſpicis ovatis. *Sp.* 169. *n.* 1. *Gelr.* 82. *officinalis.*
Pimpinella ſanguiſorba major. *Baub. pin.* 160. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 264. *ſ.* 8. *t.* 18. *f.* 7.
Oed. dan. t. 97.
Te Heemze *in de Hooi-landen.*
Pharm. Sanguisorbæ. *rad.*

C O R N U S.

148. Cornus arborea, cymis nudis, ramis rectis. *Sp.* 171. *n.* 3. *Gelr.* 83. *ſanguinea.*
Cornus fæmina. *Baub. pin.* 447.
Virga ſanguinea. *Dod. pempt.* 782.
Oed. dan. t. 481.
Overvloedig aan de ruige Wallen langs de wegen buiten Zutphen; *ook te* Heemze, *en elders in* Overyſſel; *en aan de ooſtkant van de Heereweg*

aan

aan de Dykjes by Haren *buiten* Groningen.

ISNARDIA.

paluſtris. 149. Isnardia. *Sp.* 175. *n.* 1.
Alſine paluſtris rotundifolia repens, foliis portulacæ pinguibus. *Lind. alſat.* 114. *t.* 2.
In één Sloot by Achtienhoven *in 't Sticht van* Utrecht. (*Cel.* E. I. van Wachendorff.)

TRAPA.

natans. 150. Trapa. *Sp.* 175. *n.* 1.
Tribulus aquaticus. *Baub. pin.* 194. *Comm. boll.* 111.
Tribulus aquatilis. *Dod. pempt.* 581.
Water-Nooten, Minck-yzers. Belg.
In Vyvers en Stilſtaande zoete Wateren op ſommige plaatſen.

ALCHEMILLA.

vulgaris. 151. Alchemilla foliis lobatis. *Sp.* 179. *n.* 1.
Alchimilla vulgaris. *Baub. pin.* 319. *Comm. boll.* 4.
Alchimilla. *Dod. pempt.* 140.
Zinauw, Leeuwen-Klaauw, Leeuwen-voet, Onze Vrouwe Mantel. Belg.
† *Volgens* Boerhaave.
Pharm. Alchimillæ. *berb.*

DIGYNIA.

APHANES.

arvenſis. 152. Aphanes. *Sp. n.* 1. *Gelr.* 86.
Chærophyllo nonnihil ſimilis. *Baub. pin.* 182. *Comm. boll.* 25.
Perchepier anglorum quibusdam. *Baub. biſt.* 3. *p.* 74.
Engelſcb Steen doorſnydend Kruid. Belg.
In de Zaai-landen en Koorn-akkers op verſcheide plaatſen; gemeen by Groningen.
Cl. Adanson *in bac planta ſi ſponte in arvis creſcit,* u-

unum piſtillum; in hortis ſi naſcitur, duo conſtanter reperiit.

CUSCUTA.

153. Cuscuta floribus ſeſſilibus. *Sp.* 180. *n.* 1. *Gelr.* 87. *Friſ.* 71. *europaea.*
Cuſcuta major. *Baub. pin.* 219. *Comm. boll.* 32.
Caſſutha. *Dod. pempt.* 554.
Oed. dan. t. 199.
Wrange, Schorfte, Filt-Kruid. Belg.
Op de Heide by Harderwyk, Veldtwyk, *en* Keppel; *om 't Vlas by* Twello, *en elders in* Gelderland; *op de Haagen en tuſſchen andere Kruiden by* Utrecht *en* Tiel; *aan de Heide-ſtruikjes by* Makkinga, Nyeberkoop &c. *in* Friesland.
Pharm. Cuscutæ *herb.*

TETRAGYNIA.

ILEX.

154. Ilex foliis ovatis acutis ſpinoſis. *Sp.* 181. *n.* 1. *Gelr.* 88. *Friſ.* 72. *Aquifolium.*
Ilex aculeata baccifera, folio ſinuato. *Baub. pin.* 425. *Comm. boll.* 60.
Agrifolium. *Dod. pempt.* 659.
Oed. dan. t. 508.
Hulſt, Muiſen-doorn. Belg.
β. Ilex foliis glabris integerrimis exacte folia lauri referens. *Linn. h. Cliff.* 40.
Op verſcheide plaatſen by Harderwyk, Zwol; *omtrent het* Heerenveen, *en* Dragten, *en tuſſchen* Donkerbroek *en* Haule *in* Friesland; *achter* Haren *by de* Mickelhorſt *buiten* Groningen; *ook vooraan in 't Landſchap* Drenthe *in 't* Cluivingsboſch *te* Paterwolde *en* Eelde. β. *In de Mehenſteeg by* Harderwyk.
Pharm. Agrifolii *herb.*

POTAMOGETON.

155. Potamogeton foliis oblongo-ovatis petio- *natans.*
la-

latis natantibus. *Sp.* 182. *n.* 1. *Friſ.* 73.
Potamogeton rotundifolium. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 93.
Potamogeton. *Fuchſ. biſt.* 651. *fig. optima.*
Fontein-Kruid. Belg.
In ſtilſtaande zoete Wateren en Vyvers; te Hulſen *by* Nymegen; *op 't Eiland* Wieringen; *in de Slooten omtrent* Tjomarum, *en tuſſchen* Tjetjerk *en* Bergum *in* Friesland; *en elders.*

perfoliatum 156. POTAMOGETON foliis cordatis amplexicaulibus. *Sp.* 182. *n.* 2. *Friſ.* 74.
Potamogeton tertia. *Dod. pempt.* 582.
Potamogeton foliis latis ſplendentibus. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 93.
Potamogeton rotundifolium alterum. *Loeſ. pruſſ.* 205. *t.* 65.
Oed. dan. t. 196.
In brakke wateren in Noort-Holland; *ook omtrent* Amſterdam, Zwol, *en elders. In* Friesland *te* Lollum *in de Vaart, in den opvaart naar* Balk, *en in de Rivier de* Kuinder *of* Tjonger; *en op andere plaatſen.*

denſum. 157. POTAMOGETON foliis ovatis acuminatis oppoſitis confertis, caulibus dichotomis, ſpica quadriflora. *Sp.* 182. *n.* 3.
Tribulus aquaticus minor alter. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 252.
In Overysſel *omtrent* Zwol, *ſi fides M. S. S. quod inde babeo.*

lucens. 158. POTAMOGETON foliis lanceolatis planis in petiolos deſinentibus. *Sp.* 183. *n.* 4. *Gelr.* 90. *Friſ.* 75.
Potamogeton foliis anguſtis ſplendentibus. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 93.
Fontinalis lucens major. *Baub. biſt.* 3. *p.* 777. *Comm. boll.* 93.
Oed. dan. t. 195.
Veel in zoete ſtilſtaande Wateren en Vyvers in Noort-Holland; *ook by* Harderwyk, Haarlem, Zwol, *en elders; in de oude Leidſche Vaart en omtrent* Kortenhoef; *in de* Vecht *by den* Voetangel; *buiten* Leeuwaarden *aan de zwarte Weg,*

in

in den opvaart naar Balk, *en in de Rivier de* Kuinder *of* Tjonger.

Commelinus *boll.* 93. *male diſtinguit plantam Caſp. Baubini ab ea Job. Baubini.*

159. Potamogeton foliis lanceolatis alternis oppoſitisve undulatis ſerratis. *Sp.* 183. *n.* 5. *Gelr.* 91. 92. *Friſ.* 76. *criſpum.*

Potamogeton foliis criſpis, ſive Lactuca ranarum ſarmentis planis. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 93.

Fontinalis criſpa. *Baub. biſt.* 3. *p.* 770.

Fonti-Lapathum puſillum. *Lob. ic.* 286.

In zoete ſtaande Wateren op veele plaatſen in Noort-Holland, *vooral aan de Duinkant. In de Slooten aan de Stadsweide van* Harderwyk, *en elders. In* Friesland *op veele plaatſen, zoo wel op de* Kley *als in de* Wouden, *in Vaarten, Vyvers en Slooten.*

160. Potamogeton foliis lanceolatis oppoſitis ſubundulatis. *Sp.* 183. *n* 6. *Friſ.* 77. *ſerratum.*

Potamogeton altera. Dod. pempt. 582.

Potamogeton longo ſerrato folio. *Baub. pin.* 193.

Lapathum fluitans, folio longo ſerrato. *Baub. biſt.* 2. *p.* 988.

By de voorige, dog niet zoo veel.

161. Potamogeton foliis linearibus obtuſis, caule compreſſo. *Sp.* 183. *n.* 7. *Gelr.* 93. *Friſ.* 78. *compreſſum*

Potamogeton caule compreſſo, folio graminis canini. *Raj. biſt.* 189. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 197. *Oed. dan. t.* 203.

In de Graften om Harderwyk; *veel in* Noort-Holland; *in* Friesland *in een Sloot aan de weg van* Tjetjerk *naar* Bergum, *en op verſcheide andere* Woutplaatſen.

162. Potamogeton foliis ſetaceis parallelis approximatis diſtichis. *Sp.* 183. *n.* 8. *Friſ.* 79. *pectinatum.*

Potamogeton gramineum. ramoſum *Baub. pin.* 193. *prodr.* 101.

Millefolium tenuifolium. *Gerard. biſt.* 828. *fig. bona.*

In de Slooten by Uilenpas, Latmer, *en elders in* Gelderland; *en op zeer veele plaatſen in* Friesland.

264. Po-

ſetaceum. 163. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppoſitis acuminatis. *Sp.* 184. *n.* 9.
Potamogeton ramoſum anguſtifolium. *Baub. pin.* 193. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 197.
In den Ouden Yſſel *op verſcheide plaatſen.*

puſillum. 164. POTAMOGETON foliis linearibus oppoſitis alternisque diſtinctis: baſi patentibus, caule tereti. *Sp.* 184. *n.* 12.
Potamogeton puſillum, gramineo folio, caule tereti. *Raj. angl.* 3. *p.* 150. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 197. *n.* 8.
Potamogeton minimum, capillaceo folio. *Baub. pin.* 193. *prodr.* 101.
Potamogeton puſillum, gramineo folio breviore. *Vaill. par. t.* 32. *f.* 4.
Oed. dan. t. 186.
Te Katwyk op Rhyn.

RUPPIA.

maritima. 165. RUPPIA. *Sp.* 184. *n.* 1.
Buccaferrea maritima, foliis acutiſſimis. *Mich. gen.* 72. *t.* 35.
Gramen maritimum fluitans cornutum. *Baub. pin.* 3. *prodr.* 7.
Oed. dan. t. 364.
By Katwyk aan Zee *in de Slooten* (*Linn. h. Cliff.* 430.) *ook binnen 's Lands.* (*Cl.* HOUTTUYN.)

SAGINA.

procumbens 166. SAGINA ramis procumbentibus. *Sp.* 185. *n.* 1. *Gelr.* 94. *Friſ.* 80.
Alſine puſilla graminea, flore tetrapetalo. *Tourn. inſt.* 243. *Lind. alſ.* 204. *t.* 8. *Segu. veron.* 421. *t.* 5. *f.* 3.
In Tonzel *en elders buiten* Harderwyk; *veel op vochtige ſtraaten en muuren in* Holland; *op* Zandhorſt *in een graspad.*

erecta. 167. SAGINA caule erecto ſubunifloro. *Sp.* 185. *n.* 2.
Alſine foliis caryophyllæis. *Raj. angl.* 3. *p.* 344. *t.* 15. *f.* 4.
In de Weiden by Sneek. (D. RAINVILLE.)

CLAS-

CLASSIS V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

MYOSOTIS.

168. MYOSOTIS ſeminibus lævibus, foliorum apicibus calloſis. *Sp.* 188. *n.* 1. *Gelr.* 95. *Friſ.* 81. *Scorpioides*
α. Myoſotis foliis hirſutis. *Linn. h. Cliff.* 45. *arvenſis.*
Echium ſcorpioides arvenſe. *Baub. pin.* 254. *Comm. boll.* 32.
Scorpiurus annuus arvenſis hirſutus cæruleus. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 450. *ſ.* 11. *t.* 31. *f.* 2.
Oed. dan. t. 58.
Muizen-oor, Scorpioen-Kruid. Belg.
β. Myoſotis foliis glabris. *Linn. h. Cliff.* 46. *paluſtris.*
Echium ſcorpioides paluſtre. *Baub. pin.* 254. *Comm. boll.* 32.
Scorpiurus paluſtris perennis, viridioribus foliis. *Moriſ biſt.* 3. *p.* 451. *ſ.* 11. *t.* 31. *f.* 4.
Water-Muizen-oor, Water-Scorpioen-Kruid. Belg.
α. In de Zaai-landen en Hoven. β. Aan de kanten van de Beeken en Slooten, en op andere vochtige plaatſen.

LITHOSPERMUM.

169. LITHOSPERMUM ſeminibus lævibus, corollis vix calycem ſuperantibus, foliis lanceolatis. *Sp.* 189. *n.* 1. *officinale.*

Lithospermum majus erectum. *Baub. pin.* 258. *Camm. boll.* 68.
Lithospermum minus: *Cam. epit.* 659.
Paarl - Kruid, Steenbreek, Steen - Zaad, Zonne-Gierſt. Belg.
Op zandige gronden buiten Haarlem *in 't Groote Bent - veld, by de Kruidberg, en elders; ook omtrent* Zwol.
Pharm. Lithospermi *ſ.* Milii solis *ſem.*

arvenſe. 170. Lithospermum ſeminibus rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus. *Sp.* 190. *n.* 2. *Gelr.* 96. *Friſ.* 82.
Lithospermum arvenſe, radice rubra. *Baub. pin.* 58. *Comm. boll.* 68.
Lithospermum nigrum quibusdam, flore albo, ſemine echii. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 592.
Oed. dan. t. 456.
Wild Steen - Zaad, Wild Paarl - Kruid. Belg.
In de Voor - Zomer aan de kanten der Akkers by Oldbroek *op de* Veluwe; *buiten* Amſterdam *op de Weg langs den* Amſtel *naar* Ouderkerk, *en elders in* Holland; *by de* Maat *omtrent* Cothen *in de Provincie* Utrecht; *tuſſchen het Koorn op veele plaatſen in* Friesland; *aan de Weſtkant van de Heereweg aan de Dykjes tegenover de Eſterweg buiten* Groningen.

ANCHUSA.

officinalis. 171. Anchusa foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis. *Sp.* 191. *n.* 1. *Gelr.* 615.
Bugloſſum anguſtifolium majus. *Baub. pin.* 256.
Bugloſſum vulgare. *Cam. epit.* 915.
Oed. dan. t. 572.
Oſſe - tonge. Belg.
Langs de wegen buiten Arnhem, *en vry overvloedig langs de Duinen by* Waſſenaar, Heemſtede, Bennenbroek, *en elders.*
Pharm. Buglossi *herb. flor.*

CYNOGLOSSUM.

officinale. 172. Cynoglossum ſtaminibus corolla brevioribus, fo-

foliis lato-lanceolatis tomentoſis ſeſſilibus. *Sp.* 192. *n.* 1. *Gelr.* 97.
Cynogloſſum vulgare. *Cam. epit.* 917.
Cynogloſſum majus vulgare. *Baub. pin.* 257. *Comm. boll.* 30.
Honds-tonge. Belg.
β. Cynogloſſum majus vulgare, flore albo. *Baub. pin.* 257.
By Doesburg *en* Arnhem *in de Fortificatien; op de Wallen van* Harderwyk; *aan de Dyken boven* Tiel; *veel tuſſcben* Maas *en* Waal; *langs de wegen buiten* Wyk *by* Duurſtede; *en overvloedig langs de Duinkant van* Holland.
Pharm. CYNOGLOSSI *rad.*

PULMONARIA.

173. PULMONARIA foliis radicalibus ovato-cordatis ſcabris. *Sp.* 194. *n.* 2. *officinalis.*
Symphytum maculoſum ſ. Pulmonaria latifolia. *Baub. pin.* 259. *Comm. boll.* 109.
Symphytum maculoſum. *Dod. pempt.* 135.
Oed. dan. t. 482.
Longe-Kruid, Wrange-Kruid, Onzer-*Vrouwen Melk-Kruid.* Belg.
Wolven-Laa. Ruſticis.
Overvloedig op Zandwyk *by* Tiel, *en in 't Boſcb te* Buuren; *buiten* Haarlem *naar de* Sillick.
Pharm. PULMONARIÆ *berb.*

SYMPHYTUM.

174. SYMPHYTUM foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Sp.* 195. *n.* 1. *Gelr.* 98. *Friſ.* 83. *officinale.*
Symphytum majus. *Cam. epit.* 700.
Symphytum, Conſolida major. *Baub. pin.* 259. *Comm. boll.* 108.
Smeer-Wortel, Heel-Wortel, Waal-Wortel Belg.
Scbeur-Wortel, Felje. Zutphanienſibus.
Overvloedig aan de Dyken, Wegen, Kanten der Slooten, en in de Weilanden.
Pharm. SYMPHYTI *ſ.* CONSOLIDÆ MAJORIS *rad. berb. far.*
Variat corollis cæruleis, purpureis, rubris & albis, vel pallide luteis.

Digitized by Google

B O R A G O.

officinalis. 175. Borago foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Sp.* 197. *n.* 1. *Gelr* 99.
Borrago floribus cæruleis & albis. *Baub. biſt.* 3. *p.* 574.
Bugloſſum latifolium, Borrago. *Baub. pin.* 236. *Comm. boll.* 17.
Bernaſie. Belg.
Komt thans van zelfs voort in de Hoven, langs de Wegen, ook op zommige Vuilnisboopen.
Pharm. Borraginis *berb. flor.*

A S P E R U G O.

procumbens 176. Asperugo calycibus fructus compreſſis. *Sp.* 198. *n.* 1. *Gelr.* 102.
Asperugo ſpuria. *Dod. pempt.* 356.
Bugloſſum ſylveſtre, caulibus procumbentibus. *Baub. pin.* 257. fructu pedem anſerinum referente. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 439. *ſ.* 11. *t.* 26. *f.* 13.
Oed dan. t. 552.
Aan ruige Wallen langs de Duinkant omtrent de Boere-bove buiten 's Hage; *en tuſſcben* Overveen *en* Bloemendal *by* Haarlem; *aan 't Dykje even voorby de Vier Staten naar de breedeweg buiten* Alkmaar; *aan de Wallen der Bouwlanden te* Dieze *in* Overysſel.

L Y C O P S I S.

arvenſis. 177. Lycopsis foliis lanceolatis hispidis, calycibus floreſcentibus erectis. *Sp.* 199. *n.* 4. *Gelr.* 100. *Friſ.* 87.
Bugloſſum ſylveſtre minus. *Baub. pin.* 256. *Comm. boll.* 18.
Bugloſſa ſylveſtris. *Dod. pempt.* 628.
Oed. dan. t 435.
Wilde Bugloſſe of *Oſſe-tonge.* Belg.
β. Bugloſſum ſylveſtre minus alterum & asperius. *Baub. pin.* 256.
In de Bouw landen en Akkers, en langs de Heggen, veel in de Duinen naar Waſſenaar; *en aan de Dykjes tuſſcben* Helpen *en nieuwe werken buiten* Groningen. β. *In de Moesboven en bebouwde Lan-*

Digitized by Google

Landen buiten Haarlem.

E C H I U M.

178. Echium caule tuberculato - hiſpido, foliis caulrnis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus. *Sp.* 200. *n.* 4. *Gelr.* 101. *vulgare.*

Echium vulgare. *Baub. pin.* 254. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 585. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 440. *ſ.* 11. *t.* 27. *f.* 1.

Lycopſis. *Baub. pin.* 255. *Comm. holl.* 69.

Oed. dan. t. 445.

Slange - Bruid. Belg.

Te Keppel *by de Kerk, en in de Fortificatien om* Zutphen, Doesburg *en* Arnhem; *aan de Duinen, en langs de Weg by* Noorddorp, *in de Duinen van* Heemſtede *en* Waſſenaar; *op de Stads-Muuren te* Deutinchem, Hattem, Zwol; *veel langs de Wegen by* Rhenen, *en elders.*

Variat floribus cæruleis & rubris. Caule faſciato occurrit inter Neomagum & Villam Hulſen.

P R I M U L A.

179. Primula foliis dentatis rugoſis. *Sp.* 204. *n.* 1. *veris.*

ε. limbo corollarum plano.

Primula veris, pallido flore, elatior. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 301.

Verbaſculum pratenſe vel ſylvaticum inodorum. *Baub. pin.* 241. *Comm. holl.* 114.

Oed dan. t. 433.

Sleutel - Bloem, Bak - Kruid. Belg.

Overvloedig op de Uittenwaarden te Drumpt, Zoelen *en* Aveſaate *in de* Neder - Betuwe; *op de Stadsweide en by de Bronsbergen buiten* Zutphen; *in vogtige Bosjes buiten* Haarlem, *en in veele Duin - Valeien; ook langs de boutkant van 't* Haagſche - Boſch

Pharm. Primula veris *herb. flor.*

M E N Y A N T H E S.

180. Menyanthes foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. *Sp.* 207. *n.* 1. *Gelr.* 104. *Friſ.* 84. *Nymphoides.*

Lymnanthemum peltatum. *Gmel. act. petrop.* 1769. V. 14. *p.* 527. *t.* 17. *ſ.* 2.

Nymphæa lutea minor, flore fimbriato. *Baub. pin.* 194.

Digitized by Google

194. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 772.
Nymphœa lutea minor parvo flore. C. B. *Comm. holl.* 81.
Oed. dan. t. 339.
Kleine Geele Plompen. Belg.
Veel in den Ouden-Yſſel; *in de Graften om* Zutphen; *in de Slooten by* Uilenpas, Maurik, Amerongen &c. *in 't Graafſchap* Leerdam; *by* 's Gravenhage; *in 't wyde* Spaarne *by 't Huis te* Heemſtede; *in verſcheide Wateren in* Friesland, *by de* Joure, Akkrum &c. *In* Overyſſel *omtrent* Zwol *en elders; als ook op veele plaatſen in de* Veenen.

trifolia. 181. Menyanthes foliis ternatis. *Sp.* 208. *n.* 3. *Gelr.* 103. *Friſ.* 85.
Trifolium paluſtre. *Baub. pin.* 327. *Dod. pempt.* 580. *Comm. holl.* 112.
Oed. dan. t. 541.
Water-Drieblad, Water-Klaveren, Boks-Boonen. Belg.
β. Menyanthes paluſtre anguſtifolium triphyllon. *Tourn. inſt.* 117. *Boerh. lugd.* 1. *p.* 206.
By Harderwyk, *in de Slooten tuſſchen* Hierden *en de Zee; in 't Veen agter* Uilenpas, *te* Elden, Driel, Wamel, Dreumel, Veenendal; *in de Weiden by* Wageningen, *en elders in* Gelderland; *in de binnendykſe Wielen by* Muiderberg; *in de Slooten tuſſchen* Muiden *en* Naarden; *in die om* 's Hage, *en buiten* Alkmaar, *by* Bergen, Egmond op den Hoef *en* Egmond binnen; *overvloedig buiten* Leeuwaarden *aan de Zwarte-Weg, in laage Landen en in Slooten, op* Bergummer-Heide *in* Friesland; *by* Holten *in* Overyſſel; *in 't* Goregt *om* Groningen; *en elders.*
Pharm. Trifolii aquatici. *herb.*

HOTTONIA.

paluſtris. 182. Hottonia pedunculis verticillato-multifloris. *Sp.* 208. *n.* 1. *Gelr.* 105. *Ingr.* 30. *Friſ.* 86.
Myriophyllum alterum. *Cam. epit.* 879.
Millefolium aquaticum, ſ. Viola aquatica, caule nudo. *Baub. pin.* 141. *Comm. holl.* 75.
Millefolium aquaticum equiſetifolium, caule nudo. *Baub. pin.* 141. *Comm. holl.* 75.

Oed.

Oed. dan. t. 487.
Water-Violen of *Violieren.* Belg.
Veel in ſtilſtaande Slooten tuſſchen Harderwyk *en* Nykerk, *in* Heirden, Twello, *en elders op de* Velouwe, *ook in de* Betuwe; *in de Slooten by* Vianen, Heycoop, *te* Overveen *buiten* Haarlem; *by* Dokkum, Tjetjerk &c. *in* Friesland; *by* Haren *buiten* Groningen; *ook op veele plaatſen in de Provincien* Utrecht *en* Overysſel.

L Y S I M A C H I A.

183. LYSIMACHIA paniculata: racemis terminalibus. *vulgaris.*
Sp. 209. *n.* 1. *Gelr.* 106. *Ingr.* 30. *Friſ.* 87.
Lyſimachia lutea major. *Baub. pin.* 245. *Comm. holl.* 70.
Lyſimachium luteum. *Dod. pempt.* 84.
Geele Wederik. Belg.
Veel aan de Beeken en Slooten by Harderwyk, Uilenpas, Zeyſt, 's Hage, *in den* Aarden-hout, *aan de Duinbeeken; in* Friesland *by* Bergum, Ooſtermeer, Heerenveen, *als elders in de* Wouden; *buiten* Groningen *by de* Mickelhorſt, *en op andere boſchagtige plaatſen.*
Variat foliis ternis, quaternis & quinis.

184. LYSIMACHIA racemis lateralibus pedunculatis. *thyrſiflora.*
Sp. 209. *n.* 4. *Gelr.* 107. *Friſ.* 88.
Lyſimachia bifolia, flore globoſo luteo. *Baub. pin.* 245. *Comm. holl.* 70.
Lyſimachia lutea. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 53. *t.* 12.
Oed. dan. t. 517.
Water-Wederik. Belg.
In 't Veen by Uilenpas; *in de Riet-Pol te* Wageningen; *in de waterachtige Rietlanden tuſſchen* Amſterdam *en* Muiden; *in 't* Haagſche-Boſch; *in de moeraſſen by* Rotterdam, Leeuwaarden, Franeker, Groningen; *en elders.*
Mire variat numero ſtaminum 6. 7. *&* 8 *corollaque in totidem lacinias ſecta.*

185. LYSIMACHIA foliis ſubquaternis ſubſeſſilibus, pedunculis verticillatis unifloris. *Sp.* 210. *n.* 6. *punctata.*
Lyſimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis. *Baub. pin.* 245.

 Blat-

Blattariæ affinis planta minor, flore luteo; foliis nigris punctis notatis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 491. *ſ.* 5. *t.* 10. *f.* 15.
Aan 't Haarlemmer-Meer *tuſſchen 't Riet* (Linn. *h. Cliff.* 52.) *Langs de* Maas *achter* 's Gravezande. (*Cl.* Schencke.)

nemorum. 186. LYSIMACHIA foliis ovatis acutis, floribus ſolitariis, caule procumbente. *Sp.* 211. *n.* 9.
Anagallis lutea nemorum. *Baub pin.* 252. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 203. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 569. *ſ.* 5. *t.* 26. *f.* 5.
Oed. dan. t. 174.
In 't Veen by Uilenpas.

Nummularia. 187. LYSIMACHIA foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente. *Sp.* 211. *n.* 10. *Gelr.* 108. *Friſ.* 89.
Nummularia. *Dod pempt.* 500.
Nummularia major lutea. *Baub. pin.* 309. *Comm. holl.* 80.
Oed. dan. t. 493.
Penning-Kruid. Belg.
Aan de kanten van vochtige Weilanden, in drooge Slooten, en in de Veenen op veele plaatſen.
Pharm. NUMMULARIÆ *herb.*

ANAGALLIS.

arvenſis. 188. ANAGALLIS foliis indiviſis, caule procumbente. *Sp* 211. *n.* 1. *Gelr.* 109. *Friſ.* 90.
α. Anagallis phœniceo flore. *Baub. pin.* 252. *Comm. holl.* 8.
Anagallis mas. *Dod. pempt.* 32.
Oed. dan. t. 88.
Baſtard-Muur of *Guichelheil Manneken.* Belg.
Lieven-Heers Teentjes. Moſa-Trajectinis.
β. Anagallis cœruleo flore. *Baub. pin.* 252. *Comm. holl.* 8.
Anagallis foemina. *Dod. pempt.* 32.
Baſtard-Muur of *Guichelhei Wyfje.* Belg.
γ. Anagallis flore purpuraſcente. *Baub. pin.* 252. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 204.
δ. Anagallis flore carneo. *Park. theatr.* 558. *Boerh lugdb.* 1. *p.* 204.

α. *In.*

Digitized by Google

α. *In de Koornlanden en Hoven op verſcheide plaatſen ook in de barre Duinen.* ε. γ. δ. *by de zelve, dog niet zoo overvloedig.*
Pabulum gratiſſimum pecori.
Pharm. ANAGALLIDIS *herb.*

189. ANAGALLIS foliis ovatis acutiuſculis, caule repente. *Mant.* 335. *tenella.*
Lyſimachia tenella. *Sp.* 211. *n.* 11.
Nummularia minor, purpuraſcente flore. *Bauh. pin.* 310. *prodr.* 139. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 567. *ſ.* 5. *t.* 26. *f.* 2.
Nummularia rubra. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 371. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 203.
† *Volgens* BOERHAAVE.

C O N V O L V U L U S.

190. CONVOLVULUS foliis ſagittatis utrinque acutis, pedunculis ſubunifloris. *Sp.* 218. *n.* 1. *Gelr.* 110. *Friſ.* 91. *arvenſis.*
Convolvulus minor arvenſis. *Bauh. pin.* 294. *Comm. holl.* 28. flore roſeo.
Smilax lævis minor. *Dod. pempt.* 393
Oed. dan. t. 459.
Kleine Winde, Kloxkens Winde, Liend, Windom. Belg.
β. Convolvulus minor arvenſis, flore candido. *Tourn. inſt.* 83.
γ. Convolvulus minor arvenſis, flore purpuraſcente, radiis albis picto. *Tourn. inſt.* 83.
Menigvuldig in zandige Bouwlanden en aan ruige Wallen; ook in de Duinen langs de Wegen achter Zorgvliet, *en buiten* Haarlem.

191. CONVOLVULUS foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. *Sp.* 218. *n.* 2. *Gelr.* 111. *Friſ.* 92. *Sepium.*
Convolvulus vulgaris major albus. *Bauh. pin.* 294. *Comm. holl.* 27.
Smilax lævis major. *Dod. pempt.* 392.
Oed. dan. t. 458.
Groote Winde. Belg.
β. Convolvulus vulgaris major, flore ex roſeo & albo variegato. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 246.

 γ. Con-

γ. Convolvulus major purpureus. *Comm. boll.* 28.
Veel aan de heggen by de wegen β. *by de zelve, maar zeldſaam. γ. buiten* Haarlem *by 't* Kraayeneſt.

Soldanella. 192. CONVOLVULUS foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Sp.* 226. *n.* 39.
Convolvulus maritimus noſtras rotundifolius. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 11. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 2.
Soldanella maritima minor. *Baub. pin.* 295. *Comm. boll.* 107.
Braſſica marina, ſive Soldanella. *Baub. biſt.* 2. *p.* 166.
Zee-Winde, Zee-Kool. Belg.
Overvloedig in Zeeland *aan den* Weſt-Cappelſchen-Dyk; *en achter* 's Gravezande, *langs de Zee-duinen en ſtranden van de* Maas.
Pharm. SOLDANELLA *herb.*

CAMPANULA.

rotundifolia. 193. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Sp.* 232. *n.* 3. *Gel.* 117. *Friſ.* 93.
Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Baub. pin.* 93. *Comm. boll.* 2c.
Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus ſinuatis non ſerratis. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 456. *ſ.* 5. *t.* 2. *f.* 17.
Oed. dan. t. 489.
Kleine wilde Raponce of *wilde kleine Kloxkens.* Belg.
β. Campanula minor rotundifolia vulgaris, floribus candidis. *Tourn. inſt.* 111.
Overvloedig aan de kanten der Akkers in Gelderland *en* Overyſsel; *ook omtrent* Velſen *in* Holland; *in* Friesland *by* Bergummer-Heide, *en elders in de* Wouden *aan de dykjes en wegen*, β. *Veel omtrent den* Ouden Yſſel *by* Keppel.

Rapunculus. 194. CAMPANULA foliis undulatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. *Sp.* 232. *n.* 5. *Gelr.* 116.
Rapunculus eſculentus. *Baub. pin.* 92.
Rapunculum. *Dod. pempt.* 165.
Raponcen. Belg.
In de Herkeloer-waart *in* Overyſsel: *by* Zuideras, Diempt, Wageningen, Hunderen, *de* Poll, Lat-

Latmer, *en elders in* Gelderland.

195. Campanula foliis radicalibus obovatis, cau- *perſicifolia.*
linis lanceolato-linearibus ſubſerratis ſeſſilibus remotis. *Sp.* 232. *n.* 6. *Gelr.* 115.
Campanula perſicæfolia. *Lob. hiſt.* 117. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 452. *ſ.* 5. *t.* 1. *f.* 2.
Rapunculus perſicifolius, magno flore. *Baub. pin.* 93.
Veel by Uilenpas.

196. Campanula foliis cordato-lanceolatis, caule *rapunculoides.*
ramoſo, floribus ſecundis ſqarſis, calycibus reflexis. *Sp.* 234. *n.* 12. *Gelr.* 114. *Friſ.* 94.
Campanula hortenſis, rapunculi radice. *Baub. pin.* 94. repente. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 400. *ſ.* 5. *t.* 3. *f.* 32.
Duivels Naaigaarn. Belg. Hortulanis.
In de Hoven onder de heggen, en in de Zaailanden op verſcheide plaatſen.

197. Campanula caule angulato, foliis petiolatis, *Trachelium.*
calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Sp.* 235. *n.* 16. *Gelr.* 113.
Campanula vulgatior, foliis urticæ, vel major & aſperior. *Baub. pin.* 94.
Cervicaria major. *Dod. pempt.* 164.
Hals-Kruid. Belg.
In de Koornlanden by Zoelen *in de* Betuwe; *ook zomtyds in de Hoven en op ruwe plaatſen.*

198. Campanula capſulis quinquelocularibus ob- *barbata.*
tectis, caule ſimpliciſſimo ſubunifolio, foliis lanceolatis, corollis barbatis. *Sp.* 236. *n.* 22. *Gelr.* 119.
Campanula foliis anchuſæ, floribus oblongis. *Baub. pin.* 94.
Campanula foliis hiſpidis, caule ſubunifloro. *All. pedem.* 36. *t.* 6. *f.* 2.
Rapunculus montanus. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 808.
In de Salker-waart.

199. Campanula caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis *Speculum.*
oblongis ſubcrenatis, floribus ſolitariis capſulis priſmaticis. *Sp.* 268. *n.* 31. *Gelr.* 118.

Ono-

Onobrychis arvenſis, vel Campanula arvenſis erecta. *Baub. pin.* 215. *Comm. boll.* 81.
Avicularia ſylvii quibusdam. *Baub. biſt.* 2. *p.* 800.
Vrouwen-Spiegel. Belg.
In de Koornlanden by Tiel, *en op andere plaatſen in de* Betuwe; *by* Twello *op de* Veluwe; *by* Utrecht, Wyk te Duurſtede, Zwol, *en elders.*
Corolla apud nos calyce ſemper longior.

SAMOLUS.

Valerandi. 200. SAMOLUS. *Sp.* 243. *n.* 1. *Gelr.* 120. *Friſ.* 95.
Anagallis aquatica, rotundo folio non crenato. *Baub. pin.* 252. *Comm boll.* 9.
Alſine aquatica, foliis rotundis beccabungæ. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 323. *ſ.* 3. *t.* 24. *f.* 28.
Oed. dan. t. 198.
Waterpungen met ronde ongekerfde bladeren. Belg.
Op veele plaatſen langs de Zuider-Zee-kant by Enkhuiſen, Muiderberg, *op* Vlieland; *en in de Duin-Valeyen tuſſchen* Beverwyk *en* Velſen, *en agter* Egmond op den Hoef; *ook langs de Zee- en Maas-kant by* 's Gravezande, *en in de pannen der Duinen op* Staalduin. *In* Friesland *by* Koehool *aan den binnenkant van de Zeedyk; buiten* Franeker *op verſcheide plaatſen, in beneden wallen der Slooten, desgelyks in de* Wouden, *en ook by* Groningen.

LONICERA.

Periclymenum. 201. LONICERA capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis *Sp.* 247. *n.* 3. *Gelr.* 121.
Caprifolium germanicum. *Dod. pempt.* 411.
Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Baub. pin.* 302. *Comm. boll.* 86.
Geiten-blad, Mammetjes-kruid, Memmekens-kruid. Belg.
Weeuwtjes. Hollandis.
Wilde Caperfoely. Vulgo.
Veel langs de wegen by Zutphen; *te* Maurik *op den* Bikkelenberg; *aan de* Hierderweg *by* Harderwyk, *en aan de* Nuwſpeeter-beek; *in de* Haarlemmer-hout; *aan de kanten der Akkers tuſſchen de* Zandpoort *en* Velſen, *en buiten* Naarden;
in

in 't Haagſche-Boſch, *en in de Duinen aldaar; in* Friesland *in de* Wouden; *by* Groningen *in 't* Goregt, *voornaamlyk te* Onnen *en* Haren; *en elders op vochtige en ſchaduwachtige plaatſen.*

Pharm. CAPRIFOLII. *herb. flor.*

VERBASCUM.

202. VERBASCUM foliis decurrentibus utrinque tomentoſis, caule ſimplici. *Sp.* 252. *n.* 1. *Gelr.* 125. *Thapſus.*

Verbaſcum mas latifolium luteum. *Baub. pin.* 239. *Comm. holl.* 114.

Verbaſcum mas. *Dod. pempt.* 143.

Wolle-Kruid, Toortſen, Konings-Kaarſen. Belg.

Overvloedig aan de kanten der Duinen en Akkers op veele plaatſen; ook zomtyds op oude Muuren. Menigvuldig aan de Dyken tuſſchen Maas *en* Waal; *en aan de Weg by* Middagten *op de* Veluwe; *aan de Ooſtkant van de Heereweg op de dykjes by de* Wolf, *en agter* Haren *by* Voorveld *buiten* Groningen; *en elders.*

Pharm. VERBASCI *herb. flor.*

203. VERBASCUM foliis cordato-oblongis petiolatis. *Sp.* 253 *n.* 4. *Gelr.* 126. *nigrum.*

Verbaſcum nigrum. *Dod. pempt* 144.

Verbaſcum nigrum, flore ex luteo purpuraſcente. *Baub. pin.* 240.

Op Uilenpas *aan de wal om de Graften; op de Paſtory-Kamp te* Putten *op de* Veluwe; *hier en daar omtrent Boere-hoeven buiten* 's Hage; *agter den* Kranenborg *in* Overysſel.

204. VERBASCUM foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis ſolitariis. *Sp.* 254. *n.* 6. *Gelr.* 127. *Blattaria.*

Blattaria. *Dod. pempt.* 145.

Blattaria lutea, folio longo laciniato. *Baub. pin.* 240.

Motten-Kruid. Belg.

Op zandige gronden by Haarlem, Overveen; *op de Paſtory-Kamp te* Putten, *en overvloedig by* Warusveld, Keppel, Drempt *en* Uilenpas *in 't Graafſchap* Zutphen; *op hooge ſchraale Uittenwaarden te* Wamel *over* Tiel.

DA-

Digitized by Google

DATURA.

Stramonium. 205. Datura pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Sp.* 255. *n.* 2. *Gelr.* 122.
Solanum foetidum, pomo ſpinoſo oblongo, flore albo. *Baub. pin.* 168.
Tatula. *Cam. epit.* 176.
Oed. dan. t. 436.
Doorn-Appel, Dol-Appel. Belg.
Wonder-Boom. Nonnullus.
By Tiel, Twello, ter Wolde, Wiezel, Hattem, *en elders in* Gelderland; *in de Duinen niet verre van* Heemſtede; *by 't Huis* te Paauw; *en op veele andere plaatſen; in ſommige Boere-boven en Boomgaarden by* Haren *buiten* Groningen.

HYOSCYAMUS.

niger. 206. Hyoscyamus foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus. *Sp.* 257. *n.* 1. *Gelr.* 123. *Friſ.* 97.
Hyoſcyamus vulgaris & niger. *Baub. pin.* 169. *Comm. holl.* 59. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 494. *ſ.* 5. *t.* 11. *f.* 1.
Dol-Kruid, Zwart-Bilſen-Kruid. Belg.
Op de Kerkhoven en andere ruwe plaatſen, en overvloedig in de Duinen.
Pharm. Hyoscyami *rad. herb. ſem.*

SOLANUM.

Dulcamara 207. Solanum caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis. *Sp.* 264. *n.* 5. *Gelr.* 131. *Friſ.* 98.
Solanum ſcandens ſ. *Dulcamara. Baub. pin.* 167. *Comm. holl.* 106.
Dulcamara. *Dod. pempt.* 402.
Alfrank, Elfrank, Bitterzoet, Hoe langer hoe liever. Belg.
Elgjes-hout, Dolbeſſen-hout. Buranis.
Weer-hout. Veenendalenſibus.
Qualſter. Ruſticis.
Overvloedig aan de kanten der Slooten.
Pharm. Dulcamaræ *ſtipit.*
Contra Arthritidem & Febres intermittentes Ruſticis in uſu; & manducatur contra Sodam.

208. So-

208. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, racemis diſtichis nutantibus. *Sp.* 266. *n.* 15. *Gelr.* 129. *Friſ.* 99. *nigrum.*
Solanum officinarum. *Baub. pin.* 166. *Comm. boll.* 106.
Solanum hortenſe. *Dod. pempt.* 154.
Oed. dan. t. 460.
Nagtſchade, Dol-Kruid, Dolle-Beyen. Belg.
Op veele plaatſen langs de Wegen, en in de Hoven.
Pharm. SOLANI *berb.*
Variat baccis rubris, viridibus & nigris.

RHAMNUS.

209. RHAMNUS ſpinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. *Sp.* 279. *n.* 1. *catharticus*
Rhamnus catharticus. *Baub. pin.* 478.
Rhamnus ſolutivus. *Dod. pempt.* 756.
Rhynbezien-doorn, Doorn-bezien, Wege-doorn. Belg.
By Waſſenaar *en aan de weg van* 's Hage *naar* Scheveninngen *voorby het Tolbek, en elders daar omtrent in de Duinen.*
Pharm. RHAMNI CATHARTICI ſ. SPINÆ CERVINÆ *bacc.*

210. RHAMNUS inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Sp.* 280. *n.* 5. *Gelr.* 128. *Ingr.* 37. *Friſ.* 100. *Fraugula.*
Frangula. *Dod. pempt.* 784.
Alnus nigra baccifera. *Baub. pin.* 428. *Comm. boll.* 6.
Oed. dan. t. 278.
Honds-boom, Sporcken-bout, Pyl-bout. Belg.
Stincke-boom, Vuil-boom, Hontjes-Hout. vulgo.
Baccæ Groninganis *Ieupjes* audiunt.
Buiten Harderwyk *in* Tonſel *aan de* Nykerker-weg; *buiten* Utrecht, *de* Veurſt, Venendal; *in 't* Haagſche-Boſch; *in* Friesland *omtrent* Kuykhorne; *in* Swartzenburgs-Boſch; *in ruige Wallen en Kreupelbosjes by 't* Orange-Woud *en* Bonte Bok, *en elders; buiten* Groningen *in 't* Goreght *op de meeſte boſchachtige plaatſen.*

Digitized by Google

EUONYMUS.

Europæus. 211. Euonymus floribus plcriſque quadrifidis, foliis ſeſſilibus. *Sp.* 286. *n.* 1. *Gelr.* 85. *Friſ.* 101.
Euonymus vulgaris, granis rubentibus. *Baub.pin.* 428.
Euonymus. 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 57.
Tetragonia. *Dalech. hiſt.* 272.
Paapen - Muts, Paapen - Hoed, Paapen - Hout, Kardinaals - Muts, Kardinaals - Hoed. Belg.
Luizen - boom. Ruſticis.
By Ouden - Aller, *in* Hierden, *en elders buiten* Harderwyk; *veel om* Tiel, *te* Drumpt, *aan de* Waal - Dyk *op veele plaatſen; buiten* Utrecht *omtrent* Zeyſt; *op de* Velſerheide; *in* Friesland *buiten* Makkinga, *tuſſchen Kreupelhout; overvloedig by* Haren *buiten* Groningen.
Ruſtici pulvere fructuum utuntur ad pediculos capitum infantum necandos.

RIBES.

rubrum. 212. Ribes inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Sp.* 290. *n.* 1. *Gelr.* 135. *Friſ.* 102.
Ribes vulgare acidum rubrum. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 97.
Groſſularia multiplici acino, ſ. non ſpinoſa hortenſis rubra. *Baub. pin.* 455. *Comm. boll.* 55.
Wilde Roode Aalbezien. Belg.
Aan de Duinkant tuſſchen Overveen *en* Bredenrode; *buiten* Utrecht; *in* Friesland *op verſcheide plaatſen in Boſſchen, op oude Muuren en holle Boomen; buiten* Groningen *op de* Mickelhorſt *in 't Boſch.*

nigrum. 213. Ribes inerme, racemis piloſis, floribus oblongis. *Sp.* 291. *n.* 3. *Gelr.* 134.
Groſſularia non ſpinoſa, fructu nigro. *Baub. pin.* 455. *Comm. ball.* 56.
Oed. dan. t. 556.
Zwarte Aalbezien. Belg.
Overvloedig langs de Hackfortſche - beek *in 't Graafſchap* Zutphen; *aan de Duinkant van* Holland *op verſcheide plaatſen; buiten* Groningen *op de* Mickelhorſt *in 't Boſch, en by de Endekooy* tus-

tuſſchen de Mickelhorſt *en* Waterhuizen; *en ook op de Wilgeboomen in de Laan van de Borgh te* Hemmen.

214. Ribes ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea monophylla. *Sp.* 292. *n.* 7. *Gelr.* 136. *Friſ.* 103. *Uva criſpa.*
Groſſularia ſimplici acino, vel ſpinoſa ſylveſtris. *Baub. pin.* 455. *Comm. boll.* 55.
Uva criſpa. *Dod. pempt.* 748.
Oed. dan. t. 546.
Kruis - Doorn, Kruis - Beziën, Doorn - Beziën, Steekel - Beziën, Stik - Beſſen. Belg.
Kriſſen. Bommelienſibus.
Aan de Duinkant in 't Wild, en ook in de Heggen op ſommige plaatſen.

H E D E R A.

215. Hedera foliis ovatis lobatisque. *Sp.* 292. *n.* 1. *Gelr.* 132. *Friſ.* 104. *Helix.*
Hedera arborea. *Baub. pin.* 305. *Comm. boll.* 56.
Hedera. *Dod. pempt.* 413.
Klimop, Boom - Veil. Belg.
Eyloof. Rusticis.
β. Hedera maior ſterilis. *Baub. pin* 305. *Comm. boll.* 57.
Kleine Veil of *Klimop.* Belg.
Veel aan oude Muuren. β. *in den* Haarlemmer-Hout, *in 't* Haagſche *en andere Boſſchen, overvloedig in 't* Goregt *buiten* Groningen.
Pharm. Hederæ arboreæ. herb. bacc. gummi.
Flores bujus ſæpe bexandri bexapetali. (*Nob.* D. Fabricius Six.)

I L L E C E B R U M.

216. Illecebrum floribus verticillatis nudis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 298. *n.* 1. *Friſ.* 105. *verticillatum.*
Paronychia ſerpillifolia paluſtris. *Vaill. par.* 157. *t.* 15. *f.* 7.
Polygonum parvum, flore albo verticillato. *Baub. biſt.* 3. *p.* 371. *Comm. boll.* 89.
Oed. dan. t. 335.
Op vochtige Zandige gronden op de Veluwe, *en by* Zelhem *in 't Graafſchap* Zutphen; *op de Heide by*

 Rens-

Renswoude *en by de* Bildt *in 't Sticht van* Utrecht; *aan de Wallen en Wegen by het* Heereveen, Orangewoud, Auguſtinisga, &c. *in* Friesland; *en omtrent* Zwol.

GLAUX.

maritima. 217. Glaux. *Sp.* 301. *n.* 1. *Gelr.* 137. *Friſ.* 106.
Glaux maritima. *Baub. pin.* 215. *Comm. boll.* 45.
Alſine bifolia, fructu coriandri, radice geniculata. *Loeſſ. pruſſ.* 13. *t.* 3.
Oed. dan. t. 548.
Zee-Melk-kruid. Belg.
Aan de Zee-kant by Harderwyk, Elburg, Harlingen, Delfzyl, *en andere plaatſen; op op de Hoek langs 't Strand achter* 's Gravezande; *aan de Ykant, in de buitendykſe landen buiten* Amſterdam.

VINCA.

minor. 218. Vinca caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Sp.* 304. *n.* 1. *Gelr.* 138.
Clematis daphnoides minor. *Baub. pin.* 301.
Clematis daphnoides. *Dod. pempt.* 405.
Maagden-Palm, Vincoorde. Belg.
In de Boſſchadie voor Uilenpas; *en te* Maurik *in de* Betuwe; *by* Haren, *aan de Hooiweg naar de Waterhuizen buiten* Groningen.
Pharm. Vincæ pervincæ herb.

DIGYNIA.

HERNIARIA.

glabra. 219. Herniaria glabra. *Sp.* 317. *n.* 1. *Gelr.* 139. *Friſ.* 107.
Herniaria. *Dod. pempt.* 114.
Polygonum minus ſ. Millegrana major. *Baub. pin.* 281. *Comm. boll.* 88.
Oed. dan. t. 529.
Duizend-graan, Duizend-koorn. Belg.

Op

Op drooge zandige plaatſen buiten Haarlem, Zwol, *in de* Wouden *in* Friesland; *en elders.*

CHENOPODIUM.

220. CHENOPODIUM foliis triangulari - ſagittatis integerrimis, ſpicis compoſitis aphyllis axillaribus. *Sp.* 318. *n.* 1. *Bonus Henricus.*

Lapathum unctuoſum, folio triangulo. *Baub. pin.* 115. *Comm. boll.* 64.

Bonus Henricus. *Baub. biſt.* 2. *p.* 965.

Oed. dan. t. 579.

Goeden Hendrik, Algoede, Lammertjes - Ooren. Belg.

In de Moesboven en by de Wegen; veel te Putten *op de* Veluwe; *om* Tiel *en in de* Tielerwaard; *op 't Kerkhof te* Zoelen, *aan den Dyk by 't Dorp* Heusden, *en op de Paſtory te* Ommeren *in de* Neder-Betuwe; *langs de Maas-dyk en op de Heide by* 's Hage; *op de* Maat *omtrent* Wyk *by* Duurſtede; *en elders.*

Pharm. BONI HENRICI *herb.*

221. CHENOPODIUM foliis cordato - triangularibus obtuſiuſculis dentatis, racemis erectis compoſitis ſubfolioſis caule brevioribus. *Sp.* 318. *n.* 3. *Gelr.* 143. *Friſ.* 108. *rubrum.*

Atriplex ſylveſtris latifolia. *Baub. pin.* 119. *Comm. boll.* 14. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 604. *ſ.* 5. *t.* 31. *f.* 1.

Pes anſerinus. *Dod. pempt.* 616. *Dalecb. biſt.* 542. *fig. opt.*

Ganze - voet. Belg.

Op veele plaatſen langs de wegen en paden, by vervallene Gebouwen, en in de Moes - boven.

222. CHENOPODIUM foliis ovatis nitidis dentatis acutis, racemis ramoſis nudis. *Sp.* 318. *n.* 4. *Gelr.* 144. *murale.*

Chenopodium 1. *Tabern. biſt.* 812. *f.* 1.

Atriplex ſylveſtris latifolia, acutiore folio. *Baub. pin.* 119.

Op de Muuren, en aan de kanten der Akkers op veele plaatſen.

223. CHENOPODIUM foliis rhomboideo - triangularibus *album.*

Digitized by Google

bus eroſis poſtice integris: ſummis oblongis, racemis erectis. *Sp.* 319. *n.* 6. *Gelr.* 141.
Atriplex ſylveſtris, folio ſinuato candicante. *Baub. pin.* 119. *Comm. boll.* 13.
Atriplex ſylveſtris. *Fuchſ. biſt. t.* 119.
Wilde Melde. Belg.
Buiten Amſterdam, Doesburg, *en elders langs de Dyken en Wegen, en op de Akkers.*

viride. 224. Chenopodium foliis rhomboideis dentato-ſinuatis, racemis ramoſis ſubfoliatis. *Sp.* 319. *n.* 7. *Friſ.* 109.
Chenopodium ſylveſtre, opuli folio. *Vaill. par.* 36. *t.* 7. *f.* 1.
Atriplex ſylveſtris. *Baub. biſt.* 2. *p.* 972.
Veel in de Moes-boven.
Cl. Commelinus *Atriplicem ſylveſtrem I. B. babuit pro Chenopodio albo.*

hybridum. 225. Chenopodium foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramoſis nudis. *Sp.* 319. *n.* 8. *Gelr.* 144. *Friſ.* 110.
Chenopodium ſtramonii folio. *Vaill. par.* 36. *t.* 7. *f.* 2.
Chenopodium 2. *Tabern. biſt.* 812. *f.* 2.
Veel in Koorn-en andere Bouw-landen in Friesland; *by Meſtboopen omtrent* Zwol, *en elders.*

Botrys. 226. Chenopodium foliis oblongis ſinuatis, racemis nudis multifidis. *Sp.* 320. *n.* 9. *Friſ.* 111.
Botrys ambroſioides vulgaris. *Baub. pin.* 138.
Botrys. *Dod. pempt.* 34.
Druiven-kruid, Motte-kruid. Belg.
In Boom-kwekeryen en ſommige Moes-landen, tuſſcben de Boomen en Vrucbten buiten Leeuwaarden. (Meese.)
Pharm. Botryos. *berb.*

glaucum. 227. Chenopodium foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis ſimplicibus glomeratis. *Sp.* 320. *n.* 13. *Gelr.* 142. *Friſ.* 112.
Atriplex anguſtifolia laciniata minor. *Baub. biſt.* 2. *p* 972. *Comm. boll.* 14.
Veel langs de Wegen omtrent Amſterdam, Zwol, *en elders by Boere-Woningen en Meſtboopen.*

228. Che-

228. CHENOPODIUM foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Sp.* 321. *n.* 14. *Friſ.* 113. *Vulvaria.*
Atriplex foetida. *Baub. pin.* 119.
Vulvaria. *Dalech. biſt.* 543.
Stinkende Melde. Belg.
Overal in Moes-boven, en aan de Wegen in Friesland.

229. CHENOPODIUM foliis intergerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. *Sp.* 321. *n.* 15. *polyſpermum.*
Blitum polyſpermum. *Baub. pin.* 118.
Blitum minus polyſpermum a ſeminis copia. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 599. *ſ.* 5. *t.* 30. *f.* 6.
In de Moes-boven op verſcheide plaatſen.

230 CHENOPODIUM foliis ſubulatis ſemicylindricis. *Sp.* 321. *n* 17. *Friſ. p.* 87. *maritimum.*
Kali minus album, ſemine ſplendente. *Baub. pin.* 289. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 610. *ſ.* 5. *t.* 33. *f.* 3.
Kali minus, ſ. Sedum minus arboreſcens vermiculatum. *Baub. biſt.* 3. *p.* 702. *Comm. boll.* 62.
Oed. dan. t. 489.
Kleine witte Kali. Belg.
Overvloedig op de weg naar de Helder *op 't Koegras, en aan de Zee-kant by* 's Gravezande, Enkhuiſen, Delfzyl, *en in* Friesland.

B E T A.

231. BETA floribus geminis. *Sp.* 322. *n.* 1. *maritima.*
Beta ſylveſtris maritima. *Baub. pin.* 118.
Wilde Beete of Kroote. Belg.
Aan de Zee-kant by Helvoetſluis.

S A L S O L A.

232. SALSOLA herbacea decumbens, foliis ſubulatis ſpinoſis ſcabris, calycibus marginatis axillaribus. *Sp.* 322. *n.* 1. *Gelr.* 146. *Friſ.* 114. *Kali.*
Kali ſpinoſo affinis. *Baub. pin.* 289. *Comm. boll.* 62. *tMoriſ. biſt.* 2. *p.* 611. *ſ.* 5. *t.* 33. *f.* 11.
Seekende Kali. Belg.
Op veele plaatſen langs de Zee-kant by Hoophuiſen *bui-*

Digitized by Google

buiten Harderwyk, *by* Scheveningen, 's Graveſzande, Zandvoort, Wyk op Zee; *aan de Zeedyk by* Medenblick, *en tuſſchen* Harlingen *en* Roptazyl.

Soda. 233. Salsola herbacea patula, foliis inermibus. *Sp.* 323. *n.* 6.
Kali. *Dod. pempt.* 81.
Kali majus, cochleato ſemine. *Baub. pin.* 287.
† *Volgens* Boerhaave.
Pharm. Kali *herb.*

fruticoſa. 234. Salsola fruticoſa erecta, foliis filiformibus obtuſiuſculis. *Sp.* 324. *n.* 11.
Kali ſpecies, ſ. Vermicularis marina arboreſcens. *Baub. biſt.* 3. *p.* 701. *Comm. boll.* 62.
Anthyllis chamæpityides fruteſcens. *Baub. pin.* 282.
Op 't Eyland Walcheren *en* Texel.

U L M U S.

campeſtris. 235. Ulmus foliis duplicato-ſerratis: baſi inæqualibus. *Sp* 327. *n.* 1. *Gelr.* 151.
Ulmus campeſtris & theophraſti. *Baub. pin.* 426. *Comm. boll.* 116.
Ulmus. *Dod. pempt.* 837.
Olm-boom, Ypen-boom, Herſeleer. Belg.
Overal aan de Wegen en in de Boſſchen.

G E N T I A N A.

Pneumonanthe. 236. Gentiana corollis quinquefidis campanulatis oppoſitis pedunculatis, foliis linearibus. *Sp.* 330. *n.* 5. *Gelr.* 147. *Friſ.* 116.
Gentiana anguſtifolia autumnalis major. *Baub. pin.* 188. *Comm. boll.* 44. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 483. *ſ.* 12. *t.* 5. *f.* 12.
Gentiana paluſtris anguſtifolia. *Dod. pempt.* 168. *Oed. dan. t.* 269.
Klein Gentiaan, Blauwe Lelytjes, Spade Kloxkens. Belg.
In Veen-landen en op vochtige Hei-velden by Harderwyk, Hartskamp, Voorthuiſen, Barneveld, Hal, Uilenpas, *en elders in* Gelderland; *by* Naarden, Utrecht, Zwol, *by* Heerenveen, Bergum, Rot-

Digitized by Google

Rotteval, Dragten, *en elders in* Frieſland; *by* Haren, *de* Mickelhorſt, *en elders in de Provintie* Groningen.

237. GENTIANA corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis majoribus. *Sp.* 331. *n.* 10. *verna.*
Gentianella alpina verna major. *Baub. pin.* 188.
Gentianella verna minor. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 315.
Ericoila *Reneale ſpec.* 75. *t.* 68.
† *Volgens* BOERHAAVE.

238. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, piſtillo ſimplici. *Sp.* 332. *n.* 17. *Gelr.* 149. *Friſ.* 117. *Centaurium.*
Centaurium minus. *Baub. pin.* 278. *Dod. pempt.* 336. *Comm. boll.* 23.
Duizend-guldens-kruid, Kleine Santory. Belg.
β. Centaurium minus, flore albo. *Baub. pin.* 278. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 223.
Overvloedig in de Duin-valeyen van Holland; *in ſcbraale Wei landen te* Aveſaatte, Maurik, *en vooral te* Omſneren *in de* Betuwe; *in de Weilanden by* Zutphen, *en tuſſcben* Harderwyk *en* Doornſpyk; *ook by* Zeiſt, Amerongen, Neer-Langbroek, Wykerſloot *in de Provincie* Utrecht; *by* Franeker, Bergum, Dragten, Ooſtermeer *en* Heerenveen *in* Frieſland *op verſchillende gronden en in groote menigte op 't Eiland* Schiermunnikoog.
Pharm. CENTAURII MINORIS *berb. ſummit.*

239. GENTIANA corollis quadrifidis fauce barbatis. *Sp.* 334. *n.* 23. *campeſtris*
Gentiana purpurea minima. *Col. ecpbr.* 1. *p.* 223. *t.* 221.
Gentianella alpina verna minor. *Baub. pin.* 188.
Oed. dan. t. 367.
Op de Heide by Hengel *in 't Graafſchap* Zutphen; *in de Duinen tuſſchen* Velſen *en* Beverwyk, *agter de Hofſtede* Weſterhout; *en agter* Leyduin *by de* Vogelzang *buiten* Haarlem.

240. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus, floribus verticillatis ſeſſilibus. *Sp.* 334. *n.* 25. *Cruciata.*
Gentiana cruciata. *Baub. pin.* 188. *Comm. boll.* 43. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 205.

Gentiana minor. *Cam. epit.* 417.
Maldelgeer. Belg.
In verſcheide Duin-valeyen agter Overveen *buiten* Haarlem; *en overvloedig langs de weg naar* Scheveningen *buiten* 's Hage.

ERYNGIUM.

maritimum 241. ERYNGIUM foliis radicalibus ſubrotundis plicatis, ſpinoſis, capitulis pedunculatis paleis tricuſpidatis. *Sp.* 337. *n.* 5. *Gelr.* 152. *Friſ.* 118.
Eryngium maritimum. *Baub. pin.* 386. *Comm. boll.* 35.
Eryngium marinum. *Dod. pempt.* 370. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 169. *Cam. epit.* 448.
Zee-Kruis-Diſtel, Meer-Diſtel. Belg.
Veel aan de Zee-kant by Harderwyk; *aan de Zee-Dyken en Duinen van* Holland, *en digt by het ſtrand te* Zandvoort; *in* Friesland *tuſſchen* Harlingen *en* Roptazyl, *en elders aan de Zee-Dyken; ook binnenslands by* Schagen *buiten* Alkmaar.
Pharm. ERYNGII MARITIMI *rad.*

campeſtre. 242. ERYNGIUM foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato-laciniatis. *Sp.* 337. *n.* 8. *Gelr.* 153.
Eryngium vulgare. *Baub. pin.* 386. *Comm. boll.* 35.
Eryngium campeſtre vulgare. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 157.
Oed. dan. t. 554.
Veld-Kruis-Diſtel, Wallen-Diſtel. Belg.
Tuimel-Diſtel. Vulgo.
Overvloedig aan den Yſſel-dyk *in* Gelderland *en* Overyſſel; *aan de* Lek-dyk *in de Provintie* Utrecht; *by de vervallen Kerk op* Muiderberg; *langs de Dyken by* Loosduinen, Monſter, 's Gravezande; *en elders op zandige ruwe plaatſen.*

HYDROCOTYLE.

vulgaris. 243. HYDROCOTYLE foliis peltatis, umbellis quinquefloris. *Sp.* 338. *n.* 1. *Gelr.* 154. *Friſ.* 119.
Hydrocotyle vulgaris. *Tourn. inſt.* 328. *Lind. alſ.* 266. *t.* 12.
Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio. *Baub.*

pin

pin. 180. *Comm. boll.* 96.
Cotyledon paluſtris. *Dod. pempt.* 113.
Oed. dan. t. 90.
Water-Navel-Kruid. Belg.
In vochtige Wei-en Hooi-landen by Harderwyk, Amſterdam, Zwol, *en elders; ook in de Duin-valeyen; in* Friesland *in de* Wouden; *en in de Provincie* Groningen *by* Haren, *de* Waterhuizen, &c. *zeer gemeen, aan kanten van Slooten, en op andere vochtige gronden.*

SANICULA.

244. SANICULA foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus. *Sp.* 339. *n.* 1. *Gelr.* 155. *europaea.*
Sanicula officinarum. *Baub. pin.* 319.
Diapenſia. *Cam. epit.* 763.
Oed. dan. t. 283.
Sanikel, Breuk-kruid. Belg.
Op ſchaduwachtige plaatſen by Engelenburg *en* Uilenpas *in* Gelderland.
Pharm. SANICULÆ *herb.*

BUPLEURUM.

245. BUPLEURUM involucris univerſalibus nullis, foliis perfoliatis. *Sp.* 340. *n.* 1. *Gelr.* 169. *rotundifolium.*
Perfoliata vulgatiſſima, ſ. arvenſis. *Baub. pin.* 277.
Perfoliata. *Dod. pempt.* 104.
Deurwas, Doorwas. Belg.
In de Koorn-landeu by Uilcnpas *en* Hunderen *in* Gelderland.

TORDYLIUM.

246. TORDYLIUM umbellis confertis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Sp.* 346. *n.* 6. *Friſ.* 120. *Anthriſcus.*
Caucalis ſeminc aſpero, floſculis rubentibus. *Baub. pin.* 152. *prodr.* 80. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 63.
Caucalis minor, flore rubente. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 308. *ſ.* 9. *t.* 14. *f.* 8.
Akker-Klitzen. Belg.

Digitized by Google

Langs de zandige Wegen buiten Haarlem, Utrecht, Zwol, *en in de* Schermer *buiten* Alkmaar. *Aan drooge Wallen en op andere ſchraale plaatſen en wegen buiten* Franeker, *en elders in* Friesland.

In Comm. boll. 23. *perperam hæc planta reeenſetur nomine* Caucalidis lato apii folio. *Baub. pin.* 152.

Nodoſum. 247. TORDYLIUM umbellis ſimplicibus ſeſſilibus, ſeminibus exterioribus hiſpidis. *Sp.* 346. *n.* 7. *Friſ.* 121.

Caucalis nodoſa, echinato ſemine. *Baub. pin.* 153. *prodr.* 80. *Baub. biſt.* 3. *p.* 83.

In Friesland *by de voorige.* (MEESE.)

DAUCUS.

Carota. 248. DAUCUS ſeminibus hiſpidis, petiolis ſubtus nervoſis. *Sp.* 348. *n.* 1. *Gelr.* 156. *Friſ.* 122.

Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris dioſcoridis, vel Daucus officinarum. *Baub. pin.* 151. *Comm. boll.* 85. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 305. *ſ.* 9. *t.* 13. *f.* 2.

Wilde-Peen, Vogel-neſt, Kroontjes-kruid. Belg.

Overvloedig in braak-leggende Zaai-landen by Tiel, Zutphen, Doesburg, Harderwyk; *aan de Duinkanten van* Holland; *aan de wegen om* Wyk by Duurſtede; *aan de ryd-en trekweg tuſſchen* Harlingen *en* Franeker; *en elders.*

Pharm. DAUCI VULGARIS *ſem.*

BUNIUM.

Bulbocaſtanum. 249. BUNIUM. *Sp.* 349. *n.* 1.

Bulbocaſtanum majus, folio apii. *Baub. pin.* 162. *Comm. boll.* 17.

Nucula terreſtris. *Lob. biſt.* 429.

Oed. dan. t. 220.

Aard-Nooten. Belg.

By Loosduinen, Monſter, *de* Zandpoort, *en omtrent* Velſen *in de Zaai-landen.*

CONIUM.

Maculatum. 250. CONIUM ſeminibus ſtriatis. *Sp.* 349. *n.* 1. *Gelr.* 157. *Friſ.* 123.

Cicuta major. *Baub. pin.* 160. *Comm. boll.* 26. *Mo-*

Digitized by Google

Moriſ. hiſt. 3. *p.* 290. *ſ.* 9. *t.* 6. *f.* 1.
Dolle-Kervel, Scheerling. Belg.
Veel by de Wegen en Paden, en aan de Slooten, als ook in de Boſſchen.
Pharm. CICUTÆ MAJORIS *herb.*

SELINUM.

251. SELINUM radice fuſiformi multiplici. *Sp.* 350. *n.* 1. *Gelr.* 158. *ſylveſtre.*
Apium ſylveſtre lacteo ſucco turgens. *Baub. pin.* 153. *Comm. holl.* 12.
Thyſſelinum plinii. *Lob. hiſt.* 409. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 319. *ſ.* 9. *t.* 17. *f.* 2.
Wilde Peterſelie. Belg.
Aan de kanten van de Boomgaarden, op vochtige ſchaduwachtige plaatſen, buiten Haarlem, Utrecht, Zwol, *en elders.*

252. SELINUM ſublacteſcens, radice unica. *Sp.* 350. *n.* 2. *Friſ.* 124. *paluſtre.*
Seſeli paluſtre lacteſcens. *Baub. pin.* 162. *prodr.* 85. *Comm. holl.* 105.
Seſeli paluſtre lacteſcens acre, foliis ferulaceis, flore albo, ſemine lato. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 189.
Wilde-Eppe. Belg.
Overvloedig in de Slooten om Tiel; *in de Weiden te* Kraalingen *by* Rotterdam; *aan de Slootswallen by* Tjetjerk, Bergum, *en elders in de* Wouden *in* Friesland; *in ſtilſtaande Poelen en byna uitgedroogde Slooten in de* Zillik *in* Overyſſel.

PEUCEDANUM.

253. PEUCEDANUM foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. *Sp.* 353. *n.* 1. *Friſ.* 125. *officinale.*
Peucedanum germanicum. *Baub. pin.* 149.
Peucedanum. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 36.
Varkens-Venkel. Belg.
Aan de wegen en kanten der Slooten te Bergum, Ooſtermeer, Langweer, Heerenveen, &c. *in* Friesland.
Pharm. PEUCEDANI *rad.*

CRITH-

CRITHMUM.

maritimum 254. Crithmum foliolis lanceolatis carnoſis. *Sp.* 354 *n.* 1.
Crithmum ſ. Foeniculum maritimum minus. *Baub. pin.* 288. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 57.
Foeniculum marinum. ſ. Empetrum. ſ. Calcifraga. *Lob. ic.* 392.
Zee-Venkel, Zee-Peterſelie. Belg.
In Zeeland.

HERACLEUM.

Sphondylium. 255. Heracleum foliolis pinnatifidis lævibus, floribus uniformibus. *Sp.* 358. *n.* 1. *Gelr.* 175.
Sphondylium vulgare hirſutum. *Baub. pin.* 157. *Comm. boll.* 108. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 313. *ſ.* 9. *t.* 16. *f.* 1.
Beeren-Klaauw. Belg.
Zeer veel in de Betuwe, Tielerwaard, *en om* Tiel; *buiten* Harderwyk *langs 't voetpad aan de Hooge Sypel; in 't* Haagſche Boſch; *in den* Haarlemmer-hout; *om* Utrecht, Wyk by Duurſtede, Zwol, *in 't* Goregt *buiten* Groningen; *en elders op ſchaduwachtige plaatſen.*

LIGUSTICUM.

Leviſticum. 256. Ligusticum foliis multiplicibus: foliolis ſuperne inciſis. *Sp.* 359. *n.* 1.
Liguſticum vulgare. *Baub. pin.* 157. *Comm. boll.* 66.
Leviſticum vulgare. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 275. *ſ.* 9. *t.* 3. *f.* 1.
Lavas. Belg.
Lubbeſtok, Mans-kracht. Ruſticis.
In de Duinen van den Weeligen-berg tuſſchen Haarlem *en* Bennenbroek, *en elders.*
Pharm. Levistici *rad. berb. ſem.*

ANGELICA.

ſylveſtris. 257. Angelica foliolis æqualibus ovato-lanceolatis ſerratis. *Sp.* 361 *n.* 2. *Gelr.* 161. *Friſ.* 126.
Angelica ſylveſtris major. *Baub. pin.* 155. *Comm. boll.* 10.
Angelica ſylveſtris. *Dod. pempt.* 318.

An-

Wilde Angelica. Belg.
In de Boſſchadien by Uilenpas, Enghuiſen, Tiel, *en elders in* Gelderland; *langs de Graften en Slooten by* 's Hage; *in de Veen-landen by* Amſtelveen; *in den Aardenbouts-laan buiten* Haarlem; *aan de Zander-ſloot buiten* Alkmaar; *te* Bergum, Ooſtermeer, Langeweer, Heerenveen, *en elders in* Friesland; *op de* Mickelhorſt *en elders buiten* Groningen.

S I U M.

258. Sium foliis pinnatis, umbella terminali. *Sp.* 361. *n.* 1. *Gelr.* 162. *latifolium.*
Sium latifolium *Baub. pin.* 154.
Sium ſive Apium paluſtre, foliis oblongis. C. B. *Comm. boll.* 106.
Sium majus latifolinm. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 282. *ſ.* 9. *t* 5. *f.* 1.
Oed. dan. t 246.
Water-Eppe. Belg.
In veele Slooten en Beeken; overvloedig aan 't Eind van de Hooge Sypel by Harderwyk; *en aan de Duinkant.*
Synonymum C. Baub. a Commelino allegatum pertinet ad Sium anguſtifolium Linn.

259. Sium foliis pinnatis, umbellis axillaribus ſeſſilibus. *Sp.* 361. *n.* 2. *Friſ.* 128. *nodiflorum.*
Sium aquaticum procnmbens ad alas floridum. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 283. *ſ.* 9. *t.* 5. *f.* 3.
Als vooren; en in de Slooten rondom Zandhorſt *in* Holland; *ook omtrent* Auguſtinisga, *en aan de kanten van de Rivier de* Tjonger *of* Kuinder *by* Oude-Berkoop *in* Friesland.
Confunditur ab imperitis cum Siſymbrio Naſturtio aquatico dicto.

S I S O N.

260. Sison repens, umbellis bifidis. *Sp.* 363. *n.* 5. *Ingr.* 43. *Friſ.* 129. *inundatum.*
Sium minimum, foliis imis ferulaceis. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 283 *ſ.* 9. *t.* 5. *f.* 5.
Millefolium aquaticum umbellatum capillaceo bre-

brevique folio. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 74.
Oed. dan. t. 89.
In ſtilſtaande zoete wateren aan de Duinkant by den Aardenhout; *en buiten* Utrecht; *in natte gruppels, in en aan de kanten der Slooten, omtrent* Kuikhorne, Bonte-bok, Ureterp, Deurswolde, Haule, &c. *in* Friesland.

OENANTHE.

fiſtuloſa. 261. OENANTHE ſtolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fiſtuloſis. *Sp.* 365. *n.* 1. *Gelr.* 165. *Friſ.* 138.
Oenanthe aquatica. *Baub. pin.* 162. *Comm. boll.* 81.
Juncus odoratus aquatilis. *Dod. pempt.* 590.
Welriekende Water-Bieſen. Belg.
β. Oenanthe aquatica minor. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 51.
Veel in ſtilſtaande Wateren en vochtige Wei-landen.

PHELLANDRIUM.

aquaticum. 262. PHELLANDRIUM foliorum ramificationibus divaricatis. *Sp.* 366. *n.* 1. *Gelr.* 166. *Friſ.* 131
Phellandrium. *Dod. pempt.* 591.
Cicutaria paluſtris tenuifolia. *Baub. pin.* 161. *Comm. boll.* 26.
Water-Kervel. Belg
Op veele plaatſen in de Slooten en Graften.
Pharm. PHELLANDRII *herb. ſem.*
Bobus innoxium eſt tabulum.

CICUTA.

viroſa. 263. CICUTA umbellis oppoſitifoliis, petiolis marginatis obtuſis. *Sp.* 366. *n.* 1. *Gelr.* 167. *Friſ.* 132.
Cicuta aquatica gesneri. *Baub. biſt.* 3. *p.* 175.
Sium erucæ folio. *Baub. pin.* 154. *Comm. boll.* 106.
Sium alterum. *Dod. pempt.* 589.
Oed. dan. t. 208.
Dolle-Kervel of *Water-Scheerling.* Belg.
Op verſcheide plaatſen in de Slooten en Moeraſſen; aan 't Konings-meer by Meerveld *op de* Veluwe; *in eenen diepen Sloot boven de Stad* Cutlenburg; *veel aan de Duinkant, en om* 's Hage *in de veenplaſſen, en in de Ooſt-en Weſt-beek; in de Slooten*

ten nevens 't Hoorenſche-diep, *en aan de* Oſſebrink *agter de* Mickelhorſt, *ook by de* Waterhuizen *buiten* Groningen.

Pharm. CICUTÆ *herb.*

ÆTHUSA.

264. ÆTHUSA foliis conformibus. *Sp.* 367. *n.* 1. *Gelr.* 168. *Friſ.* 132. *Cynapium.*

Cicuta minor, petroſelino ſimilis. *Baub. pin.* 160. *Comm. boll.* 26. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 290. *ſ.* 9. *t.* 7. *f.* 2.

Cicutaria fatua. *Lob. ic.* 280.

Kleine Dulle-Kervel, Wilde Eppe, Wilde Peterſelie, Honds-Peterſelie. Belg.

Buiten Amſterdam *op de weg naar* Amſtelveen; *in 't* Haagſe-boſch *tuſſchen de Akkers, en veel by de Boere-hoeven in de Duinen; ook veel omtrent* Deventer *en* Zwol; *en in* Friesland *aan de Wegen, in de Boſſchen en Moes-hoven op veele plaatſen.*

SCANDIX.

265. SCANDIX feminibus roſtro longiſſimo. *Sp.* 368. *n.* 2. *Gelr.* 170. *Friſ.* 134. *Pecten.*

Scandix, ſemine roſtrato, vulgaris. *Baub. pin.* 152. *Comm. boll.* 103. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 304. *ſ.* 9. *t.* 11. *f.* 1.

Pecten veneris. *Cam. epit.* 302.

Naalde-Kervel. Belg.

Ooijevaars-Neb, Kraanebek. Ruſticis.

In de Zaailanden op veele plaatſen.

266. SCANDIX feminibus nitidis ovato-ſubulatis, umbellis ſeſſilibus lateralibus. *Sp.* 368. *n.* 3. *Gelr.* 172. *Cerefolium*

Chærophyllum ſativum. *Baub. pin.* 152. *Comm. boll.* 25.

Chærefolium. *Dod. pempt.* 700.

Kervel. Belg.

Komt op veele Akkers en in Moes-hoven van zelfs voort.

Pharm. CHÆROPHYLLI *herb. ſem.*

267. SCANDIX ſeminibus ovatis hiſpidis, corollis uni- *Anthriscus*

uniformibus, caule lævi. *Sp.* 368. *n.* 4. *Gelr.* 171. *Friſ.* 135.

Cerefolium ſylveſtre annuum, ſeminibus brevioribus villoſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 303. *ſ.* 9. *t.* 10. *f.* 2.

Myrrhis ſylveſtris, ſeminibus aſperis. *Bauh. pin.* 160. *Comm. boll.* 79.

Veel by de wegen op ruwe plaatſen buiten Harderwyk, Amſterdam, *aan de Stads-wal te* Franeker; *en elders.*

CHÆROPHYLLUM.

ſylveſtre. 268. CHÆROPHYLLUM caule lævi ſtriato geniculis tumidiuſculis. *Sp.* 369. *n.* 1. *Gelr.* 173. *Friſ.* 136.

Myrrhis ſylveſtris, ſeminibus lævibus. *Bauh. pin.* 160. *Comm. boll.* 79.

Myrrhis vulgaris. *Dod. pempt.* 701.

Wilde Kervel, Pyp-kruid. Belg.

By de wegen en in de velden, omtrent Scheveningen, Heemſtedè, Zwol, &c.

Luſcinias allicere dicitur, unde Nagtegaals-kruid *Weſtfriſiis audit.*

temulentum. 269. CHÆROPHYLLUM caule ſcabro: geniculis tumidis. *Sp.* 370. *n.* 3. *Gelr.* 174.

Chærophyllum ſylveſtre. *Bauh. pin.* 152. *Comm. boll.* 79.

Myrrhis annua vulgaris, caule fuſco. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 302. *ſ.* 9. *t.* 10. *f.* 7.

Wilde Kervel. Belg.

Langs de wegen, op vochtige ſchaduwachtig plaatſen omtrent Harderwyk, 's Hage, Haarlem, Zwol, &c.

PASTINACA.

ſativa. 270. PASTINACA foliis ſimpliciter pinnatis. *Sp.* 376. *n.* 1. *Gelr.* 176. *Friſ.* 137.

Paſtinaca ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 155. *Comm. boll.* 85. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 314. *ſ.* 9. *t.* 16. *f.* 2.

Wilde Paſtinaken, of Pinxternakels. Belg.

In de Weiden, en aan de kanten der Akkers, ook by de wegen omtrent Harderwyk, 's Hage, Haarlem.

lem, Utrecht; *in* Friesland *zoo op de* Kley *als in de* Wouden; *overvloedig aan de Slooten van 't laage land van 't* Goregt *buiten* Groningen.
Pharm. PASTINACÆ SYLVESTRIS *rad. ſem.*

SMYRNIUM.

271. SMYRNIUM foliis caulinis ternatis petiolatis ſerratis. *Sp.* 376. *n.* 3. *oluſatrum.*
Hippoſelinum theophraſti ſ. Smyrnium dioſcoridis. *Baub. pin.* 154. *Comm. boll.* 59.
Hippoſelinum. *Dod. pempt.* 698.
Grootſte Eppe, Wilde Eppe. Belg.
Veel op 't Eyland Texel.
Pharm. OLERIS ATRI *herb. ſem.*

CARUM.

272. CARUM. *Sp.* 378. *n.* 1. *Ingr.* 45. *Friſ.* 138. *Dod. pempt.* 299. *Cam. epit.* 516. *Carui.*
Cuminum pratenſe, Carui officinarum. *Baub. pin.* 158. *Comm. boll.* 29.
Carwey, Caruwy, Hof-Comyn. Belg.
In 't Broeck by Arnhem; *in de Weiden om* Tiel, *en te* Meinderswyk *in de* Betuwe; *aan den Dyk tuſſchen* Amſterdam *en* Muyden; *by* Houten *buiten* Utrecht; *in verſcheide Weilanden buiten* Franeker; *in een ſtuk Weiland even buiten de Ebbingepoort te* Groningen.

PIMPINELLA.

273. PIMPINELLA foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis; ſummis linearibus. *Sp.* 378. *n.* 1. *Gelr.* 179. *Friſ.* 139. *Saxifraga.*
Pimpinella ſaxifraga minor. *Baub.* 160. *Cam. epit.* 775. *Comm. boll.* 88.
Tragoſelinum foliis pinnatis, pinnis ovatis. *Hall. biſt.* 1. *p.* 350.
Kleine Bevernel, Bevernaart, of *Steenbreek.* Belg.
Op zandige plaatſen by Hattem, Zwol, Velſen, *in de wildernis by 's Huis te* Bredenrode *achter de* Zandpoort; *in de Duinen tuſſchen de Heide buiten* 's Hage; *aan de Wegen en op Heivelden by* Bergum, Heerenveen *en* Orange-woud *in* Friesland

Digitized by Google

magna. 274. PIMPINELLA foliolis omnibus lobatis: impari-trilobo. *Mant.* 219.
Pimpinella ſaxifraga major, umbella candida. *Baub. pin.* 159. *Comm. boll.* 88.
Pimpinella ſaxifragia. *Cam. epit.* 775.
Saxifraga magna. *Dod. pempt.* 315.
Tragoſelinum foliis pinnatis, pinnis lanceolatis, ſerratis, extremis trilobatis. *Hall. hiſt.* 1. *p.* 349.
Groote Bevernel, Bevernaart, of *Steenbreek.* Belg.
Buiten Haarlem *voorby de* Zandpoort *op hooge landen.*
Pharm. PIMPINELLÆ ALBÆ *rad. ſem.*
Præcedenti minus acris.

APIUM.

graveolens. 275. APIUM foliolis caulinis cuneiformibus. *Sp.* 379. *n.* 2. *Gelr.* 181. *Friſ. p.* 87.
Apium paluſtre & Apium officinarum. *Baub. pin.* 154. *Comm. boll.* 12.
Apium paluſtre. *Cam. epit.* 527.
Juffrouw-Merk, Eppe, Wilde Seldery. Belg.
Langs de Muider-dyk *omtrent* Amſterdam; *langs de weg naar* Spaarnwoude *en 't* Penninx-veer *buiten* Haarlem; *in de Slooten tuſſchen het Riet langs de* Maas *agter* 's Gravendyk; *in* Water-land; *aan de kanten der Slooten op veele plaatſen buiten* Alkmaar; *op 't Eyland* Schokland; *aan den* Yſsel-dyk *by* Campen; *ook in* Worrummer-Nylanden *in* Friesland.
Pharm. APII. *rad. herb. ſem.*

ÆGOPODIUM.

Podagraria 276. ÆGOPODIUM foliis caulinis ſummis ternatis. *Sp.* 379. *n.* 1. *Gelr.* 180. *Friſ.* 140.
Angelica ſylveſtris minor ſive erratica. *Baub. pin.* 155. *Comm. boll.* 11.
Herba gerardi. *Dod. pempt.* 320.
Gerards-Kruid, Flierſin-Kruid, Haanepoot. Belg.
Zevenblad. Vulgo.
Overvloedig by de Wegen, aan Wallen, in Hoven, onder de Heggen op ſchaduwachtige plaatſen.

TRI-

T R I G Y N I A.

V I B U R N U M.

277. VIBURNUM foliis lobatis, petiolis glanduloſis. *Opulus.*
Sp. 384. *n.* 7. *Gelr.* 183.
Sambucus aquatica, flore ſimplici. *Baub. pin.* 456.
Sambucus paluſtris. *Dod. pempt.* 846.
Water-Vlier. Belg.
By de Gelderſche Toorn, Engelenborgh, *in* Elderik, Wehl. *in 't Graafſchap* Zutphen; *in* Tonſel *en* Hierden *buiten* Harderwyk; *in 't* Haagſe-boſch; *in de* Herkeloer-*en* Salker-Waart; *in 't boſch op de* Mickelhorſt, *en te* Onnen *by* Groningen.
Varietas hujus flore globoſo pleno, quæ in hortis colitur, vulgo Gelderſche-Roos, Sneeuw-ballen, Bal-Roozen vocatur.

S A M B U C U S.

278. SAMBUCUS cymis tripartitis, ſtipulis foliaceis, *Ebulus.*
caule herbaceo. *Sp.* 385. *n.* 1. *Gelr.* 185. *Friſ.* 141.
Sambucus humilis ſ. Ebulus. *Baub. pin.* 456. *Comm. holl.* 102.
Ebulus. *Dod. pempt.* 381.
Wilde Vlier, Laage Vlier, Haddig. Belg.
Overvloedig langs de weg tuſſchen Gend *en* Bemmel; *te* Ogten *en* Ommeren, *en aan den Dyk tuſſchen* Lienden *en* Keſteren *in de* Betuwe; *in* Tonſel *en elders buiten* Harderwyk; *op een braakland by ter* Wolde; *langs de Trekvaart by* Delft; *te* Aſch *buiten* Buuren; *by* Leerdam *en* Heukelum; *tuſſchen* Odyk *en* Werkhoven, *om* Wyk by Duurſtede, *en langs de weg by* Cothen *en* Bunnik *in 't Sticht van* Utrecht; *buiten* Leeuwaarden, *en omtrent* Huyſum *en* Ooſtermeer *in* Friesland.
Pharm. EBULI *rad. cort. interior, herb. bacc.*

279. SAMBUCUS cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Sp.* 385. *n.* 3. *Gelr.* 185. *Friſ.* 142. *nigra.*
Sambucus fructu in umbella nigro. *Baub. pin.* 456.

Digitized by Google

Comm. boll. 102.
Sambucus. *Dod. pempt.* 845.
Oed. dan. t. 545.
Vlier-boom. Belg.
β. Sambucus laciniato folio. *Baub. pin.* 456.
In Boſſchen en aan ruige wallen, by vervallene gebouwen, en op kerkhoven aan veele plaatſen; overvloedig in de Duinen by Haarlem, Heemſtede, *en* Katwyk.
Pharm. SAMBUCI *cort. interior, flor. bacc. ſem.*

CORRIGIOLA.

litoralis. 280. CORRIGIOLA. *Sp.* 388. *n.* 1. *Gelr.* 186.
Polygonum littoreum minus, floſculis ſpadiceo-albicantibus. *Baub. pin.* 284. *prodr.* 131. *Comm. boll.* 90. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 593. *ſ.* 5. *t.* 29. *f.* 1.
Polygoni-vel Linifolia per terram ſparſa, flore ſcorpioides. *Baub. biſt.* 3. *p.* 379. *Comm. boll.* 91.
Oed. dan. t. 334.
Aan den Oever van den Ouden-Yſſel *by* Keppel; *aan de* Zandvaart *by 't* Kraayeneſt *buiten* Haarlem; *en aan de* Bilt *buiten* Utrecht *op zandige gronden.*

ALSINE.

media. 281. ALSINE petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Sp.* 389. *n.* 1. *Gelr.* 253. *Friſ.* 143.
Alſine media. *Baub. pin.* 250. *Comm. boll.* 7. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 550. *ſ.* 5. *t.* 23. *f.* 4.
Alſine vulgaris ſ. Morſus gallinæ. *Baub. biſt.* 3. *p.* 363.
Oed. dan. t. 525. 438.
Hoenderbeet, Muur, Vogel-Kruid. Belg. *Erf.* Vulgo.
β. Alſine aquatica major. *Baub. pin.* 251.
Water-Muur. Belg.
Veel in de Hoven, en aan ruige Wallen en Wegen. β. Aan de Duinkant in ſtilſtaande Wateren en Slooten by Overveen *buiten* Haarlem, *en te* Weſtbroek *in 't Sticht van* Utrecht.
Pharm. *α* ALSINES *herb.*

TE-

TETRAGYNIA.

PARNASSIA.

282. PARNASSIA. *Sp.* 391. *n.* 1. *Gelr.* 187. *paluſtris.*
Gramen parnaſſi, albo ſimplici flore. *Baub. pin.* 309. *Comm. boll.* 55.
Gramen parnaſſium. *Dod. pempt.* 564.
Oed. dan. t. 584.
Gras van Parnas. Belg.
In de vochtige landen tuſſchen 's Heeren-Loo *en* Telg; *in 't Veen tuſſchen* Hartskamp *en* Eſſen *op de* Veluwe; *op de Heide by* Selhem *in 't Graafſchap* Zutphen; *in de vochtige Duin-valeyen by* 's Hage. Liſſe, Wyk op Zee, Raaphorſt, &c. *ook by de nieuwe Kolk buiten* Haarlem; *en overvloedig in de Velden tuſſchen* Alkmaar *en* Egmond op den Hoef.

PENTAGYNIA.

STATICE.

283. STATICE ſcapo ſimplici capitato, foliis linearibus. *Sp.* 394. *n.* 1. *Gelr.* 188. *Friſ.* 144. *Armeria.*
Caryophyllus montanus major, flore globoſo. *Baub. pin.* 211. *Comm. boll.* 22.
Gramen polyanthemum majus. *Dod. pempt.* 564.
Bloeyend Zee-gras. Belg.
β. Caryophyllus montanus minor. *Baub. pin.* 211. *Comm. boll.* 22.
Veel by Harderwyk *in de Meben; buiten* Naarden *aan de hooge Zee-kant, naar* Huyſen *en* Oudenaarden; *in* Zeeland *op de ſtranden; buiten* Harlingen *aan de Zee-dyk, en by* Francker *op een wateracbtige plaats.*
284. STATICE ſcapo paniculato tereti, foliis lævibus enerviis, ſubtus mucronatis. *Sp.* 394. *n.* 2. *Friſ.* 145. *Limonium.*

Limonium maritimum majus. *Baub. pin.* 192. *Comm. boll.* 67.
Valerianæ rubræ ſimilis. *Dod. pempt.* 351.
Oed. dan. t. 315.
Limoen-kruid. Belg.
β. Limonium parvum, bellidis minoris folio. *Baub. pin.* 192.
Overvloedig achter 's Gravezande *aan't Zee-ſtrand; op 't Koegras op de Weg naar de* Helder; *op de Zeeuwſche Schorren, veel op 't Eyland van* Terneuſe; *en aan de Zee-dyk by* Harlingen. β. *Aan de Zwartewaters-dyk by* Haſſelt.
Pharm. BEHEN RUBRI *rad.*

LINUM.

uſitatiſſimum. 285. LINUM calycibus capſulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule ſubſolitario. *Sp.* 397. *n.* 1. *Gelr.* 190. *Friſ.* 146.
Linum arvenſe. *Baub. pin.* 214.
Linum ſylveſtre ſativum plane referens. *Baub. biſt.* 3. *p.* 452. *Comm. boll.* 67.
Wild Vlas. Belg.
Onder de Haver en Garſt op verſcheide plaatſen.
Pharm. LINI *ſem. far. ol.*

catharticum. 286. LINUM foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Sp.* 401. *n.* 18. *Gelr.* 191.
Linum pratenſe, floſculis exiguis. *Baub. pin.* 214.
Alſine verna glabra, floſculis albis, vel potius Linum minimum. *Baub. biſt.* 3. *p.* 455.
Spergula bifolia, lini capitulis. *Loeſ. pruſſ.* 261. *t.* 80.
Purgeer-Vlas. Belg.
Op vochtige plaatſen langs den Duinkant buiten 's Hage; *overvloedig tuſſchen* Velſen *en* Beverwyk; *ook in de* Salker-waart *by* Campen.
Pharm. LINI CATHARTICI *berb.*

Radiola. 287. LINUM foliis oppoſitis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. *Sp.* 402. *n.* 19. *Gelr.* 192. *Friſ.* 147.
Radiola vulgaris ſerpillifolia. *Raj. angl.* 3. *p.* 161. *t.* 15. *f.* 3.

Po-

Polygonum minimum ſ. Millegrana minima. *Baub. pin.* 282. *Comm. holl.* 90. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 593. 9. *ſ. t.* 29. *f.* 3.
Oed. dan. t. 187.
Aller kleinſt Duizend-graan. Belg.
Op zandige plaatſen, en ook tuſſchen de ſteenen; veel in 't zand by de Steene-kamer *tuſſchen* Harderwyk *en* Nykerk; *en in* Friesland *omtrent* Garyp *en* Dragten *aan de kanten tuſſchen het Koorn.*

D R O S E R A.

288. DROSERA ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. *Sp.* 402. *n.* 1. *Gelr.* 193. *Ingr.* 48. *Friſ.* 148. *rotundifolia.*
Ros ſolis folio rotundo. *Baub. pin.* 357. *Comm. holl.* 98.
Rorida ſ. Ros ſolis major. *Lob. ic.* 811.
Zonne-dauw. Belg.
Op vochtige Hey-gronden tuſſchen Dotichem *en* Selhem, *by* Uilenpas, Klein Luiking, *en door de gansche* Veluwe; *op graſige heuveltjes by* Naarden; *aan de* Bilt *by* Utrecht; *by* Bergum *in* Friesland; *in 't Heide-veld by* Harender-Moolen, *ook in 't witte Veen tuſſchen* Haren *en de* Waterhuiſen *buiten* Groningen.
Pharm. RORIS SOLIS *herb.*
Paſtoribus Taxandriæ inviſa planta, quum ovium capita ex eſu ejus ſubito intumeſcant, pecusque illud dehinc brevi ex hydrope moriatur.
Folia arida liquores igneo colore tingunt.

289. DROSERA ſcapis radicatis, foliis ovali-oblongis. *Sp.* 403. *n.* 2. *Gelr.* 194. *Friſ.* 149. *longifolia.*
Ros ſolis folio oblongo. *Baub. pin.* 357. *Comm. holl.* 98.
Rorida ſ. Solis ros & Droſion recentiorum. *Lob. ic.* 811.
By de voorige; en zeer veel te Hulſen *by* Nymegen; *ook by* Gemert *en* Helmond *in de* Meyery van 's Boſch.

Digitized by Google

POLYGYNIA.

MYOSURUS.

minimus. 290. Myosurus. Sp. 407. *n.* 1. *Baub. hiſt. p.* 512. *Gelr.* 195. *Friſ.* 150.
Holoſteo affinis, Cauda muris. *Baub. pin.* 190. *Comm. boll.* 59.
Cauda murina. *Dod pempt.* 112.
Oed. dan. t. 406.
Muizen - ſtaart. Belg.
Op vochtige zandige Velden buiten Harderwyk, Hattem, Naarden, Haarlem, Zwol, Francker, Groningen, *en elders in de voorzomer tusſchen 't jonge Koorn.*

Digitized by Google

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

GALANTHUS.

291. Galanthus. *Sp.* 413. *n.* 1. *nivalis.*
Leucojum bulboſum trifolium minus. *Baub. pin.* 56.
Leucojum bulboſum triphyllon. *Dod. pempt.* 230.
Naakte - Mannetjes, Naakte - Naarsjes, Vaſten - avond - zotjes. Vulgo.
Groeit tans menigvuldig van zelfs in de afgebouwene boſſchen by Velſen.

NARCISSUS.

292. Narcissus ſpatha uniflora, nectario campanulato erecto criſpo, æquante petala ovata. *Sp.* 414. *n.* 2. *Pſeudo-Narciſſus.*
Narciſſus ſylveſtris pallidus, calyce luteo. *Baub. pin.* 52.
Narciſſus luteus ſylveſtris. *Dod. pempt.* 227.
Geele Tydeloozen, Sporckelle. Belg.
Te Velſen *by de voorgaande.* (Ampl. D. I. Deutz.) *en omtrent* Zwol. (Bruman. Zuoll. 16.)

ALLIUM.

293. Allium caule planifolio bulbifero, ſtaminibus ſubulatis. *Sp.* 426. *n.* 13. *Gelr.* 197. *carinatum.*

Allium montanum bicorne anguſtifolium, flore purpuraſcente. *Baub. pin.* 74. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 386. *ſ.* 4. *t.* 14. *f.* 5.
In de Salker-Waart.

vineale. 294. Allium caule teretifolio bulbifero, ſtaminibus tricuſpidatis. *Sp.* 428. *n.* 21. *Gelr.* 203. *Friſ.* 151.
Allium campeſtre juncifolium capitatum purpuraſcens majus. *Baub. pin.* 74. *Comm. boll.* 5.
Allium ſylveſtre tenuifolium. *Dod. pempt.* 683. *Lob. ic.* 156.
Wild-Look, Honds-Look. Belg.
In de Velden buiten Harderwyk, Zwol, Alkmaar; *in de Duinen by* 's Hage; *aan 't eind van den grooten Hout buiten* Haarlem, *op de weg naar* Heemſtede; *in* Friesland *op verſcheide plaatſen aan Wallen en in Boſſchen.*

urſinum. 295. Allium ſcapo nudo triquetro, foliis lanceolatis petiolatis, umbella faſtigiata. *Sp.* 431. *n.* 29. *Friſ.* 152.
Allium ſylveſtre latifolium. *Baub. pin.* 74. *Comm. boll.* 5.
Allium urſinum. *Cam. epit.* 330.
Das-Look. Belg.
In de Duinen by 's Hage; *buiten* Haarlem *by 't Huis te* Bredenrode *agter* Bloemendaal; *veel omtrent* Maarſen; *en in* Friesland *by* Balk *en* Wykel *aan dykjes en kanten van Koornlanden.*

ORNITHOGALUM.

luteum. 296. Ornithogalum ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplicibus. *Sp.* 439. *n.* 1. *Gelr.* 205.
Ornithogalum luteum. *Baub. pin.* 71.
Bulbus ſylveſtris. *Dod. pempt.* 222.
Oed. dan. t. 368.
Veld-Ajuin, Vogel-Melk. Belg.
In de Moesbowen by Harderwyk, *en in de Koornlanden by* Zwol.

minimum. 297. Ornithogalum ſcapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramoſis. *Sp.* 440. *n.* 2.

Or-

Ornithogalum luteum minus. *Baub. pin.* 71.
Onder 't voorige, dog niet zoo veel.
Simillimum præcedenti, ſed Petala acutiora.

298. ORNITHOGALUM floribus corymboſis, pedunculis ſcapo altioribus, filamentis baſi dilatatis. *Sp.* 441. *n.* 9. *Gelr.* 616. *umbellatum*
Ornithogalum umbellatum medium anguſtifolium. *Baub. pin.* 70. *Comm. boll.* 83.
Bulbus leucanthemos minor. *Dod. pempt.* 221.
Morgen-Sterren. Vulgo.
In de Fortificatien te Nymegen; *in 't boſch van* Clarenbeek *by* Arnhem; *in 't Koornland te* Hierden *by* Bas *buiten* Harderwyk; *in den* Haarlemmer-Hout; *op de Graspaden van* Zandhorſt *en* Marquette *in* Kennemerland; *langs de kleyweg tuſſchen* Utrecht *en* Maarſſen *en by de Hofſtede* Vegtſtroom; *by den* Voetangel *aan den* Amſtel; *ook omtrent* Leeuwaarden, Zwol, *en elders.*

299. ORNITHOGALUM floribus ſecundis pendulis, nectario ſtamineo campaniformi. *Sp.* 441. *n.* 10. *nutans.*
Ornithogalum exoticum magno flore minoriinnato. *Baub. pin.* 70.
Ornithogalum neapolitanum. *Cluſ. app.* 2. *p.* 9. *t.* 9.
By Leiden *op de hooge Morſch en buiten de Hoogewoerds-poort aan den hoogen Rhyn-dyk, en op andere plaatſen daar omtrent.* (*Hortulanus* MEERBURG.)
Forſan olim ex hortis aufuga: ante annum tamen 1771. *quo primum Hortulanus* MEERBURG *hanc plantam offendit, nondum in Horto Academico Leydenſi exſtiterat.*
Flores potius nutantes quam penduli dicendi.

ANTHERICUM.

300. ANTHERICUM foliis enſiformibus, filamentis lanatis. *Sp.* 446. *Friſ.* 53. *oſſifragum.*
Narthecium. *Moehr. E. N. C. vol.* VI. *p.* 389. *t.* 5 *f.* 1. *Gelr.* 204.
Pſeudo-Aſphodelus paluſtris anglicus. *Bauh. pin.* 29.

Aſ-

Digitized by Google

Aſphodelus luteus paluſtris. *Dod. pempt.* 208. *Fig. quoad habitum ſatis bona, deſcriptio imperfecta.*
Oed. dan. t. 42.
Geele Water-Aſfodillen. Belg.
Overvloedig buiten Harderwyk *op de Gagel-Kamp by 's Heeren-Loo; in* Friesland *op* Bergummer Heyde; *en elders in de* Wouden; *ook zeer gemeen in de Veenen by* Haren, *en elders in de Provintie* Groningen *en* Omlanden.
De hac planta S. Paulli *refert, quod, ſi pecoribus pabulo intermixta detur, noxam ipſis conciliet, atque ipſa eorum oſſa inde emolliantur ita, ut pedibus inſiſtere nequeant, unde illam vocat Gramen oſſifragum Norvegicum. Verum nulla apud nos experientia conſtat, pecori ac ſeorſim ovibus morbum ex eſu hujus natum eſſe; neque floris odor manifeſte viroſus, ut* Linnæo, *ſed ſemper gratus ac mellitus mihi, ut* Moehringio *viſus eſt.*

ASPARAGUS.

officinalis. 301. Asparagus caule herbaceo tereti erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis paribus. *Sp.* 448. *n.* 1. *Gelr.* 206.
Aſparagus ſylveſtris tenuiſſimo folio. *Bauh. pin.* 490. *Comm. boll.* 13.
Aſpergie, Coraal-Kruid. Belg.
Op veele plaatſen in de Valeyen der Duinen buiten 's Hage *agter* Zorgvliet, Haarlem, Alkmaar, *en in die van de* Helder.
Pharm. Asparagi *rad. bacc. ſem.*

CONVALLARIA.

majalis. 302. Convallaria ſcapo nudo. *Sp.* 451. *n.* 1. *Gelr.* 207. *Friſ.* 154.
Lilium convallium album. *Bauh. pin.* 304. *Comm. boll.* 67.
Lelie van den Dale, Lely Convaly, Zegeltjes. Belg.
May-bloemen. Quibusdam.
In Gelderland *op* Schaffelaar *by* Barneveld, *op* Clarenbeek *by* Arnhem; *in 't* Haagſe-Boſch; *in de* Haarlemmer-Hout; *op* Randenbroek *by* Amersfoort; *in* Frieſland *in* Zwartzenburgs-Boſch, *by* Kuikhorne &c. *buiten* Groningen *op de* Mickelhorſt *op de Cingel en in 't Land*
aan

Digitized by Google

aan de Weſtkant; en elders op ſchaduwachtige plaatſen.
Pharm. LILII CONVALLII *flor.*

303. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus ſubunifloris. *Sp.* 451. *n.* 3. *Gelr.* 209. *Jngr.* 50. ***Polygonatum.***
Polygonatum latifolium vulgare. *Bauh. pin.* 303. *Comm. boll.* 90.
Polygonatum, vulgo Sigillum ſalomonis. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 529.
Oed. dan. t. 377.
Salomons - Zegel. Belg.
Fontein - Kruid. Groninganis.
Motte met biggen Drenthinis.
β. Polygonatum latifolium, flore majore odoro. *Baub. pin.* 303.
In 't Boſch by 't Huis de Elſe *en* Zuideras *buiten* Zutphen; *in dat van* Clarenbeek *by* Arnhem; *in 't* Klaverboſch *en op* Kortenbroek *buiten* Harderwyk; *in 't* Haagſe - Boſch; *in de wildernis niet verre van 't Huis te* Bredenrode; *in de Duinen even buiten* Overveen *by één met Eſſchen - boomen beplant Boſchje; zeldzaam in de* Haarlemmer - Hout; *te* Hardenbroek *in 't Sticht van* Utrecht; *by* Onnen *en de* Mickelhorſt *buiten* Groningen; *en elders op ſchaduwachtige plaatſen.* β. *Veel in de Duinen by* Haarlem.
Pharm. POLYGONATI ſ. SIGILLI SALOMONIS *rad. herb.*

304. CONVALLARIA foliis cordatis, floribus tetrandris. *Sp.* 452. *n.* 8. *Gelr.* 208. *Friſ.* 155. ***bifolia.***
Unifolium. *Dod. pempt.* 205.
Lilium convallium minus. *Baub. pin.* 304. *Comm. boll.* 67.
Oed. dan. t. 152.
Een - blad. Belg.
In Gelderland *by* Ubbergen, Boedelhof, Uilenpas, *en elders in de Boſſchen*; *in 't* Haagſe - Boſch; *in* Friesland *by het* Oranje - Wout, *en in een Boſchje by* Donkerbroek; *in 't* Cluvings - Boſch *voor aan in 't Landſchap* Drenthe.

HY-

HYACINTHUS.

non ſcriptus 305. HYACINTHUS corollis campanulatis ſexpartitis apice revolutis. *Sp.* 453. *n.* 1.

Hyacinthus, oblongo flore, cæruleus major. *Baub. pin.* 43.

Hyacinthus non ſcriptus. *Dod. pempt.* 216.

Wilde Hyacinten. Belg.

In 't Haagſe-Boſch. (*Cel.* SCHWENCKE.) *In de Boſchadien te* Velſen. (*Ampl.* D. I. DEUTZ.) *en te* Haarlem *in den Ouden-Hout.*

ACORUS.

Calamus. 306. ACORUS. *Sp.* 462. *n.* 1. *Gelr.* 210. *Friſ.* 156.

Acorus verus ſ. Calamus aromaticus officinarum. *Baub. pin.* 34. *theatr.* 625. *Comm. boll.* 4.

Acorum. *Cam. epit.* 5.

Calmus. Belg.

In de oude Graft te Doesburg; *in de* Berkel *by* Lochum; *in de Slooten en Graften by* Wageningen, Maurik, Oen, Welſum, Elden, Veenendaal, *en elders in* Gelderland; *in de Trekvaarten buiten* Delft *en* 's Hage, *tuſſchen* Haarlem *en* Leiden; *by* Maarſeveen, Tienhoven *in 't Sticht van* Utrecht; *ook in de Slooten omtrent* Wyk by Duurſtede; *in natte laage moeraſſige landen en poelen omtrent* Ooſtermeer, Oenkerk, Oudkerk, *en elders in de* Wouden *in* Friesland; *in 't* Horenſche-diep, *en in een oude Graft aan de Ooſtkant van* Haren *buiten* Groningen.

Pharm. ACORI ſ. CALAMI AROMATICI *rad.*

JUNCUS.

acutus. 307. JUNCUS culmo ſubnudo tereti mucronato, panicula terminali, involucro diphyllo ſpinoſo. *Sp.* 463. *n.* 1.

Juncus acutus, capitulis ſorghi. *Baub. pin.* 12. *theatr.* 174. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 163. *n.* 5.

Juncus pungens ſive acutus, capitulis ſorghi. *Baub. biſt.* 2. *p.* 520. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 232. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 15.

β. Juncus acutus maritimus anglicus. *Raj. biſt.* 1303. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 232. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 14. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 163. *n.* 1.

Op bet Koegras *by de* Helder. (*Ampl.* D. I. DEUTZ.)

308. JUNCUS culmo nudo ſtricto, capitulo laterali. *Sp.* 464. *n.* 2. *Gelr.* 617. *conglomeratus.*
Juncus lævis, panicula non ſparſa. *Baub. pin.* 12. *theatr.* 183. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 163.
Op de Stads-Weide, en andere vochtige gronden omtrent Harderwyk.

309. JUNCUS culmo nudo ſtricto: panicula laterali. *Sp.* 464. *n.* 3. *Gelr.* 215. *Friſ.* 157. *effuſus.*
Juncus lævis, panicula ſparſa, major. *Baub. pin.* 12. *theatr.* 182. *Comm. boll.* 61.
Juncus lævis. *Dod. pempt.* 605.
Onſcherpe of Zagte Biezen. Belg.
Ruſſchen Groninganis.
Veel op vochtige koude gronden.
Nomen Groninganum convenit cum Anglico.

310. JUNCUS culmo nudo: apice membranaceo incurvo, panicula laterali. *Sp.* 464. *n.* 4. *inflexus.*
Juncus, acumine reflexo, major. *Baub. pin.* 12. *prodr.* 22. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 233. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 25. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 164. *n.* 2.
β. Juncus acutus, panicula ſparſa. *Baub. pin.* 12. *Comm. boll.* 61.
Yzer-Biezen. Belg.
In koude vochtige Weilanden.

311 JUNCUS culmo nudo, foliis ſetaceis, capitulis glomeratis aphyllis. *Sp.* 465. *n.* 7. *Gelr.* 214. *Friſ.* 158. *ſquarroſus*
Gramen junceum maritimum. *Lob. ic.* 18.
Gramen junceum, foliis & ſpica junci. *Baub. pin.* 5. *theatr.* 78. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 228. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 13. *Comm. boll.* 50.
Oed. dan. t. 430.
In 't Veen tuſſchen Uilenpas *en* Hummel *in 't Graafſchap* Zutphen; *te* Hulſen *by* Nymegen; *in de buitendykſe landen aan de Ykant. In* Frieſland, *menigvuldig in de* Wouden.
Synonymum I. B. *a* COMMELINO *additum pertinet ad Juncum bulboſum.*

312. JUNCUS foliis nodoſo-articulatis, petalis obtuſis. *Sp.* 465. *n.* 8. *Gelr.* 213. *Friſ.* 159. *articulatus*

α. Gra-

Digitized by Google

α. Gramen junceum, folio articulato, aquaticum. *Bauh. pin.* 5. *prodr.* 12. *theatr.* 76. *Comm. boll.* 50.

β. Gramen junceum folio articulato, cum utriculis. *Bauh. prodr.* 12. *Scheuch. gram.* 333.

γ. Gramen junceum capſulis triangulis, cauliculis tenuibus, foliis ad nodos et panicularum divaricationes oblongis. *Raj. hiſt.* 1307.

δ. Gramen junceum, capſulis triangulis, minimum. *Raj. hiſt.* 1307. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 3.

ε. Gramen junceum minimum, capitulis foliaceis. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 4.

ζ. Gramen junceum, folio articulato, ſylvaticum. *Bauh. pin.* 5. *theatr.* 75. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 1. *Comm. boll.* 50.

α. *Gemeen in natte Weilanden op veele plaatſen.* β. *Veel aldaar in den Herfſt na den Hooityd.* γ. *Veel in de Weilanden by* Rotterdam. δ. *en* ε. *Overvloedig te* Hulſen *by* Nymegen *in eene vogtige Weide onder de groote boomen; met de Droſera longifolia, Carex dioica, pulicaris, &c.* ζ. *Tuſſchen* Franeker *en* klein Lancum *in Sloots-wallen, en aan de Ryd-weg van* Donkerbroek *naar* Makkinga; *in de* Zalliker-Waart *in* Overysſel, *en te* Overveen *by* Haarlem *achter* Rampen-Laan, *aan het opgaan van de Duinen op donkere en vochtige plaatſen.*

Varietas β *ab inſectis cauſatur*, γ *eſt vivipara, in qua loco florum variis in locis foliorum faſciculi enaſcuntur, adeoque diverſa a varietate* β. *optimeque deſcribitur a* RAJO. δ. *et* ε *quandoque vix uncias duas altitudine æquat.* ε *utriculis differt a* δ. *ſicuti* β. *ab* α. *Varietas* ζ. *ſylvatica ab Jll.* HALLERO *pro diſtincta ſpecie habetur, nec ſine ratione, gaudet enim petalis obtuſis, foliisque teretibus, cum aquaticæ* α. β. γ. δ. ε. *petala habeant mucronata, foliaque magis compreſſa; adeoque differentia ſpecifica ab Jll.* LINNÆO *data ſoli* ζ. *convenit, aquaticis vero differentia ſpecifica Junci nodoſi. Sp.* 466. *n.* 9.

bulboſus. 313. JUNCUS foliis linearibus canaliculatis, capſulis obtuſis. *Sp.* 466. *n.* 10. *Friſ.* 160.

Jun-

Digitized by Google

* Juncus parvus cum pericarpiis rotundis. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 522. *quoad iconem, non vero ſynonyma.*
Gramen junceum polyſtachion. C. B. *Comm. holl.* 50.
Gramen junceum, junci ſparſa panicula. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 11. *opt.*
Geſn. Schmied. 12. *t.* 5. *f.* 13. *Oed. dan. t.* 431.
In de Wateraohtige Hooilanden, aan de kanten van de Haarlemmer - Meyr, *by den* Overtoom; *en van de* Maas *by* Rotterdam; *in* Friesland *zoo wel op de Klei als in de Wouden, in natte laagtens en aan de kanten der Slooten.*

314. JUNCUS culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Sp.* 466. *n.* 11. *Gelr.* 212. *Friſ.* 161. *bufonius.*
Holoſteum. *Lob. ic.* 18.
Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 100. *Comm. holl.* 53. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 228. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 14.
Padde - Gras. Belg.
Op vochtige Moſchachtige plaatſen in Gelderland, Utrecht, Overyssel; *in de Duin-Valeyen in* Holland; *in de Wouden aan de kanten van Koornvelden, en vochtige gruppels in* Friesland.

315. JUNCUS foliis planis piloſis, corymbo ramoſo. *Sp.* 468. *n.* 15. *Friſ.* 162. *piloſus.*
Gramen nemoroſum hirſutum latifolium majus. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 101. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 225. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 1.
Oed. dan. t. 441.
β. Gramen hirſutum latifolium minus. *Baub. theatr.* 102.
Hairig of Ruig Boſch - Gras. Belg.
In Friesland *in de Wouden, en op de Kley in de Boſſchen.*

316. JUNCUS foliis planis ſubpiloſis, corymbis folio brevioribus, floribus faſciculatis. *Sp.* 468. *n.* 16. *niveus.*
Gramen hirſutum anguſtifolium minus, paniculis albis. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 106. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 39.
Op de Heide by Nymegen. (D. RAINVILLE.)

campeſtris. 317. Juncus foliis planis ſubpiloſis, ſpicis ſeſſilibus pedunculatisque. *Sp.* 468. *n.* 17. *Gelr.* 211.
Gramen hirſutum, capitulis pſyllii. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 103. *prodr.* 15. *Comm. holl.* 53. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 225. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 4.
Klein Hairig-Gras. Belg.
In den Enck by Harderwyk; *op het groote Veld aan den* Haarlemmer-Hout, *en in de Weilanden omtrent* Zwol.

BERBERIS.

vulgaris. 318. Berberis pedunculis racemoſis. *Sp.* 471. *n.* 1.
Berberis dumetorum. *Baub. pin.* 454. *Comm. holl.* 15.
Spina acida ſive Oxyacantha. *Dod. pempt.* 750.
Berberiſſe. Belg.
Op de Velſer-Heide; *in de Duinen by* Overveen, *en buiten* 's Gravenhage *naar* Waſſenaar; *aan de Heereweg by* Haren, *en by de* Mickelhorſt *buiten* Groningen
Pharm. Berberidis *bacc. ſem. ſucc.*

PEPLIS.

Portula. 319. Peplis floribus apetalis. *Sp.* 474. *n.* 1. *Friſ.* 163.
Glaux aquatica, folio ſubrotundo. *Loeſ. pruſſ.* 106. *t.* 20.
Alſine paluſtris minor ſerpillifolia. *Baub. pin.* 251. *prodr.* 118.
Oed. dan. t. 64.
In menigte langs 't Maasſtrand achter 's Gravezande; *in natte gruppels en ſtilſtaande Slooten omtrent 't* Wyſel, Auguſtinisga, Ureterp *en* Sygerswolde *in* Friesland; *te* Heemze *in* Overyſſel; *en elders.*
Frequentiſſime apetala eſt.

TRIGYNIA.

RUMEX.

Sanguineus. 320. Rumex floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Sp.* 476. *n.* 2. *Gelr.* 218.

La-

Digitized by Google

Lapathum folio acuto rubente. *Baub. pin.* 115. *Comm. boll.* 64.
Lapathum rubens. *Dod. pempt.* 650. *Cam. epit.* 229.
Bloed-kruid, *Draken-bloed*. Belg.
Komt van zelfs voort in de Moes-hoven.
Pharm. LAPATHI SANGUINEI *rad.*

321. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Sp.* 476. *n.* 3. *Friſ.* 164. *Gelr.* 219. β. *criſpus.*
Lapathum folio acuto criſpo. *Baub. pin.* 115.
Lapathum acutum criſpum. *Tabern. ic.* 436.
β. Lapathum folio longiſſimo criſpo. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 85. *n.* 10.
Op veele plaatſen aan wallen en wegen.

322. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis; ſubunica granifera, foliis radicalibus panduriformibus. *Sp.* 477. *n.* 6. *pulcher.*
Lapathum ramis procumbentibus, ſeminis involucro dentato, foliis inferioribus inſtar fidium. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 580. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 85. *n.* 6.
Lapathum pulchrum bononienſe ſinuatum. *Baub. biſt.* 2. *p.* 988. *Raj. biſt.* 1. *p.* 174.
† *Volgens* BOERHAAVE.

323. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, folliis cordato-oblongis acuminatis. *Sp.* 478. *n.* 11. *Gelr.* 217. *Friſ.* 165. *acutus.*
Lapathum folio acuto plano. *Baub. pin.* 115.
Lapathum acutum ſ. Oxylapathum. *Baub. biſt.* 2. *p.* 85.
Patigb of *Peerdick.* Belg.
Zuiker-wortel in de Dortſche en Krimpener-Waarden.
Koeſen, *Koesjes-bladen*, *Leeken.* Ruſticis, quo nomine & reliqua Lapatha appellant.
Ridders Groninganis.
β. Lapathum minimum. *Baub. pin.* 115. *Comm. boll.* 64.
Veel op vochtige zandige gronden. β. *Op ſteenachtige en dorre gronden.*
Pharm. LAPATHI ACUTI *rad. berb.*

324. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis den- *obtuſifolius*

 ta-

tatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtuſiuſculis crenulatis. *Sp.* 478. *n.* 12. *Friſ.* 166.
Lapathum ſylveſtre, folio ſubrotundo, ſeminis involucris dentatis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 580. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 85.
Lapathum folio minus acuto. *Baub. pin.* 111. *Comm. holl.* 64.
Lapathum. *Cam. epit.* 228.
Overvloedig op zandige gronden, en in de Moes-hoven buiten Haarlem, Zwol, Franeker, &c.

aquaticus. 325. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Sp.* 479. *n.* 14. *Gelr.* 219. *Friſ.* 197.
Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Baub. pin.* 116. *Comm. holl.* 63.
Hippolapathum. *Dalech. hiſt.* 604. *Cam. epit.* 232.
Herba britannica. *Munt. brit. t.* 1.
Groot Water-Patigh. Belg.
Water-Ridders. Groninganis.
β. Lapathum aquaticum minus. *Baub. pin.* 116. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 987. *Comm. holl.* 64.
Klein Water-Patigh. Belg.
Aan de kanten der Slooten en Graften op veele plaatſen. β. *Veel aan de kanten der Slooten en Beekjes buiten* Haarlem, Utrecht, Zwol, *en elders.*
Pharm. LAPATHI AQUATICI *rad.*
Cl. BOEHMER *flor. lipſ.* 576. *varietatem.* β. *pro diſtincta ſpecie habet.*

Scutatus. 326. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis cordato-haſtatis, caule tereti. *Sp.* 480. *n.* 20.
Acetoſa rotundifolia hortenſis. *Baub. pin.* 114. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 583. *ſ.* 5. *t.* 28. *f.* 9.
Oxalis rotundifolia. *Dod. pempt.* 649.
Spaanſche-Zuuring. Vulgo.
Overvloedig aan de Muur van 't Huis te Bronkhorſt *in 't Graafſchap* Zutphen.

Acetoſa. 327. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis. *Sp.* 483. *n.* 24. *Gelr.* 220. *Friſ.* 168.
Acetoſa pratenſis. *Baub. pin.* 114. *Comm. holl.* 4.
Oxalis vulgaris, folio oblongo. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 989.

Veld-

Digitized by Google

Veld-Zuuring of *Zurkel.* Belg.
Veel in de Weilanden.
Pharm. ACETOSÆ *rad. herb. ſem.*

328. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-haſtatis. *Sp.* 481. *n.* 25. *Gelr.* 221. *Ingr.* 54. *Friſ.* 169. *Acetoſella.*
Acetoſa arvenſis lanceolata. *Baub. pin.* 114. *Comm. holl.* 4.
Oxalis ovina. *Tabern. ic.* 440.
Schaaps-Zuuring of *Zurkel.* Belg.
β. Acetoſa lanceolata anguſtifolia repens. *Baub. pin.* 114. *prodr.* 55.
Veel op hooge zandige Velden en Zaai-landen. β. *Te* Heemze *in* Overysſel.

TRIGLOCHIN.

329. TRIGLOCHIN capſulis trilocularibus ſublinearibus. *Sp.* 482. *n* 1. *Gelr.* 222. *Friſ.* 170. *paluſtre.*
Gramen junceum ſpicatum, ſive Triglochin. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 81. *Comm. holl.* 51.
Oed dan. t. 411.
Nier-Gras, Zee-Gras met airen. Belg.
By de Waterkanten op den Haek *en 't* Nieuweland *achter* 's Gravezande; *aan de Duinen van* Heemſtede; *in de Wei-landen by* Haarlem, Zandhorſt; *ook zeer gemeen in die van de Provintien* Frieſland *en* Groningen.

330. TRIGLOCHIN capſulis ſexlocularibus ovatis. *Sp.* 483. *n.* 2. *Gelr.* 223. *Friſ.* 171. *maritimum.*
Gramen ſpicatum alterum. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 82. *Comm. holl.* 51.
Oed. dan. t. 306.
By 't voorige op veele plaatſen, en aan de Zee-kant by de Beeken buiten Harderwyk.

POLYGYNIA.

ALISMA.

331. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtuſe trigonis. *Sp.* 486. *n.* 1. *Gelr.* 224. *Friſ.* 172. *Plantago.*

Plantago aquatica latifolia. *Baub. pin.* 19. *Comm. holl.* 88.
Plantago aquatica. *Cam. epit.* 264.
Oed. dan. t. 561.
Water-Weegbree. Belg.
In ſtilſtaande zoete Wateren en Slooten op veele plaatſen.

ranunculoides. 332. ALISMA foliis lineari-lanceolatis, fructibus globoſo-ſquarroſis. *Sp.* 487. *n.* 6. *Gelr.* 225. *Friſ.* 173.
Plantago aquatica anguſtifolia. C. B. *Comm. holl.* 89.
Plantago aquatica humilis anguſtifolia. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 788. *Lob. ic.* 300.
Oed. dan. t. 122.
Klein Water-Weegbree. Belg.
Klein Lepelblad. Groninganis.
Overvloedig in de Trekvaart tuſſchen Haarlem, Leiden *en* Utrecht; *by en in Water-plaatſen, en uitgeveende en andere moerige landen in* Friesland *omtrent* Tjetjerk, Hardegaryp, Bergum &c. *in de Slooten en Griften tuſſchen* Deventer *en* Zwol; *in de Slooten langs den dyk tuſſchen* Haren *en de* Waterhuizen *buiten* Groningen.
Synonymum C. Baub. eſt varietas Aliſmatis Plantaginis.

CLAS.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

ÆSCULUS.

333. ÆSCULUS floribus heptandris. *Sp.* 488. *n.* 1. *Gelr.* 226. *Hippo-Caſtanum.*
Caſtanea folio multifido. *Baub. pin.* 419. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 7.
Caſtanea equina, folio multifido. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 128.
Paarde-Caſtanie-boom. Belg.
Veel in de Steden, en by Adelyke Huizen.
Pharm. CASTANEÆ EQUINÆ *fruct.*
*Incola eſt Aſiæ ſeptentrionalis, indeque A*o. 1550. *in Europam tranſlata, ubi hodie vulgaris. Ceteroquin nulla hujus Claſſis planta apud nos indigena.*

Digitized by Google

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

OENOTHERA.

biennis. 334. Oenothera foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato-villoſo. *Sp.* 492. *n.* 2. *Gelr.* 229.

Lyſimachia lutea corniculata. *Baub. pin.* 245. *Comm. boll.* 70. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 271. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 7.

Hyoſcyamus virginianus. *Alp. exot.* 325. *t.* 324. *Oed. dan. t.* 446.

Geboornde geele Wederik. Belg.

St. Teunis-bloem. Vulgo.

Overvloedig op Karmeſtein *te* Lienden *in de* Betuwe; *in de Fortificatien om* Zutphen; *op* Uilenpas; *by* Emaus *of* Bloembleek *buiten* Arnhem; *op de Kerke-Kamp buiten* Harderwyk; *en in de Duinen op veele plaatſen.*

EPILOBIUM.

anguſtifolium. 335. Epilobium foliis ſparſis lineari-lanceolatis, floribus inæqualibus. *Sp.* 493. *n.* 1. *Gelr.* 230. *Friſ.* 174.

Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia. *Baub. pin.* 245. *Comm. boll.* 70.

Oed. dan. t. 289.

Aan de kanten der Graſten en Slooten op ſchaduwach-

Digitized by Google

vochtige plaatſen.

336. EPILOBIUM foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis decurrenti - amplexicaulibus. *Sp.* 494. *n.* 3. *Gelr.* 231. *Ingr.* 57. *Friſ.* 175. *hirſutum.*
Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta, magno flore. *Baub. pin.* 245. *Comm. holl.* 70. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 270. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 3.
Oed. *dan. t.* 326.
Als de voorgaande.

337. EPILOBIUM foliis oppoſitis ovatis dentatis. *Sp.* 494. *n.* 4. *Gelr.* 232. *montanum.*
Lyſimachia ſiliquoſa glabra major. *Baub pin.* 245. *Comm. holl.* 70.
Pſeudo-Lyſimachium purpureum primum. *Dod. pempt.* 85.
Op vochtige zandgronden by Harderwyk, Haarlem, Utrecht, Zwol, *en elders; in de Duinen by* 's Hage; *in de Boſſchen by* Leeuwaarden *en* Franeker; *aan de kanten van Graften en Slooten by* Haren *buiten* Groningen.

338. EPILOBIUM foliis lanceolatis denticulatis: imis oppoſitis, caule tetragono. *Sp.* 494. *n.* 5. *tetragonum*
Lyſimachia ſiliquoſa glabra minor. *Baub. pin.* 303 *Comm. holl.* 70.
Lyſimachia minor. *Tabrn. ic.* 854.
In de vochtige Duin valeyen. (COMM.)

339. EPILOBIUM foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Sp.* 495. *n.* 6. *Gelr.* 233. *Friſ.* 176. *paluſtre.*
Lyſimachia ſiliquoſa glabra anguſtifolia. *Baub. pin.* 245.
Oed *dan. t.* 347.
In de Sypel by Harderwyk; *in de* Nunſpeeterbeek *tuſſchen* Harderwyk *en* Elburg; *in de Veenlanden by de* Wildervank, *by* Haren, *in de* Pekelder-Veenen; *en elders in de Provintie* Groningen; *ook in de Hoven tuſſchen het geboomte op veele plaatſen.*

340. EPILOPIUM foliis oppoſitis ovato-lanceolatis integerrimis, ſiliquis ſeſſilibus, caule repente. *alpinum.*

Sp. 495. *n.* 7. *Friſ.* 177.
Chamænerion alpinum, alſines foliis. *Scheuch alp.* 132. 332.
Oed. dan. t. 322.
Aan ruige Wallen omtrent Baccaveen *en* Sygers-Wolde *in* Friesland. (MEESE.)

CHLORA.

perfoliata. 341. CHLORA foliis perfoliatis. *Syſt. edit.* 13. *p.* 299.
Gentiana perfoliata. *Sp.* 335. *n.* 28.
Centaurium luteum perfoliatum. *Baub. pin.* 278. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 565. *ſ.* 5. *t.* 26. *f.* 1. 2.
Veel omtrent de Stad Brielle, *en op Staalduin buiten* 's Hage.

VACCINIUM.

Myrtillus. 342. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis ſerratis ovatis deciduis, caule angulato. *Sp.* 498. *n.* 1. *Gelr.* 236. *Friſ.* 178.
Vaccinia. *Dod. pempt.* 768.
Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Baub. pin.* 470. *Comm. holl.* 116.
Boſch-beſſen, Wald-beſſen, Kraakel-beziën, Poſtelbeziën. Belg.
Bleeken. Groninganis.
Overvloedig in de meeſte Boſſchen op de Veluwe; *in 't Boſch by* Amerongen *in 't Sticht van* Utrecht; *in* Friesland *by het* Heereveen, Dragten, Gorradyk, &c. *op 't witte Veen by* Haren, *en op 't Heyde-veld by* Haarender-moolen *buiten* Groningen.

uliginoſum. 343. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis integerrimis obovatis obtuſis lævibus. *Sp.* 499. *n.* 3. *Jngr.* 58.
Vitis idæa foliis ſubrotundis exalbidis. *Baub. pin.* 470.
Vitis idæa II. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 61. *t.* 62.
Oed. dan. t. 231.
Stronk-beziën. Varſeveldenſibus.
Overvloedig in 't Veen by Varſeveld *in 't Graafſchap* Zutphen.
Floret Junio.

Bac-

Baccæ in aliis fruticibus ovatæ, in aliis tetragonæ.
Hæ baccæ Ruſſorum palato placent, ſed largius comeſtæ capitis dolorem inferunt, unde ipſis PIANIZA *id eſt ebriæ audiunt.*

344. VACCINIUM racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis ſubtus punctatis. *Sp.* 500. *n.* 10. *Gelr.* 237. *Friſ.* 179. *Vitis idæa.*
Vaccinia rubra. *Dod. pempt.* 770.
Vitis idæa foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris. *Baub. pin.* 470.
Oed. dan. t. 40.
Roode Kraakel-beziën. Belg.
Voſſe-beſſen. Ruſticis Velaviæ.
Aan bet Elspeeter, Wiſelſe, Souwenſche *en andere Boſſchen op de* Veluwe; *ook by 't Vaccinium Myrtillus in* Frieſland *en buiten* Groningen.
Ill. HALLERUS (*Bibl. bot. tom.* 2. *p.* 309.) *miratur plantam banc in Gelria, regione maritima, babitare; aſt ſylvæ illæ ſatis longe a mari diſſitæ ſunt.*

345. VACCINIUM foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus nudis. *Sp.* 500. *n.* 11. *Gelr.* 602. *Ingr.* 59. *Oxycoccus.*
Vaccinia paluſtria. *Dod. pempt.* 770.
Vitis idæa paluſtris. *Baub. pin.* 471. *Comm. boll.* 116.
Oed. dan. t. 80.
Veen-beſſen, Krooſen. Belg.
In 't Veen tuſſchen Hummel *en* Uilenpas; *in de Veenen by* Meydrecht, Groningen, *en elders.*

ERICA.

346. ERICA antheris ariſtatis, corollis campanulatis ſubæqualibus, calycibus duplicatis, foliis oppoſitis ſagittatis. *Sp.* 501. *n.* 1. *Gelr.* 235. *Friſ.* 180. *vulgaris.*
Erica vulgaris glabra. *Baub. pin.* 485. *Comm. boll.* 31.
Heide. Belg.
β. Erica vulgaris glabra, flore albo. *Tourn inſt.* 602.
Overvloedig op de Veluwe; *buiten* Naarden, Amersfoort; *en door de gebeele* Woud-kant *in* Frieſland.

347. E-

arborea. 347. Erica antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo exſerto, foliis ternis, ramulis incanis. *Sp.* 502. *n.* 9. *Gelr.* 618.
Erica maxima alba. *Baub. pin.* 485. *Comm. boll.* 34.
Erica coris folio I. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 41.
Veel op de booge Veluwe.

Tetralix. 348. Erica antheris ariſtatis, corollis ovatis, ſtylo incluſo, foliis quaternis ciliatis, floribus capitatis. *Sp* 502. *n.* 8. *Gelr* 234. *Friſ.* 181.
Erica ex rubro-nigricans ſcoparia. *Baub. pin.* 486.
Erica brabantica, folio coridis hirſuto quaterno. *Baub. biſt.* 1. *p.* 358.
Oed. dan. t. 81.
Dop-Heide, Fyne Heide. Vulgo.
Overvloedig op de Veluwe, *en in 't Graafſchap* Zutphen, *ook in* Friesland *en buiten* Groningen *op vochtige Hei-gronden.*
Corolla eſt plerumque purpurea, nonnumquam alba reperitur.

cinerea. 349. Erica antheris criſtatis, corollis ovatis, ſtylo ſubexſerto, foliis ternis, ſtigmate capitato. *Sp.* 501. *n.* 4.
Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore. *Baub. pin* 486. *Comm. boll.* 34.
Erica coris folio VI. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 43.
Oed. dan. t. 38.
Buiten Naarden, *en voorby de* Bilt *buiten* Utrecht *aan 't opgaan van de Heide.*

mediterranea. 350. Erica antheris muticis exſertis, corollis ovatis, ſtylo exſerto, foliis quaternis patentibus, floribus ſparſis. *Mant.* 229.
Erica maxima purpuraſcens, longioribus foliis. *Baub. pin.* 485. *Comm. boll.* 34.
Erica coris folio II. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 42.
Erica foliis corios quaternis, flore purpuraſcente. *Baub. biſt.* 1. *p* 356.
Op veele plaatſen op de Veluwe, *als ook buiten* Utrecht, Amersfoort, *en* Zwol.
Olim Ericam multifloram Linn. *pro hac planta habui ob ſynonyma hujus eo relata, & haud conveniens nomen triviale huic datum.*

DA-

Digitized by Google

DAPHNE.

351. DAPHNE floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Sp.* 509. *n.* 1. *Mezereum.*
Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola fæmina. *Baub. pin.* 462.
Chamelæa germanica. *Dod. pempt.* 364.
Peper - boompje. Vulgo.
Overvloedig in 't Boſcb by 't Huis de Eeſe, *en in 't* Kleinbroekſe - Boſch *by* Olthuiſen *aan de Toldyks-ſtraat in 't Graafſcbap* Zutphen.
Pharm. MEZERÆI *bacc.*

TRIGYNIA.

POLYGONUM.

352. POLYGONUM caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Sp.* 516. *n.* 2. *Biſtorta.*
Biſtorta major, radice minus intorta. *Baub. pin.* 192. *Comm. boll.* 16.
Biſtorta. *Cam. epit.* 683.
Oed. dan. t. 421.
Nater - wortel, Slangen - wortel, Adder - wortel, Harts - tong met bloemen. Belg.
Op Eſſenburg *by* Harderwyk; *aan den Dyk tuſſcben* Muiden *en* Weeſp; *te* Neer - Langbroek *in 't Sticbt van* Utrecht; *aan de Weſtkant van de* Mickelhorſt *aan 't Poppe - laantje buiten* Groningen.
Pharm. BISTORTÆ *rad.*

353. POLYGONUM floribus pentandris ſemidigynis, ſpica ovata. *Sp.* 517. *n.* 6. *Gelr.* 238. *Jngr.* 61. *Friſ.* 182. *amphibium.*
Potamogeton ſalicis folio. *Baub. pin.* 93. *Comm. boll.* 93.
Potamogeton. *Dod. pempt.* 582.
Oed. dan. t. 282.
Fontein - kruid. Belg.
Roowillig. Quibusdam.
β. Perſicaria foliis ſalicinis. *Comm. boll.* 86.

Aan

Aan de kanten van en in ſtilſtaande zoete Wateren en Vyvers, veel by Harderwyk *en* Twello *op de* Veluwe, *en elders.* β. *In de Weiden by* Harderwyk, Haarlem, Utrecht, &c.

Mire variat hæc planta a loco; in aquis ſi creſcat, ſtamina ſemper corolla breviora ſunt.

Hydropiper 354. Polygonum floribus hexandris ſemidigynis, foliis lanceolatis, ſtipulis ſubmuticis. *Sp.* 517. *n.* 9. *Gelr.* 239. *Ingr.* 61. *Friſ.* 183.

Perſicaria urens ſ. Hydropiper. *Baub. pin.* 101. *Comm. boll.* 87.

Hydropiper. *Dod. pempt.* 607.

Water-Peper Belg.

Veel op vochtige zand-gronden, en in de Slooten langs de Weiden.

Pharm. Persicariæ acris ſ. urentis *herb.*

Perſicaria. 355. Polygonum floribus hexandris digynis, ſpicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, ſtipulis ciliatis. *Sp.* 518. *n.* 10. *Gelr.* 240. *Ingr.* 61. *Friſ* 184.

Perſicaria mitis. *Baub. biſt.* 3. *p.* 779.

Perſicaria mitis maculoſa & non maculoſa. *Baub. pin.* 101. *Comm. boll.* 86.

Perſik-Kruid, Wilde-Wilge. Belg.

Rits. Ruſticis.

β. Perſicaria mitis, floribus candidis. *Tourn. inſt.* 509.

γ. Perſicaria minor. *Baub. pin.* 101. *Comm. boll.* 87. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 589. *ſ.* 5. *t.* 29. *f.* 5.

Veel by de Wegen, en in de Hoven, en Bouwlanden.

Pharm. Persicariæ *herb.*

aviculare. 356. Polygonum floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Sp.* 519. *n.* 15. *Gelr.* 241. *Friſ.* 185.

Polygonum latifolium. *Baub. pin.* 281. *Comm. boll.* 90.

Polygonum ſ. Centinodia. *Baub. biſt.* 3. *p.* 374.

Weg-gras, Kreupel-gras, Varkens-gras, Duizend-knoop. Belg.

β. Polygonum brevi anguſtoque folio. *Baub. pin.* 281.

γ. Po-

γ. Polygonum oblongo anguſto folio. *Baub. pin.* 281.
δ. Polygonum anguſtis foliis, calycibus purpuraſcentibus. *Dill. giſſ. app.* 65.
Veel by de Wegen, en op ruwe plaatſen.
Pharm. POLYGONI *herb.*

357. POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtuſatis. *Sp.* 522. *n.* 25. *Gelr.* 242. *Friſ.* 187. *Convolvulus.*
Convolvulus minor, ſemine triangulo. *Baub. pin.* 295. *Comm. holl.* 28.
Convolvulum nigrum. *Dod. pempt.* 396.
Zwarte Winde, Wilde Boekweit. Belg.
In Bouwlanden, Moeshoven, en Heggen.

CLAS.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

HEXAGYNIA.

BUTOMUS.

umbellatus. 358. Butomus. *Sp.* 582. *n.* 1. *Gelr.* 244. *Friſ.* 188.
Juncus floridus major. *Baub. pin.* 12. *Comm. boll.* 61.
Gladiolus aquatilis. *Dod. pempt.* 600.
Water - Liſcb. Belg.
Zwaane - bloem. Vulgo.
β. Butomus flore albo. *Tourn. inſt.* 271. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 299.
γ. Butomus flore ſaturate purpureo. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 299.
Aan de kanten der Slooten en Graften op veele plaatſen.

CLAS-

CLASSIS X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

MONOTROPA.

359. MONOTROPA floribus lateralibus octandris: terminali decandro. *Sp.* 555. *n.* 1. *Hypopitys.*
Orobanche quæ Hypopitys dici poteſt. *Baub. pin.* 88. *prodr.* 34.
Orobanche Hypopitys lutea. *Mentz. pug.* 3. *f.* 2.
Orobanche flore breviore duplici, verbaſculi odore. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 504. *f.* 12. *t.* 16. *f.* 20.
Oed. dan. t. 232.
In bet Dennen-boſcb by Uilenpas *in 't Graafſchap* Zutphen.
Legi dicto loco banc plantam florentem menſe Julio 1777. *Characterem genericum optime deſcripſit Cel.* DILLENIUS *nov. gen. p.* 134. *t.* 7. *Numerum autem petalorum & ſtaminum in bac planta ſæpe variare recte notarunt Cl.* WILLICH *obſ. p.* 37. & *Ill.* HALLERUS *flor. belv.* 1. *p.* 427.

ANDROMEDA.

360. ANDROMEDA pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Sp.* 564. *n.* 5. *Polifolia.*
Polifolia. *Buxb. cent.* 5. *p.* 28. *t.* 55. *f.* 1.
Erica humilis, roſmarini foliis, unedonis flore, capſula ciſtoide. *Pluk. alm.* 136. *t.* 175. *f.* 1.

Digitized by Google

Op vochtige plaatſen te Zuideras, *in 't Graafſchap* Zutphen.
Pedunculi apud nos communiter uniflori, uti in Linn. Lapp. t. 1. f. 2.

PYROLA.

rotundifolia 361. PYROLA ſtaminibus adſcendentibus, piſtillo declinato. *Sp.* 567. *n.* 1.
Pyrola rotundifolia major. *Baub. pin.* 191. *Comm. holl.* 94.
Pyrola. *Dod. pempt.* 138.
Oed dan. t. 110.
Winter-groen. Belg.
Overvloedig in de Duin-valeyen van Holland *en* Zeeland; *ook in 't Boſch op* Uilenpas; *en by* Bergum *in* Friesland.
Pharm. PYROLÆ *herb.*

uniflora. 362. PYROLA ſcapo unifloro. *Sp.* 558. *n.* 6. *Ingr.* 66.
Pyrola rotundifolia minor. *Baub. pin.* 191. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 278.
Pyrola minima alpina. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 536.
Oed. dan. t. 8.
† *Juxta* BOERHAAVIUM, *a me in Belgio non viſa, ſed copioſe in ſylvis vaſtiſſimis Ruſſiæ.*

DIGYNIA.

SAXIFRAGA.

tridactylites. 363. SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoſo. *Sp.* 578. *n.* 32. *Gelr.* 247.
Sedum tridactylites tectorum. *Baub. pin.* 285. *Comm. holl.* 104. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 31.
Paronychia altera. *Dod. pempt.* 113.
Veel op vochtige gronden en oude muuren te Deutichem, Harderwyk, Hattem, Haarlem, Utrecht, *en elders; overvloedig in de Duinen by* Overveen.

364. SAX-

Digitized by Google

364. Saxifraga foliis caulinis linearibus integris trifidisve, ſtolonibus procumbentibus, caule erecto nudiuſculo. *Sp.* 579. *n.* 37. *Gelr.* 248. *hypnoides.*
Sedum alpinum trifido folio. *Baub. pin.* 284. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 26.
Oed. dan. t. 348.
Op de Heide tuſſchen Harderwyk *en* Ermello.

SCLERANTHUS.

365. Scleranthus calycibus fructus patulis. *Sp.* 580. *n.* 1. *Gelr.* 246. *annuus.*
Knawel. *Dod. pempt.* 115.
Polygonum anguſtiſſimo & acuto, vel gramineo folio, minus repens. *Baub. pin.* 281. *Comm. boll.* 90.
Oed. dan. t. 504.
Engelſche-Steenbreek. Belg.
β. Polygonum gramineo folio, majus erectum. *Baub. pin.* 281.
In de zandige Koornlanden by Harderwyk, Haarlem, Alkmaar; *ook in de Duinen*; *als mede in 't zand by* Groningen.
Magna varietas in hac planta a loco. Vid. Dill. giſſ. 87. 236. *&. Linn. h. Cliff.* 166.

366. Scleranthus calycibus fructus clauſis. *Sp.* 580. *n.* 2. *perennis.*
Knawel incanum, flore majore, perenne. *Raj. angl.* 3. *p.* 160. *t.* 5. *f.* 1.
Polygonum cocciferum. *Baub. pin.* 281.
Oed. dan. t. 563.
Overvloedig in de Duinen by 's Hage *tuſſchen* Backershagen *en* Langenhorſt. (Meerburg.)

GYSOPHILA.

367. Gysophila foliis linearibus planis, caule dichotomo, pedunculis bifloris, petalis emarginatis. *Sp.* 583. *n.* 10. *rigida.*
Lychnis ſylveſtris minima, exiguo flore. *Baub. pin.* 206. *prodr.* 103. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 214. *n.* 60.
Tunica minima. *Dalech. hiſt.* 1191.
Boerhaavius *ut indigenam notat*, Linnæus ſuſpicatur in Belgio habitare.

Digitized by Google

SAPONARIA.

officinalis. 368. SAPONARIA calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Sp* 584. *n.* 1. *Gelr.* 245.
Saponaria major lævis. *Baub. pin.* 206.
Saponaria vulgaris. *Cam. epit.* 152.
Oed. dan. t. 543.
Zeep-kruid. Belg.
β. Lychnis, ſeu Saponaria flore pleno. *Tourn. inſt.* 336. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 212. *n.* 36.
γ. Lychis Saponaria concava anglica. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 212. *n.* 37.
Veel aan den Dyk te Yſendoorn, Tuil, *en* Waardenburg *in de* Betuwe, *en te* Wamel *over* Tiel; *aan de Wegen by* Zutphen *en* Doesburg; *in 't Boſcb van* Clarenbeek *by* Arnhem; *aan 't voetpad by den grooten Boeren-Hol buiten* Cuilenburg; *ook by* Everdingen; *buiten* 's Hage *langs den weg naar* Scheveningen; *aan den Duinkant buiten* Haarlem *by* Overveen, *en achter 't Huis te* Bredenrode; *ook tuſſchen* Velſen *en* Beverwyk *by de Hofſtede* Weſterhout.
Pharm. SAPONARIÆ *rad. herb.*

DIANTHUS.

prolifer. 369. DIANTHUS floribus aggregatis capitatis, ſquamis calycinis ovatis obtuſis muticis tubum ſuperantibus. *Sp.* 587. *n.* 4.
Armeria prolifera. *Lob. ic* 449.
Caryophyllus ſylveſtris prolifer. *Baub. pin.* 209. *Segu. ver.* 26. *t.* 7. *f.* 1.
Oed. dan. t. 221.
Op Zuideras *in 't Graafſchap* Zutphen; *aan den Berg by* Arnhem, *en elders.*

arenarius. 370 DIANTHUS caulibus ſubunifloris, ſquamis calycinis ovatis obtuſis, petalis multifidis, foliis linearibus. *Sp.* 589. *n.* 13. *Gelr.* 619.
Caryophyllus ſylveſtris humilis, flore unico. *Baub. pin.* 209.
Armerius flos tertius. *Dod. pempt.* 176.
Wilde Duizend-Schoon. Belg.
In de Allee van den Kranenborg *en elders by* Zwol.

TRI-

TRIGYNIA.

CUCUBALUS.

371. CUCUBALUS calycibus campanulatis, petalis diſtantibus, pericarpiis coloratis, ramis divaricatis. *Sp.* 59 . *n* 1. *Gelr.* 620. *baccifer.*
Lychnanthus volubilis. *Gmel. act. petr.* 1759. *vol.* XIV. *p.* 525. *t.* 17. *f.* 1.
Alſine ſcandens baccifera. *Baub. pin.* 250.
Alſine repens. *Dod. pempt.* 403.
In 't Boſch van den Uilenpas.

372. CUCUBALUS calycibus ſubgloboſis glabris reticulato-venoſis, capſulis trilocularibus, corollis ſubnudis. *Sp.* 591. *n.* 2. *Friſ.* 189. *Behen.*
Lychnis ſylveſtris, quæ Behen album vulgo. *Baub. pin.* 205.
Papaver ſpumeum. *Lob. ic.* 340.
Wit-Been of *Beben.* Belg.
Aan de Stadswal te Franeker, *en by bet* Heerenveen, *op vocbtige ruige plaatſen.* (MEESE.) *Buiten* Bloemendaal *by* Haarlem *gevonden door* Æg. de KOKER.

373. CUCUBALUS floribus dioicis, petalis linearibus indiviſis. *Sp.* 59.. *n.* 12. *Otites.*
Lychnis viſcoſa, flore muſcoſo. *Baub. pin.* 206.
Seſamoides magnum ſalmanticum. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 295.
Oed. dan. t. 518.
In de Duinen by 's Hage *digt by* Langenhorſt, *en overvloedig buiten* Haarlem *by* Bloemendaal, *en elders.*

SILENE.

374. SILENE petalis bifidis, floribus lateralibus ſecundis cernuis, panicula nutante. *Sp.* 596. *n.* 8. *nutans.*
Lychnis montana viſcoſa alba latifolia. *Baub. pin.* 205.
Lychnis viſcoſa, folio otitidis. *Loeſ. pruſſ.* 150. *t.* 40.
Oed. dan. t. 242.
β. Ocymoides minus ſ. album. *Dalecb. biſt.* 683.

In de Duinen by 's Hage *en* Catwyk. (MEERBURG.)
β. ook aldaar, en in de Duinen tuſſchen Velſen *en* Beverwyk *by de Hofſtede* Weſterhout, *en daar omtrent* (D. FABRICIUS SIX.)
Varietas β. folia multo anguſtiora habet, hinc pro diverſa ſpecie recenſita a Tournefortio.

conoidea. 375. SILENE calycibus fructus globoſis acuminatis ſtriis triginta, foliis glabris, petalis integris. *Sp.* 598. *n.* 15.
Lychnis ſylveſtris latifolia caliculis turgidis ſtriatis. *Baub. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris flore albo, cauliculis ſtriatis. *Comm. holl.* 69.
Lychnis ſylveſtris 2. *Cluſ. hiſt.* 8. *p.* 288.
Langs den Weg van 't Kraayeneſt *naar de Duinen.*

pendula. 376. SILENE calycibus fructiferis pendulis inflatis: angulis decem ſcabris. *Sp.* 599. *n.* 19.
Lychnis ſupina ſicula, calyce ampliſſimo ſtriato. *Tourn. inſt.* 336.
Viſcago hirſuta ſicula, lychnidis aquaticæ facie ſupina. *Dill. elth.* 421. *t.* 312. *f.* 404.
In de Duinen by Catwyk *en* Noordwyk. (MEERBURG.)
Rarioribus Belgii ſtirpibus merito adnumeranda.

STELLARIA.

nemorum. 377. STELLARIA foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramoſis. *Sp.* 603. *n.* 1. *Gelr.* 621. *Friſ.* 190.
Alſine altiſſima nemorum. *Baub. pin.* 251. *Comm. holl.* 6. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 550. *ſ.* 5. *t.* 23. *f.* 1. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 208.
Oed. dan. t. 271.
Groote Boſch-Muur. Belg.
Wilde-Rogge. Groninganis.
Op ſchaduwachtige plaatſen by Uilenpas, Harderwyk, Haarlem, Alkmaar, Heerenveen, Oranjewoud; *in 't* Klaverboſch *by* Harderwyk; *overvloedig in 't* Goreght *buiten* Groningen; *en elders.*

holoſtea. 378. STELLARIA foliis lanceolatis ſerrulatis, petalis bi-

bifidis. *Sp.* 603. *n.* 4. *Gelr.* 252. *Jngr.* 70. *Friſ.* 192.

Caryophyllus arvenſis glaber, flore majore. *Baub. pin.* 210. *Comm. boll.* 22.

Holoſteum. *Lob. ic.* 46.

Oogentrooſt - Gras. Belg.

Overvloedig in 't Klaverboſch *by* Harderwyk; *in 't* Haagſe-Boſch; *in den* Haarlemmer-hout; *in de* Salkerwaart; *te* Utrecht *by de Malibaan*; *in* Friesland *by het* Oranjewoud; *en elders.*

379. Stellaria foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. *Sp.* 604. *n.* 5. *Gelr.* 251. *Friſ.* 193. *graminea.*

Caryophyllus arvenſis glaber, flore minore. *Baub. pin.* 210. *Comm. boll.* 22.

Gramen floridum minus. *Tabern. ic.* 232.

Klein Oogen-trooſt - Gras. Belg.

In de Zaai-landen, en ook by de voorgaande.

380. Stellaria folliis lanceolatis, petalis bipartitis, calycem longitudine æquantibus. *Pollicb. palat.* 429. *aquatica.*

Alſine foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petiolis unifloris. *Hall. hiſt.* 881.

Alſine hyperici folio. *Vaill. par.* 9. *Tourn. inſt.* 242. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 209. *n.* 12. *Lind. alſat.* 112.

Alſine aquatica, folio gratiolæ, ſtellato flore. *Dill. giſſ.* 58.

† *Volgens* Boerhaave.

Hanc in Linnæanis *ſcriptis non reperio.*

A R E N A R I A.

381. Arenaria foliis ovatis acutis carnoſis. *Sp.* 605. *n.* 1. *Gelr* 622. *Friſ.* 194. *peploides.*

Alſine littoralis, foliis portulacæ. *Baub. pin.* 251.

Alſine maritima, foliis portulacæ. *Loeſ. pruſſ.* 12. *t.* 2.

Anthyllis maritima lentifolia. *Baub. pin.* 282. *Comm. boll.* 11.

Zee - Porcelyn. Vulgo.

Veel aan 't Zee-ſtrand by Harderwyk; *in de Duinen agter* Bergen *en* Wummenum *buiten* Alkmaar,

Digitized by Google

maar, *en op verſcheide andere plaatſen; in* Friesland *by* Koebool, Dyks-hoek, *en elders; te* Delfzyl *aan den* Dollart.

trinervia. 382. ARENARIA foliis ovatis acutis petiolatis nervoſis. *Sp.* 605. *n.* 4. *Gelr.* 255. *Jngr.* 71.
Alſine plantaginis folio. *Baub. biſt.* 3. *p.* 364. *Oed. dan. t.* 329.
Aan de Heggen en in de Boſchen op verſcheide plaatſen.

ſerpyllifolia 383. ARENARIA foliis ſubovatis acutis ſeſſilibus, corollis calyce brevioribus. *Sp.* 606. *n.* 6. *Gelr.* 254. *Friſ.* 195.
Alſine minor multicaulis. *Baub. pin.* 250. *Comm. boll.* 7.
Alſine minor. *Fuchſ. biſt.* 23.
Kleine-Muur. Belg.
β. Alſine minor, lini capitulis. *Baub. pin.* 251. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 209. *n.* 3.
In de Hoven en Moes-tuinen.

rubra. 384. ARENARIA foliis filiformibus, ſtipulis membranaceis vaginantibus. *Sp.* 606. *n* 8. *Gelr.* 256. *Friſ.* 196.
campeſtris. α. Spergula purpurea. *Baub. biſt.* 3. *p.* 722.
Alſine Spergulæ facie minor, ſive ſpergula minor, floſculo ſubcæruleo. *Baub. pin.* 251. *prodr.* 119. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 209. *n.* 7.
Polygonum foliis gramineis, ſpergulæ capitulis. *Loeſ. pruſſ.* 203. *t.* 63.
marina. β. Alſine ſpergulæ facie media. *Baub. pin.* 251. *Comm. boll.* 8. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 209 *n.* 6.
Spergula marina. *Dalecb. biſt.* 1385. *Baub. biſt.* 3. *p.* 723.
Zee-Spurrie. Belg.
α. *Te* Heemze *in* Overysſel *aan de kanten der Bouwlanden, alwaar weinig gras is; aan de dykjes in 't* Goreght, *en aan de kanten der Zaailanden by* Groningen; *ook buiten* Franeker, *en elders.* β. *op 't* Koegras *by de* Helder, *en langs de Zeekant by* Harderwyk, Muiderberg, &c.

ſtriata. 385. ARENARIA foliis linearibus erectis oppreſſis, calycibus oblongis ſtriatis. *Sp.* 608. *n.* 14.

Al-

Digitized by Google

Alſine folio cali, flore magno albo purpuraſcente. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 209. *n.* 10.
Auricula muris, pulchro flore, folio tenuiſſimo. *Baub. biſt.* 3. *p.* 361.
† *Volgens* BOERHAAVE.

PENTAGYNIA.

SEDUM.

386. SEDUM foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. *Sp.* 616. *n.* 2. *Gelr.* 266. *Friſ.* 197. *Telephium.*
Telephium vulgare. *Baub. pin.* 287. *Comm. boll.* 109.
Telephium alterum ſ. Craſſula. *Dod. pempt.* 130.
Anacampſeros vulgo Faba craſſa. *Baub. biſt.* 3. *p.* 681.
Smeer-Wortel, Groot Breuk-kruid, Woud-kruid, Donder-Boonen, Wolfs-Boonen. Belg.
St. Jans-kruid. Groninganis.
Op de Wallen te Zutphen, *aan de dykjes by* Uilenpas, Twello, *in 't* Clarenbeekſche-Boſch, *en elders in* Gelderland; *aan de dykjes by* Velſen; *in* Friesland *omtrent* Bergum, Ooſtermeer, Heerenveen *en elders in de Wouden, aan dykjes, ruige wegen en onbebouwde ſtukken lands; op boſchagtige plaatſen by de* Mickelhorſt, *by* Onnen, *en elders in 't* Goreght.
Pharm. CRASSULÆ *berb.*

387. SEDUM foliis planis, caule ramoſo, floribus paniculatis. *Sp.* 617. *n.* 8. *Cepæa.*
Cepæa. *Baub. pin.* 288. *Cam. epit.* 673. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 68. *Comm. boll.* 23.
Wilde Porcelyn. Belg.
Langs de Zee-kuſten van Holland, *veel op 't* Koegras *omtrent de* Helder, *en aan de* Muiderberg. (HALL. *Elem. Phyſiol. tom.* 7. *p.* 172.)

388. SEDUM foliis ſubulatis quinquafariam confertis baſi ſolutis, floribus cymoſis. *Sp.* 613. *n.* 11. *Gelr.* 267. *rupeſtre.*

Sedum minus luteum, folio acuto. *Baub. pin.* 282. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 471. *ſ.* 12. *t.* 6. *f.* 6.
Tripmadam. Vulgo.
Op de Muuren te Arnhem *en* Harderwyk; *langs de* Maas-dyken; *aan de Kerk te* Wyk by Duurſtede; *op de daken der huizen te* Amerongen, *en aan de Wal om 't Huis te* Beverwaart *in 't ſticht van* Utrecht; *overvloedig aan een dykje agter* Stelpen, *aan de weſtkant van de Heereweg, en agter* Haren *by* Voorveld *buiten* Groningen.

album. 389. Sedum foliis oblongis obtuſis teretiuſculis seſſilibus patentibus, cyma ramoſa. *Sp.* 619. *n.* 13. *Gelr.* 269.
Sedum minus teretifolium album. *Baub. pin.* 283. *Comm. holl.* 104. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 472. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 23. & 24.
Oed. dan. t. 66.
Klein Huis-Look. Belg.
Schot-kruid. Groninganis.
Op oude Daken en Muuren.
Pharm. Sempervivi minoris *herb.*

acre. 390. Sedum foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida. *Sp.* 619. *n.* 15. *Gelr.* 268. *Friſ.* 198.
Sempervivum minus vermiculatum acre. *Baub. pin.* 283. *Comm. holl.* 104.
Illecebra ſ. Sempervivum tertium. *Dod. pempt.* 129.
Muur-Peper. Belg.
Berg-Knop. Vulgo.
Aan den Dyk by Arnhem; *op de Heide by* Zelhem *in 't Graafſchap* Zutphen; *op de Stads-muuren te* Tiel, Harderwyk, Utrecht, Wyk by Duurſtede; *in de Duinen en aan de kanten der Zandige Bouwlanden by* Haarlem, Alkmaar, Naarden, *en elders. Menigvuldig langs de ganſche* Frieſche *Zee-kuſt, en op veele andere plaatſen binnen-dyks.*
Pharm. Illecebræ minoris *herb.*

OXALIS.

Acetoſella. 391. Oxalis ſcapo unifloro, foliis ternatis obcorda-

datis, radice dentata. *Sp.* 620. *n.* 1. *Gelr.* 264.
Trifolium acetoſum vulgare. *Baub. pin.* 330. *Comm. boll.* 112. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 184. *ſ.* 2. *t.* 17. *f.* 1.
Klaver - Zuuring, Koekkoeks - brood. Belg.
β. Trifolium acetoſum vulgare, flore purpuraſcente. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 183. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 319.
In de Koorn - landen en Moesboven; ook in 't Haagſe - Boſch.
Pharm. ACETOSELLÆ *berb.*

392. OXALIS pedunculis umbelliferis, caule ramoſo diffuſo. *Sp.* 623. *n.* 11. *Gelr.* 265. *Friſ.* 200. *corniculata*
Oxys lutea. *Baub. biſt.* 2. *p.* 388. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 319.
Trifolium acetoſum corniculatum. *Baub. pin.* 330. luteum minus repens, etiam procumbens. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 183. *ſ.* 2. *t.* 17. *f.* 2.
Koekkoeks - brood. Belg.
In de Moesboven, en in de Boſſchadie by Uilenpas.

A G R O S T E M M A.

393. AGROSTEMMA hirſuta, calycibus corollam æquantibus, petalis integris nudis. *Sp.* 624. *n.* 1. *Gelr.* 262. *Friſ.* 201. *Githago.*
Nigellaſtrum. *Dod. pempt.* 173.
Lychnis ſegetum major. *Baub. pin.* 204. *Comm. boll.* 69.
Oed. dan. t. 576.
Koorn - Roozen of *Nagel - bloemen.* Belg.
Bol of *Bolderik.* Ruſticolis.
In de Zaailanden onder 't Koorn op verſcheide plaatſen.

L Y C H N I S.

394. LYCHNIS petalis quadrifidis fructu, ſubrotundo. *Sp.* 625. *n.* 2. *Gelr.* 263. *Friſ.* 202. *Flos cuculi.*
Caryophyllus pratenſis, flore laciniato ſimplici, ſ. Flos cuculi. *Baub. pin.* 213. *Comm. boll.* 22.
Oed. dan. t. 590.
Koekkoeks - bloem, Kraaye - Bloem. Belg.
Pinxter - bloemen. Groninganis.
β. Lychnis pratenſis, flore laciniato albo ſimplici. *Tourn. inſt.* 336.

Zeer

Zeer veel in de Hooy-en Wey-Landen. β. aan de Sloot omtrent den Tryſelberg *by* Hattem; *ook by* Groningen.

dioica. 395. Lychnis floribus dioicis. *Sp.* 626. *n.* 6. *Gelr.* 249. *Friſ.* 203.

α. Lychnis ſylveſtris ſ. aquatica purpurea ſimplex. *Baub. pin.* 204. *Comm. boll.* 69.

Ocimoides purpureum multis. *Baub. biſt.* 3. *p.* 343.

β. Lychnis ſylveſtris alba ſimplex. *Baub. pin.* 204. *Comm. boll.* 69.

By de wegen op ſchaduwachtige plaaten by Vanenburg, Oden-Aller, in Hierden, *en elders in* Gelderland, *by* Haarlem, Velſen; *in 't* Haagſe-Boſch; *by* Utrecht; *op den* Rhenenſe-Berg; *en veele andere plaatſen. β. Langs de Duinen en aan zandige wegen.*

Variat etiam α corolla colore rubro, pallido, albicante, &c.

CERASTIUM.

vulgatum. 396. Cerastium foliis ovatis, petalis calyci æqualibus, caulibus diffuſis. *Sp.* 627. *n.* 2.

Alſine hirſuta magno (parvo potius) flore. *Baub. pin.* 251. *Comm. boll.* 7.

Auricula muris quorundam, flore parvo, vaſculo longo. *Baub. biſt.* 3. *p.* 359.

In de Hoven, en langs de Wegen by Harderwyk, Hattem, Haarlem, Utrecht, Zwol, *en elders.*

viſcoſum. 397. Cerastium erectum villoſo-viſcoſum. *Sp.* 627. *n.* 3. *Gelr.* 260.

Alſine hirſuta altera viſcoſa. *Baub. pin.* 251. *Comm. boll.* 7.

Alſine ſpuria quarta. *Dod. pempt.* 31.

Ruig Muur. Belg.

Langs de Wegen en in de Hoven.

ſemidecandrum. 398. Cerastium floribus pentandris, petalis emarginatis. *Sp.* 627. *n.* 4. *Gelr.* 261.

Alſine hirſuta minor. *Baub. pin.* 211.

Myoſotis arvenſis hirſuta minor. *Tourn. inſt.* 245. *Vaill. par.* 142. *t.* 30. *f.* 2.

Veel

Digitized by Google

Veel op Zandige plaatſen by Harderwyk.
Tempore vernali inprimis conſpicitur.

399. CERASTIUM foliis lineari-lanceolatis obtuſis glabris, corollis calyce majoribus *Sp.* 628. *n.* 6. *Gelr.* 259 *Friſ.* 205. *arvenſe.*
Caryophyllus holoſteus arvenſis hirſutus, flore majore. *Bauh. pin.* 210. *Comm. boll.* 22.
Auricula muris, pulchro flore albo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 360.
Kleine witte Ginoffelen, Ruig Oogen-trooſt-Gras. Belg.
Scheele Oogen. Vulgo.
In den Enck *en elders by* Harderwyk; *langs de zandige Wegen en Akkers by* Velſen; *aan de dykjes omtrent* Oudega *en* Rotteval *in* Friesland.

SPERGULA.

400. SPERGULA foliis verticillatis, floribus decandris. *Sp.* 630. *n.* 1. *Gelr.* 257. *Friſ.* 206. *arvenſis.*
Spergula. *Dod. pempt.* 537.
Alſine Spergula dicta major. *Bauh. pin.* 250. *Comm. boll.* 8.
Spurrie. Belg.
Water-Gal. Groninganis.
β. Spergula *pentandra. Sp.* 630. *n.* 2. *Friſ.* 307. *Belg.* 378.
Alſine ſpergulæ facie minima, floſculis albis. *Comm. boll.* 8.
Overvloedig op de Akkers van 't Duin, en in de zandige Bouw-landen by Arnhem, Harderwyk, Haarlem, Alkmaar; *in* Gooiland; *in de* Wouden *in* Friesland; *in 't* Goreght *by* Groningen; *en elders.* . *Overvloedig agter den* Hoef *en* Bergen *buiten* Alkmaar; *in 't* Bentveld *by* Haarlem; *en elders.*
Ill. LINNÆUS (*Mant. p.* 390) *recte monet Spergulam arvenſem & pentandram meras eſſe varietates.*

401. SPERGULA foliis oppoſitis ſubulatis lævibus, caulibus ſimplicibus. *Sp* 630. *n.* 3. *Gelr.* 258. *nodoſa.*
Alſine nodoſa germanica. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118.

Ara-

Arenaria. *Baub. biſt.* 3. *p.* 720. *f.* 721. *Comm. boll.* 12.
Polygonum, foliis gramineis, alterum. *Loeſ. pruſſ.* 204. *t.* 64.
Oed. dan. t. 96.
Zand-kruid. Belg.
In de Duin-Valeyen by 's Hage, Raaphorſt, Weſterhout, Heemſtede; *ook op vochtige plaatſen omtrent* Hattem *en* Zwol; *in 't Veenland by* Haren *buiten* Groningen.

CLAS-

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

LYTHRUM.

402. LYTHRUM foliis oppoſitis cordato - lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris. *Sp.* 640. *n.* I. *Gelr.* 270. *Friſ.* 208. *Salicaria.*
Lyſimachia ſpicata purpurea. *Baub. pin.* 246. *Comm. holl.* 70.
Pſeudo-Lyſimachium purpureum alterum. *Dod. pempt.* 86.
Partyke. Belg.
Katte-Staarten. Groninganis.
Veel aan de Water-kanten.

403. LYTHRUM foliis alternis linearibus, floribus hexandris. *Sp.* 642. *n.* 8. *Gelr.* 271. *Hyſſopifolia.*
Salicaria hyſſopi folio latiore. *Tourn. inſt.* 253. *Hall. jen.* 147. *t.* 6.
Hyſſopifolia ſ. Gratiola minor anguſtioribus foliis. *Baub. prodr.* 108.
Hyſſopifolia. *Baub. pin.* 218.
In Overyſſel *te* Weſterholte *in de laagte omtrent 't huis van de groote Kerk.*
MEESE *cum præcedenti creſcere dicit. Cl.* BOEHMER *Flor. Lipſ.* 540. *modo ſtamina* 4. *aliquando, ut Ill.* HALLERUS, 5. *vel* 6. *vidit.*

DI-

D I G Y N I A.

A G R I M O N I A.

Eupatoria. 404. AGRIMONIA foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hiſpidis. *Sp.* 648. *n.* 1. *Gelr.* 272. *Friſ.* 210.

Eupatorium veterum ſ. Agrimonia. *Baub. pin.* 321. *Comm. boll.* 36.

Eupatorium. *Fuchſ. biſt.* 244. *Cam. epit.* 756. *Oed. dan. t.* 588.

Agrimony, *Lever-kruid.* Belg.

Veel in de Betuwe *en 't Graafſchap* Buuren; *in de Weiden omtrent den* Yſſel; *aan den Dyk by* Wageningen *en de* Poll; *in 't Ribben-Boſchje by* Harderwyk; *aan den Dyk by* Gouda; *in de graſige Valeyen der Duinen buiten* 's Hage, Haarlem *en* Alkmaar; *aan de Wegen om* Utrecht *en* Wyk by Duurſtede; *by* Balk *en* Veenhuiſen *in* Friesland; *by* Zwol; *te* Hemmen *en* Haren *by* Groningen; *en elders.*

Pharm. AGRIMONIÆ *herb.*

T R I G Y N I A.

R E S E D A.

Luteola. 405. RESEDA foliis lanceolatis integris baſi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. *Sp.* 643. *n.* 1. *Gelr.* 309.

Luteola herba ſalicis folio. *Baub. pin.* 100. *Comm. boll.* 69.

Luteola herba. *Dod. pempt.* 80.

Wouw. Belg.

Aan den Weg tuſſchen Zutphen *en* Doesburg; *op de Wal te* Tiel *en* Bommel, *langs de Wegen by* 's Hage; *in de Duinen niet verre van* Wyk op Zee; *aan den Dyk tuſſchen* Naarden *en* Muiden; *by 't Caſteel* Duurſtede; *te* Groningen *by Ebbingepoort onder aan de Wal by 't Boterdiep; en elders.*

406. RE-

406. RESEDA foliis omnibus trifidis: inferioribus pinnatis. *Sp.* 645. *n.* 8 *Gelr.* 310. *lutea.*
Reſeda vulgaris. *Baub. pin.* 100. *Comm. boll.* 98.
Reſeda lutea. *Baub. biſt.* 3. *p.* 467.
Om Arnhem *by 't* Slakke-*gat*; *te* Hattem *op de Homoets poort*; *aan de Dyken by* Amſterdam; *in 't* Haagſche-Boſch; *aan de Duinkant buiten* Haarlem; *en elders.*

EUPHORBIA.

407. EUPHORBIA dichotoma, foliis crenulatis ſubrotundis glabris, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. *Sp.* 452. *n.* 45. *Chamæſyce.*
Chamæſyce. *Baub. pin.* 293. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 187.
† *Volgens* BOERHAAVE.

408. EUPHORBIA umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Sp.* 653. *n.* 31. *Gelr.* 303. *Friſ* 211. *Peplus.*
Peplus ſ. Eſula rotunda. *Baub. pin.* 292. *Comm. boll.* 86.
Peplus. *Fuchſ. biſt.* 603. *Dod. pempt.* 375.
Duivels-Melk, Hexe-Melk, Kroontjes-kruid, Kleine Spurge. Belg.
In de Zaai-landen, Moes-boven, en by de Wegen.

409. EUPHORBIA umbella trifida: dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Sp.* 654. *n.* 34. *Gelr.* 304. *exigua.*
Tithymalus ſ. Eſula exigua. *Baub. pin.* 291. *Comm. boll* 110 *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 339 *ſ.* 10. *t.* 2. *f* 5.
Oed. dan. t. 592.
In de Koorn-landen by Bunnik, Odyk *in de Provintie* Utrecht; *by* Zwol; *en elders.*

410. EUPHORBIA umbella quinquefida: bifida, involucellis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis: infimis involutis retrorſum imbricatis. *Sp.* 656. *n.* 41. *Pithyuſa.*
Tithymalus foliis brevibus aculeatis. *Baub. pin.* 292.
Pithyuſa. *Dalecb biſt.* 1652.
In de Duinen. (LINN.)

Paralias. 411. EUPHORBIA umbella ſubquinquefida: bifida, involucellis cordato-reniformibus, foliis furſum imbricatis. *Sp.* 657. *n.* 43. *Gelr.* 306.
Tithymalus maritimus. *Baub. pin.* 291. *Dod. pempt.* 370. *f.* 1. 2. *Comm boll.* 110.
Tithymalus paralios. *Cam. epit.* 962.
Zee-Wolfs-Melk. Belg.
By Zandvoort *op de Zee-duinen.*

helioſcopia. 412. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ſerratis. *Sp.* 658. *n.* 46. *Gelr.* 302. *Friſ.* 212.
Tithymalus helioſcopius. *Baub. pin.* 291. *Dod. pempt.* 371. *Lob. hiſt.* 192. *Comm. boll.* 111. *Moriſ hiſt.* 3. *p.* 339. *ſ.* 10. *t.* 2. *f.* 9.
Zonnewendend Wolfs-Melk of *Kroontjes-kruid.* Belg.
In de Zaai-landen by het Huis te Marquette; *te* Salk *in* Overyſſel; *en in* Friesland *op veele plaatſen onder 't Koorn.*

platyphyllos 413. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis carina piloſis, foliis ſerratis lanceolatis, capſulis verrucoſis. *Sp.* 660. *n.* 53.
Tithymalus arvenſis latifolius germanicus. *Baub. pin.* 291.
Tithymalus platyphyllos. *Fuchſ. hiſt.* 813.
† *Volgens* BOERHAAVE.

Eſula. 414. EUPHORBIA umbella multifida: bifida, involucellis ſubcordatis, petalis ſubbicornibus, ramis ſterilibus, foliis uniformibus. *Sp.* 660. *n.* 54. *Gelr.* 305. *app. p.* 249.
Tithymalus foliis pini, forte dioſcoridis Pityuſa. *Baub. pin* 293. *Comm. boll.* 110.
Eſula minor. *Dod. pempt.* 374.
Kleine Eſula of *Wolfs-Melk*, *Kleine Spurge.* Belg.
Overvloedig in de Velden, en aan den Dyk langs den Yſſel *in* Gelderland *en* Overyſſel.
Pharm. ESULÆ MINORIS *rad.*

Cypariſſias. 415. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, involucellis ſubcordatis, ramis ſterilibus, foliis ſe-

ſetaceis; caulinis lanceolatis. *Sp.* 661. *n.* 55. *Gelr.* 624

Tithymalus cypariſſias. *Baub. pin.* 291.

Tithymalus cypariſſinus *Tabern. hiſt.* 990.

Omtrent de Waart te Salk *by* Campen.

416. EUPHORBIA umbella multifida: ſubtrifida: bifida. involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis ſterilibus. *Sp.* 662. *n.* 57. *Gelr.* 207. *paluſtris.*

Tithymalus paluſtris fruticoſus. *Baub. pin.* 292. *Comm. boll.* 110. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 341. *ſ.* 10. *t.* 2. *f.* 1.

Eſula major. *Dalecb. hiſt.* 1653. *Dod. pempt.* 374.

Groot Wolfs-Melk, Groote Spurge, Duivels-Melk. Belg.

Aan de Slooten by Nymegen *en* Doesburg; *in 't Boſch van den* Uilenpas; *in de Riet-landen aan den Hoogendyk tuſſchen* Amſterdam *en* Muiden; *en in ſommige ſlooten in* Friesland; *en elders.*

Pharm. ESULÆ MAJORIS *rad.*

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM.

417. SEMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Sp.* 664. *n.* 3. *Gelr.* 273. *tectorum.*

Sempervivum majus alterum ſ. Barba jovis. *Dod. pempt.* 127.

Sedum majus vulgare. *Baub. pin.* 283. *Comm. boll.* 124.

Huis-look, Donderbaart Belg.

Op de Daken en Muuren van oude Huizen.

Pharm. SEMPERVIVI MAJORIS *herb.*

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

PRUNUS.

Padus. 418 Prunus floribus racemoſis, foliis deciduis baſi ſubtus biglandulofis *Sp.* 677. *n.* 1. *Gelr.* 277.
Ceraſus racemoſa ſylveſtris, fructu non eduli. *Baub. pin.* 451.
Pſeudo-Liguſticum. *Dod. pempt.* 777.
Oed. dan. t. 205.
Zwarte Vogel-Kars, Honds-Kars. Belg.
Wilde Syringe. Vulgo.
By Harderwyk *in den Enk, aan 't eind van de Zandſteeg, aan de kant van de booge Sypel, en op andere vochtige plaatſen:*

avium. 419. Prunus umbellis ſeſſilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis ſubtus pubeſcentibus. *Sp.* 680. *n.* 10
Ceraſus ſylveſtris, fructu rubro. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 220
Wilde Karſen-boom. Vulgo.
In 't Boſch van den Uilenpas.

domeſtica. 420. Prunus pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. *Sp.* 680. *n.* 11. *Gelr.* 275. *Friſ.* 213.

Pru-

Digitized by Google

Prunus. *Baub. pin.* 443.
Pruna majora dulcia & parva atro-cærulea. *Baub. pin.* 442. *n.* 23.
Wilde kleine zwart blauwe Pruim. Belg.
In Frieſland *omtrent* Bergum, 't Wyſel, Kooten, *en* Drogeham *in ruige Wallen, Kreupelboſjes, en op ſommige afgelegene plaatſen.*
Pharm. PRUNI *fruct.*
Multæ bujus in bortis coluntur varietates.

421. PRUNUS pedunculis ſolitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis ſpinoſis *Sp.* 681. *n.* 13 *Gelr.* 274. *Friſ.* 214. *ſpinoſa.*
Prunus ſylveſtris. *Baub. pin.* 444. *Dod. pempt.* 753. *Comm. boll.* 93.
Slee-doorn, Slee-pruim. Belg.
Slyen Groninganis.
Veel buiten Tiel, Harderwyk, Zwol, Naarden *omtrent* Cralo; Haarlem *agter* Overveen; *in 't* Haagſe-Boſch; *by* Doorn *in 't Sticbt van* Utrecht; *in* Frieſland *by de voorige, als nog te* Suyrhuyſum *by* Haule, *en omtrent* Donkerbroek; *menigvuldig aan de dykjes door 't gebeele* Goreght *by* Groningen; *en op meer plaatſen aan de wegen tuſſcben kreupelbout.*
Pharm PRUNI SYLVESTRIS *flor. fructus, quorum ſuccus Acacia germanica.*

DIGYNIA.

CRATÆGUS.

422. CRATÆGUS foliis obtuſis ſubtrifidis ſerratis. *Sp.* 683. *n.* 8. *Gelr.* 278. *Friſ.* 215. *Oxyacantha.*
Meſpilus, apii folio, ſylveſtris ſpinoſa ſ. Oxyacantha. *Baub. pin.* 454. *Comm. boll.* 74.
Oxyacantha ſ Spina acuta. *Dod. pempt.* 751.
Haage-doorn. Belg.
Fructus vulgo Haag-appels, Spinne-koorns.
In de Wilderniſſen op veele plaatſen, ook in de Duinen by Overveen, *en* Weſterhout, *en op het* Hoogeveld *by den* Haarlemmer-hout.
Flores ſæpius monogyni, quam digyni.

TRIGYNIA.

SORBUS.

aucuparia. 423. SORBUS foliis pinnatis utrinque glabris. *Sp.* 683. *n.* 1. *Gelr.* 279. *Friſ.* 216.
Sorbus ſylveſtris, foliis domeſticæ ſimilis. *Baub. pin.* 415. *Comm. boll.* 107.
Sorbus aucuparia. *Laub. biſt.* 1. *p.* 62.
Lyſter - Beziën - boom, Sorbe - boom, Qualſter - boom. Belg.
Quetze - beyen - boom. Groninganis.
In 't Haagſe - Boſch, *in de Duinen niet verre van* Waſſenaar; *veel aan de dykjes in 't* Goreght *buiten* Groningen; *en elders aan de Wegen op ſchaduwachtige plaatſen, en aan de kanten der Boomgaarden.*

PENTAGYNIA.

PYRUS.

communis. 424. PYRUS foliis ſerratis lævibus, floribus corymboſis. *Sp.* 686. *n.* 1. *Gelr.* 282. *Friſ.* 217.
Pyrus ſylveſtris. *Baub. pin.* 439. *Dod. pempt.* 799. *Comm. boll.* 94.
Wilde Peere - boom. Belg.
In 't Salker - boſcb tuſſcben Campen *en* Salk *aan den* Yſsel; *ook van zelf uit 't zaad in de Ent - boven.*

Malus. 425. PYRUS foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus. *Sp.* 689. *n.* 2. *Gelr.* 281. *Friſ.* 218.
Malus ſylveſtris. *Baub. pin.* 435. *Dod. pempt.* 790. *Comm. boll.* 71.
Wilde Appel - boom. Belg.
By de voorige; ook aan de Heereweg agter Helpen, *agter* Haren, *en aan de Weg naar* Onnen *buiten* Groningen.

SPIRÆA.

Filipendula. 426. SPIRÆA foliis pinnatis: foliolis uniformibus ſer-

ra-

ratis, caule herbaceo, floribus corymboſis. *Sp.* 702. *n* 9.

Filipendula vulgaris. *Baub. pin.* 163. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 43.

Filipendula. *Cam. epit.* 608. *Dod. pempt.* 56.

Roode Steen-breek, Drop-wortel. Belg.

Op een Waard aan de Leck *tuſſchen* Wyk by Duurſtede *en* Schalkwyk.

Pharm. Filipendulæ *rad. herb.*

427. Spiræa foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymoſis. *Sp.* 702. *n.* 10. *Gelr.* 284. *Friſ.* 219. *Ulmaria.*

Barba capræ floribus compactis. *Baub. pin.* 164. *Comm. boll.* 15

Regina prati. *Dod. pempt.* 57.

Oed. dan. t. 547.

Geiten-baard, Reinette. Belg.

Veel op vochtige ſchaduwachtige plaatſen.

POLYGYNIA.

ROSA.

428. Rosa germinibus globoſis pedunculisque glabris, caule aculeis ſparſis rectis, petiolis ſcabris, foliolis acutis. *Sp.* 703. *n.* 3. *Eglanteria*

Roſa ſylveſtris, foliis odoratis. *Baub. pin.* 483. *Comm. boll.* 99.

Roſa eglanteria. *Tabern. ic.* 1087.

Wilde Rooze-boom, Eglantier, of *Neglantier.* Belg.

By Velſen *aan de kanten der Akkers.*

429. Rosa germinibus globoſis glabris, pedunculis hiſpidis, caule petiolisque aculeatiſſimis. *Sp.* 705. *n.* 14. *ſpinoſiſſima.*

Roſa campeſtris ſpinoſiſſima, flore albo odorato. *Baub. pin.* 483. *Comm. boll.* 99.

Roſa dunenſis *Dod. pempt.* 182.

Oed. dan. t. 398.

Duin-Roos. Belg.

Te Maurik *op den* Bikkelenberg *in de* Betuwe; *in de Duinen aan de Weg tuſſchen* Haarlem *en* Zandvoort.

voort, *en in die agter* Weſterhout.

canina. 430. Rosa germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Sp.* 704. *n.* 10. *Gelr.* 285. *Friſ.* 220.
Roſa ſylveſtris vulgaris, flore odorato incarnato. *Baub. pin.* 483.
Roſa canina vulgo dicta. *Dod. pempt.* 187.
Honds-Roos. Belg.
Wipe-doorn. Harderovicenſis.
Veel aan de kanten der Akkers in de Betuwe, *ook by* Harderwyk; *in* Twente *by* Enſchede; *in* Friesland *omtrent* Eeſtrum, Drogeham, Kooten, *en elders*; *in 't* Goreght, *en menigvuldig aan de Ooſtkant van* Haren *buiten* Groningen.
Pharm. Cynosbati *fruct. Bedeguar.*

RUBUS.

idæus. 431. Rubus foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Sp.* 706. *n.* 1. *Gelr* 288
Rubus idæus ſpinoſus. *Baub. pin.* 479. *Comm. boll.* 99.
Rubus idæus. *Dod. pempt.* 743.
Framboizen, *Braamboozen*, *Hinne-Beziën.* Belg.
Heining-Beſſen. Veenendalenſibus.
Veel by de Wegen te Venendaal *op de* Veluwe; *en in 't Boſch by de* Mickelhorſt *buiten* Groningen.
Pharm. Rubi idæi *bacc.*

caeſius. 432. Rubus foliis ternatis ſubnudis: lateralibus bilobis, caule aculeato tereti. *Sp.* 707. *n.* 4. *Gelr.* 287.
Rubus repens, fructu cæſio. *Baub. pin.* 479.
Rubus minor. *Dod. pempt.* 742.
Blaauwe Brummelen Gelris
Tuſſchen Nykerk *en de* Beerckamp; *ook by* Uilenpas, Zuideras, Oen, *en elders in* Gelderland.

fruticoſus. 433. Rubus foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Sp.* 707. *n.* 5. *Gelr.* 286. *Friſ.* 221.
Rubus vulgaris, ſive Rubus fructu nigro. *Baub. pin.* 479. *Comm. boll.* 99.

Ru-

Rubus. *Dod. pempt.* 743. *Cam. epit.* 751.
Braam-beziën. Belg.
Brummels. Vulgo.
Tonbeyen. Friſiis.
Langs de Wegen in Gelderland, Utrecht, Overyſſel, Twente; *overvloedig in de* Haarlemmerhout *en 't* Haagſe-Boſch; *langs de Duinkant in* Holland; *door de gantſche Woudkant in* Frieſland; *en in 't* Goreght *buiten* Groningen.
Pharm. RUBI VULGARIS *bacc.*

FRAGARIA.

434. FRAGARIA flagellis reptantibus. *Sp.* 708. *n.* 1. *Gelr.* 289. *Friſ.* 222. *veſca.*
Fragaria vulgaris. *Baub. pin* 326. *Comm. boll.* 78.
Aard-beziën. Belg.
β. Fragaria fructu albo. *Baub. pin.* 326.
In verſcheide Boſſchadien in Gelderland, Overysſel, Frieſland; *aan de Duinkant van* Holland; *aan de dykjes by* Haren *buiten* Groningen.
Pharm. FRAGARIÆ *rad. berb. fruct.*
Varietatem β olim etiam legi in peribolo turris Hardervovicenæ, e ſeminibus a vento vel avibus ibi procul dubio adlatis enatam.

POTENTILLA.

435. POTENTILLA foliis pinnatis ſerratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Sp.* 710. *n.* 2. *Gelr.* 290. *Friſ.* 223. *Anſerina.*
Potentilla. *Baub. pin.* 321. *Comm. boll.* 93.
Argentina. *Dod. pempt.* 600.
Oed dan. t. 544.
Zilverſchoon, Zilver kruid, Blik, Ganſerik. Belg.
Menigvuldig aan de Wegen en Paden, en in de Weilanden.
Pharm. ARGENTINÆ ſ. ANSERINÆ *berb.*

436. POTENTILLA foliis pinnatis, caule dichotomo decumbente. *Sp.* 711. *n* 9. *ſupina.*
Pentaphyllum ſupinum quorundam, potentillæ facie. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 107.
Quinquefolio fragifero affinis. *Baub. pin.* 326. *Comm. boll.* 94.

Digitized by Google

* *Op zandige dorre plaatſen in de Duinen en omtrent den* Haarlemmer-hout, *en buiten* Utrecht *achter de* Bilt.

argentea. 437. POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibus incisis ſubtus tomentoſis, caule erecto. *Sp.* 712. *n.* 11. *Gelr.* 292. *Friſ.* 224.
Quinquefolium folio argenteo. *Baub. pin.* 325.
Pentaphyllum minus. *Cam. epit.* 760.
In de Duinen by Raaphorſt *en* Weſterhout; *te* Heemze *by de Kalfsboom in* Overysſel; *in* Friesland *op verſcheide plaatſen in de* Wouden *in Boſſchen, laage gruppels en Heivelden.*

verna. 438. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acute ſerratis retuſis; caulinis ternatis, caule declinato. *Sp. n.* 15.
Quinquefolium minus repens luteum. *Baub pin.* 325.
Pentaphyllum ſ. Quinquefolium minus. *Tabern. ic.* 123.
Oed. dan. t. 114.
In de Landen by den Eſſenburg *buiten* Harderwyk.

reptans. 439. POTENTILLA foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Sp.* 714. *n.* 22. *Gelr.* 291. *Friſ.* 225.
Quinquefolium majus repens. *Baub. pin.* 325. *Comm. boll.* 94.
Quinquefolium majus. *Dod. pempt.* 116.
Vyf-vinger-kruid. Belg.
Veel op de Stads wey by Harderwyk; *in de Duinvaleyen van* Holland, *en in de* Wouden *in* Friesland.
Pharm. PENTAPHYLLI *rad.*

TORMENTILLA.

erecta. 440. TORMENTILLA caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus. *Sp.* 716. *n.* 1. *Gelr.* 293. *Friſ* 226.
Tormentilla ſylveſtris. *Baub. pin.* 326. *Comm. boll.* 111.
Tormentilla. *Cam. epit.* 685.
Oed. dan. t. 589.
Tormentille, ook *Zeven-blad.* Belg.

Meer-

Meer-wortel Ruricolis Gelriæ.
Veel op de Heide in Gelderland; *in de Duin-valeyen, en op zandige gronden by* Haarlem, Naarden, Utrecht, Zwol; *in de Wouden in* Friesland; *en elders.*
Pharm. TORMENTILLÆ *rad. herb.*
Radice bujus plantæ ruſtici utuntur ad mictum cruentum pecorum curandum, quæ tunc ipſis dicuntur aan 't Meer te ſtaan, unde ratio denominationis.

GEUM.

441. GEUM floribus erectis, fructibus globoſis villoſis: ariſtis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Sp.* 716. *n* 2. *Gelr.* 295. *Friſ.* 227. *urbanum.*
Caryophyllata vulgaris. *Baub. pin.* 321. *Comm. boll.* 21.
Caryophyllata. *Dod. pempt.* 137.
Nagel-kruid, Gezegend-kruid Belg.
Op ſchaduwachtige plaatſen in Gelderland, Utrecht, Overyſſel, Friesland; *in den Hout by* Haarlem *en* Alkmaar; *in 't* Haagſe-boſch *en aan den Weg naar* Scheveningen; *te* Groningen *op de Stads-wal tuſſchen de Ebbinge-en Heenſil-poort, ook aan de Heereweg aan de dykjes, dog weinig.*
Pharm. CARYOPHYLLATÆ *rad.*

442. GEUM floribus nutantibus, fructu oblongo: ariſtis plumoſis tortis. *Sp.* 717 *n.* 3. *Friſ.* 228. *rivale.*
Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Baub. pin.* 321.
Caryophyllata ſeptentrionalium. *Lob. ic.* 694.
Nagel-kruid met neergebogene bloemen. Belg.
In de ruige Laanen en Boſſchen in Friesland. (MEESE.)

COMARUM.

443. COMARUM. *Sp.* 718. *n.* 1. *Gelr.* 294. *Friſ.* 229. *paluſtre.*
Quinquefolium paluſtre rubrum. *Baub. pin.* 326. *Comm. boll.* 95.
Pentaphyllum ſ. Heptaphyllum majus rectum rubrum paluſtre. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 189. *ſ.* 2. *t.* 19. *f.* 4.

Wa-

Water - Vyf - vinger - kruid. Belg.
Krooſen. Vulgo.
By Hulſen *buiten* Nymegen; *in 't Veen by* Uilen-pas; *aan de Stads - wey by* Harderwyk; *en elders in* Gelderland *in ſtilſtaande Slooten en moeraſſige Landen; ook by* Kraalingen *buiten* Rotterdam; *by* Overveen *buiten* Haarlem; *by* Maarſeveen *in 't Sticht van* Utrecht; *by* Zwol; *in veele Woudplaatſen in* Friesland; *en door gantſch* Groningen.

CLAS-

Digitized by Google

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

CHELIDONIUM.

444. CHELIDONIUM pedunculis umbellatis. *Sp.* 723. *n.* 1. *Gelr.* 300. *Friſ.* 230. *majus.*
Chelidonium majus vulgare. *Baub. pin.* 144. *Comm. boll.* 25. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 257. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 2. *Oed. dan. t.* 542.
Stinkende Gouw, Oogen-klaar, Schel-kruid Belg.
β. Chelidonium majus vulgare, folio magis diſſecto. *Poerb lugdb.* 1. *p* 305. *n.* 5.
Veel onder de Heggen op ruwe plaatſen.
Pharm. CHELIDONII MAJORIS *rad. berb.*

PAPAVER.

445. PAPAVER capſulis clavatis hiſpidis, caule folioſo multifloro. *Sp.* 725. *n.* 2. *Gelr.* 623. *Friſ.* 231. *Argemone.*
Argemone capitulo longiore *Baub. pin.* 172. *Lob. ic.* 276.
Argemone capitulo tenuiore longiore hirſuto. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 278. *ſ.* 3. *t.* 14. *f.* 10.
Wilde Ruige-baſtard-Heul Belg.
Op de Akkers in Hierden *buiten* Harderwyk, *in* Bronkhorſt, *en elders in* Gelderland; *by het Dorp* Heemskerk *in* Kennemerland; *en by* Pieters-

terſbierum *in* Friesland.

Rhœas. 446. PAPAVER capſulis glabris globoſis, caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis. *Sp.* 726. *n.* 6. *Gelr.* 299. *Friſ.* 232.
Papaver erraticum majus. *Baub. pin.* 171. *Comm. boll.* 85.
Papaver erraticum. *Dod. pempt.* 447.
Klap-Roozen, Koorn-Roozen, Koorn-Heul, Kolbloemen, Kanker-bloemen. Belg.
Honds-Roozen. Ultrajectinis.
Overvloedig in de Koorn-landen.
Pharm. PAPAVERIS RHŒADOS *flor.*

ſomniferum 447. PAPAVER calycibus capſulisque glabris, foliis amplexicaulibus inciſis. *Sp.* 726. *n.* 7. *Gelr.* 298.
Papaver hortenſe ſemine nigro. *Baub. pin.* 170.
Zwarte-Heul of Slaap-bol. Belg.
In de Bouwlanden, tuſſchen 't Koorn, by Zwol, Uilenpas, *en elders.*
Pharm. PAPAVERIS NIGRI *ſem.*

NYMPHÆA.

lutea. 448. NYMPHÆA foliis cordatis integerrimis, calyce pentaphyllo majore. *Sp.* 729. *n.* 1. *Gelr.* 296. *Friſ.* 233.
Nymphæa lutea major. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 81.
Nymphæa lutea. *Dod. pempt.* 585. *Cam. epit.* 635.
Geele Plompen. Belg.
Geele Pompe bloemen. Groninganis.
β. Nymphæa lutea minor, magno flore. *Baub. pin.* 193. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 281.
Op veele plaatſen in ſtaande Wateren. β. *By* Oldbroek, *en in den* Ouden Yſſel *in* Gelderland; *ook by* Rotterdam, Gouda, Schoonhoven, Leerdam, *en elders.*
Pharm. NYMPHÆÆ LUTEÆ *flor.*

alba. 449. NYMPHÆA foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Sp.* 729. *n.* 2. *Gelr.* 297. *Friſ.* 234.
Nymphæa alba major. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 80.
Nymphæa alba. *Dod. pempt.* 585.

Wit-

Witte Plompen, *Water Roozen*, *Water-Plompen*, *Witte Water-Kruiken*, *Meirbladeren*. Belg.
Witte Pompe bloemen. Groninganis.
β. Nymphæa alba minor. *Baub. pin.* 193. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 773. *Comm. boll.* 81.
Leuconymphæa minor *Loerb. lugdb.* 1. *p.* 281.
Kleine witte Plompen. Belg.
By de voorgaande, *maar niet zo menigvuldig*. β. *Tuſſchen* Muiden *en* Naarden, *binnendyks in de Braaken*.
Pharm. Nymphææ albæ *rad. herb. flor.*

TILIA.

450. Tilia floribus nectario deſtitutis. *Sp.* 733. *n.* 1. *europaea.* *Gelr.* 301. *Friſ.* 235.
Tilia fœmina, folio majore. *Baub. pin.* 426. *Comm boll.* 110.
Oed. dan t. 553.
Lindeboom Wyfke. Belg.
β. Tilia mas, foliis ulmi. *Baub. pin.* 426. *Comm. boll.* 110
Lindeboom Manneke. Belg.
Op veele plaatſen aan de Wegen, *en in de Steden en Dorpen*.
Pharm. Tiliæ *flor.*

CISTUS.

451. Cistus herbaceus exſtipulatus, foliis oppoſitis lanceolatis trinerviis, racemis ebracteatis. *Sp.* 741. *n.* 22. *guttatus.*
Ciſtus flore pallido, macula nigro-ruffescente inſignito. *Baub. pin.* 465. *Comm. boll.* 27.
Helianthemum flore maculoſo. *Col. ecpbr.* 2. *p.* 78. *t.* 77.
Op Vlieland *by de Kerk*.
Primum ibi hæc rariſſima Belgii planta lecta a Cl. Breynio.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM.

452. Delphinium nectariis monophyllis, caule *Conſolida.* ſub-

ſubdiviſo. *Sp.* 748. *n.* 1. *Gelr.* 311.
Conſolida regalis arvenſis. *Bauh. pin.* 142. *Comm. boll.* 27.
Flos regius ſylveſtris. *Dod. pempt.* 252.
Wilde Ridderſpooren, Calketrip. Belg.
In de Koorn-velden, op ſommige plaatſen; veel te Maurik *in de* Betuwe.
Pharm. CALCATRIPPÆ ſ. CONSOLIDÆ REGALIS *herb. flor.*

PENTAGYNIA.

AQUILEGIA.

vulgaris. 453. AQUILEGIA nectariis incurvis *Sp.* 752. *n.* 1. *Gelr.* 312.
Aquilegia ſylveſtris. *Bauh. pin.* 144. *Comm. boll.* 12.
Aquileja. *Dod. pempt.* 180.
Wilde Aguiley of Akkeley. Belg.
In de Laan voor Uilenpas, *en in de Koorn-velden by* Utrecht.
Pharm. AQUILEGIÆ *flor ſem.*

HEXAGYNIA.

STRATIOTES.

Aloides. 454. STRATIOTES foliis enſiformi-triangulis ciliato-aculeatis. *Sp.* 754. *n.* 1. *Gelr.* 313. *Friſ.* 236.
Aloë paluſtris. *Bauh. pin.* 286. *Comm. boll.* 6.
Sedum aquatile ſ. Stratiotes potamicos. *Dod. pempt.* 588. & 589.
Oed. dan. t. 337.
Ruiters-kruid, Water-Ruiters, Krabben-Klauw. Belg.
Stikel-Kreuſen Groninganis.
Scheeren, Kaarten. Ruſticis.
Zeer gemeen in veele Slooten in de Betuwe *en in de Grift tuſſchen* Nymegen *en* Arnhem; *in den* Ouden Yſſel *by* Uilenpas; *in de Slooten by* Gouda; Oudewater, Haaſtrecht, Haarlem, *buiten* 's Hage

Digitized by Google

's Hage *langs den weg naar* Waſſenaar; *in de Graafſchappen* Cuilenburg, Leerdam, Buuren; *by* Wyk te Duurſtede, Veenendaal, Hardenbroek, Maarſen, Zuilen, Abcoude, Lopik, *en elders in de Proventie* Utrecht; *in de* Wouden *en op de* Kley *in* Friesland; *ook veel in de Provintie* Overysſel *en* Groningen, *en by* Zwartſluis *in* Drenthe.

Herba pabulo mixta remedium in Coryza equorum. (de Droes.)

POLYGYNIA.

ANEMONE.

455. ANEMONE pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. *Sp.* 759. *n.* 5. *Pulſatilla.*
Pulſatilla folio craſſiore & majore flore. *Baub pin.* 177. *Helw. pulſ.* 62. *t.* 8.
Pulſatilla. *Cam epit.* 398. *Dod. pempt.* 433.
Oed. dan. t. 153.
Wildemans-kruid. Belg.
Te Brunsberg *buiten* Zutphen; *en op den Paaſchheuvel by ter* Borch. (*Ill. Baro de* ROUWENOORT.)

456. ANEMONE ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro. *Sp.* 762. *n.* 15. *Gelr.* 314. *nemoroſa.*
Anemone nemoroſa, flore majore. *Baub. pin.* 176. *Comm. holl.* 10.
Anemone V. *Dod. pempt.* 435.
Oed dan. t. 549.
Boſch-Haanevoet. Belg.
Melk-wortel. Groninganis.
Wind-bloem. Vulgo.
β. Anemone nemoroſa, flore majore ex purpura rubente. *Baub. pin.* 176.
γ. Anemone nemoroſa, flore pleno albo. *Baub. pin.* 176.
Op ſchaduwachtige plaatſen buiten Harderwyk *omtrent* 's Heeren-Loo; *in de* Haarlemmer-Hout; *in 't* Haagſe-Boſch; *by* Mickelhorſt, Hemmen, Haren *buiten* Groningen; *en elders.*

ranunculoides. 457. ANEMONE ſeminibus acutis, foliolis inciſis, petalis ſubrotundis, caule ſubbifloro *Sp.* 762. *n.* 17. *Jngr.* 86. *Friſ.* 237.
Ranunculus nemoroſus luteus. *Baub. pin.* 178. *Comm. boll.* 96.
Ranunculus phragmites luteus nemoroſus. *Baub. biſt.* 3 *p.* 413.
Oed. dan. t. 140.
In den Aarden-hout *by* Haarlem *omtrent de plaats* Nuizenburg; *in 't* Haagſe-Boſch; *in* Friesland *omtrent* Franeker, Orangewoud *en* Klein Katlyk *op ſchaduwachtige plaatſen.*

CLEMATIS.

Vitalba. 458. CLEMATIS foliis pinnatis: foliolis cordatis ſcandentibus. *Sp.* 766. *n.* 8. *Gelr.* 315.
Clematis ſylveſtris latifolia. *Baub. pin.* 300.
Vitalba. *Dod pempt.* 405.
Lynen. Belg.
Overvloedig te Perſingen *by* Nymegen; *in de Heggen te* Bronkhorſt *in 't Graafſchap* Zutphen; *aan den* Yſel-dyk *by* Terwolde *op de* Veluwe; *en in de* Herkeloer-waart *in* Overyſſel.

THALICTRUM.

foetidum. 459. THALICTRUM caule paniculato filiformi ramoſiſſimo. *Sp.* 768. *n.* 2.
Thalictrum minimum foetidiſſimum. *Baub. pin.* 337. *prodr.* 147. *Baub. biſt.* 3. *p.* 488. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 325. *ſ.* 9. *t.* 20. *f.* 13.
Agter het Jooden Kerkhof by 's Gravenhage. (*Cel.* SCHWENCKE.)

minus. 460. THALICTRUM foliis ſexpartitis, floribus cernuis. *Sp.* 769. *n.* 6. *Gelr* 625.
Thalictrum minus. *Baub. pin.* 337. *Dod. pempt.* 58.
Thalictrum alpinum minus ſaxatile, rutæ folio, ſtaminibus luteis. *Segu. ver.* 476. *t.* 11.
In de Salker-waart *by* Campen, *en de Weiden langs den* Yſel *by* Zutphen; *overvloedig by den* Steenoven *aldaar.*

flavum. 461. THALICTRUM caule folioſo ſulcato, panicula

mul-

multiplici erecta. *Sp.* 770. *n.* 10. *Gelr.* 316. *Friſ.* 238.
Thalictrum majus, ſiliqua angulosa aut ſtriata. *Baub. pin.* 336. *Comm. boll.* 109.
Thalictrum magnum. *Dod. pempt.* 58.
Water-Ruit, Poel-Ruit, Heilblad, Valſcb-Rbabarber. Belg.
Te Eghteld *in de* Betuwe *aan den voet van den Dyk; by* Harderwyk *in de* Ooſter-Mehen, *aan 't einde van de* Weyſteeg, *en aan de booge* Sypel *over de eerſte Moolen; buiten* Wageningen *aan den Dyk by de Tol-boom; aan den Weg tuſſcben* Diemen *en* Abkoude; *in de Weilanden aan de* Muider-Dyk; *aan de Kaade buiten de Leuter-poort te* Wyk by Duurſteede; *in* Friesland *tuſſcben* Tjetjerk, *en 't* Huis ter Heide, *en elders in de* Wouden *aan de kanten der Slooten en Wegen, en in ſommige Boſſcben; ook in de* Salkerwaart.

ADONIS.

462. ADONIS floribus pentapetalis, fructibus ovatis. *Sp.* 771. *n.* 1. *aeſtivalis.*
Adonis ſylveſtris, flore phoeniceo, ejusque foliis longioribus. *Baub. pin.* 178. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 35.
Adonis flore pallido. *Cam. epit.* 648.
Adonis-bloem, Bruinettekens. Belg.
Komt van zelf voort onder bet Koorn.

RANUNCULUS.

463. RANUNCULUS foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Sp.* 773. *n.* 1. *Gelr.* 317. *Friſ.* 239. *Flammula.*
Ranunculus longifolius paluſtris minor. *Baub. pin.* 186. *Comm. boll.* 96.
Flammula Ranunculus. *Dod. pempt.* 432.
Oed. dan. t. 572.
Keine Egel-Koolen. Belg.
Egel-gras. Ruſticis.
In vocbtige Wei-landen, en Moeraſſige plaatſen.
Ruricolæ Gelriæ adfirmant oves ex eſu bujus plantæ bydropicos (gellig) *fieri & exinde mori; minus autem boves adfici.*

Digitized by Google

Lingua. 464. RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule erecto. *Sp.* 773. *n.* 3. *Gelr.* 318. *Friſ.* 240.
Ranunculus longifolius paluſtris major. *Baub. pin.* 34. *Comm. boll.* 96.
Lingua Plinii. *Dalecb. biſt.* 1037.
Egel - Koolen. Belg.
In de Slooten te Perſingen, Ommeren, Ryswyk *in de* Betuwe; *in de Kolken aan den* Ouden Yſſel; *in de Slooten by* Buuren; *en in die van de* Sillik *by* Haarlem; *in de Graften van 't Huis te* Brederode; *in de Slooten by* Utrecht; *in moeraſſige en laage landen omtrent* Tjetjerk, Bergum *en* Auguſtinisga *in* Friesland; *in de Slooten en Griften tuſſchen* Deventer *en* Zwol; *ook op verſcheide plaatſen in de Provintie* Groningen *en* Omlanden.

Ficaria. 465. RANUNCULUS foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. *Sp.* 774. *n.* 9. *Gelr.* 319. *Jngr.* 88. *Friſ.* 241.
Chelidonia rotundifolia minor. *Baub. pin.* 309. *Comm. boll.* 25.
Chelidonium minus. *Fuchſ. biſt.* 866. *Dod. pempt.* 49.
Oed. dan. t. 499.
Speen - kruid, Kleine Gouwe. Belg.
Haane - klootjes. Arnhemienſibus.
β. Chelidonia rotundifolia minor, folio maculoſo. *Baub pin.* 309.
γ. Chelidonia rotundifolia major *Baub. prodr.* 137.
δ. Chelidonium minus, flore pleno. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 29.
Overvloedig op vochtige ſchaduwachtige plaatſen, in de Boſſchen, Hoven, en onder de Heggen.
Pharm. CHELIDONII MINORIS. *rad. berb.*
Varietati γ. Perianthium frequentiſſime pentaphyllum, atque cauliculi ramoſi. BOERH.

ſceleratus. 466. RANUNCULUS foliis inferioribus palmatis: ſummis digitatis, fructibus oblongis. *Sp.* 776. *n.* 15. *Gelr.* 320. *Friſ.* 242.
Ranunculus paluſtris, apii folio lævis. *Baub. pin.* 180. *Comm. boll.* 96.
Ranunculus ſylveſtris. *Dod. pempt.* 426.
Oed. dan. t. 570.

Wa-

Digitized by Google

Water-Haanevoet. Belg.
Jeuk-kruid. Ruſticis.
Overvloedig in Slooten, ſtilſtaande Wateren, en vochtige Wei-landen.
In partibus nudis, quas attingit, pruritum concitat, easque exulcerat.

467. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto multifloro, foliis compoſitis. *Sp.* 778. *n.* 25. *Gelr* 322. *bulboſus.*
Ranunculus pratenſis, radice verticilli modo rotunda. *Baub. pin.* 179. *Comm. boll* 95.
Ranunculus tuberoſus. *Dod. pempt.* 431.
Oed. dan. t. 551.
St. Anthonis Raapje. Belg.
In de Velden langs den Yſſel, *en op 't Bergje in de groote Laan by den* Haarlemmer-Hout.

468. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, ſtolonibus repentibus, foliis compoſitis. *Sp.* 779. *n.* 26. *Gelr.* 323. *Friſ.* 243. *repens.*
Ranunculus pratenſis repens hirſutus. *Baub. pin.* 179. *Comm boll.* 95.
Ranunculus hortenſis. 1. *Dod. pempt.* 425.
Kruipend-Haanevoet of Haanepoot. Belg.
β. Ranunculus pratenſis erectus dulcis. *Baub. pin.* 179. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 31.
γ. Ranunculus hortenſus inclinatus. *Baub. pin.* 179. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 31.
Ranunculus repens, flore pleno. *Baub. biſt.* 3. *p.* 420.
In de Hoven en Velden op ſchaduwachtige plaatſen.

469. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Sp.* 779. *n.* 27. *polyanthemos.*
Ranunculus polyanthemus ſimplex. *Lob. ic.* 666. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 31. *n.* 10.
Ranunculus ſylveſtris. *Tabern. ic.* 42. *biſt.* 117.
In vette Weiden in de Betuwe.
Facile confunditur cum ſequente.

470. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis: ſummis *acris.*

linearibus. *Sp.* 779. *n.* 28. *Gelr.* 324. *Jngr.* 89. *Friſ.* 244.
Ranunculus pratenſis erectus acris. *Bauh. pin.* 178. *Comm. holl.* 95.
Ranunculus hortenſis. 2. *Dod. pempt.* 426.
Veld-Haanevoet of *Haanepoot*, *Boter-bloem.* Belg.

β. Ranunculus pratenſis erectus acris, in folii medio maculatus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 30.

γ. Rununculus hortenſis erectus, flore pleno. *Bauh. pin.* 179. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 31.
Overvloedig in de Wei-landen. γ. te Zutphen, *buiten de Nieuwſtads-poort.*

lanuginoſus. 471. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirſutis, foliis trifidis lobatis crenatis holoſericeis. *Sp.* 779. *n.* 9.
Ranunculus magnus valde hirſutus, flore luteo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 417. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 31. *n.* 8.
Oed. dan. t. 397.
† *Volgens* BOERHAAVE.

arvenſis. 472. RANUNCULUS ſeminibus aculeatis, foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus. *Sp.* 780. *n.* 31. *Gelr.* 321. *Friſ.* 245.
Ranunculus arvenſis echinatus. *Bauh. pin.* 179. *Comm. holl.* 95.
Ranunculus ſylveſtris. 3. *Dod. pempt.* 427.
Oed. dan. t. 219.
Akker-Haanevoet. Belg.
In de Zaai-landen en Koorn-akkers.

muricatus. 473. RANUNCULUS ſeminibus aculeatis, foliis ſimplicibus lobatis obtuſis glabris, caule diffuſo. *Sp.* 783. *n.* 32. *Friſ.* 246.
Ranunculus paluſtris echinatus. *Bauh. pin.* 180. *prodr.* 95. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 842.
In Friesland *het meeſte op de Kley in laagtens, en aan uitwateringen* (MEESE.)

parviflorus 474. RANUNCULUS ſeminibus muricatis, caule diffuſo. *Sp.* 780. *n.* 33.
Ranunculus hirſutus annuus, flore minimo. *Raj. angl.* 3. *p.* 248. *t.* 12. *f.* 1. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 31. *n.* 15.

Digitized by Google

Ranunculus arvenſis annuus hirſutus, flore omnium minimo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 440. *ſ.* 4. *t.* 28. *f.* 21.

† *Volgens* BOERHAAVE.

475. RANUNCULUS foliis ſubrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *Sp.* 781. *n.* 37. *Gelr.* 325. *hederaceus.*

Ranunculus aquaticus hederaceus luteus. *Baub. pin.* 180. *Comm. holl.* 96. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 441. *ſ.* 4. *t.* 29. *f.* 29.

Oed. dan. t. 321.

In een Beekje aan de laage Sypel *by* Harderwyk; *aan de Duinkant in ſtilſtaande ondiepe Wateren, by den* Aardenhout *buiten* Haarlem; *in de Slooten by* Groningen.

Corolla huic eſt alba, non lutea, ut C. Baubini ſynonymum dictitat.

476. RANUNCULUS foliis ſubmerſis capillaceis, emerſis peltatis. *Sp.* 781. *n.* 38. *Friſ.* 247. *aquatilis.*

α. Ranunculus foliis inferioribus capillaceis, ſuperioribus peltatis. *Linn. lapp.* 234. *Gelr.* 326.

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis imis capillaribus, ſupremis reniformibus orbicularibus palmatis. *Hall. hiſt.* 1163.

Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo. *Baub. pin.* 180. *Comm. holl.* 96.

Ranunculus aquatilis. *Dod. pempt.* 587.

Oed. dan. t 376.

β. Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumſcriptione rotundis. *Linn. h. Cliff.* 231. *Gelr.* 327.

Millefolium aquaticum cornutum majus. *Baub. pin.* 141.

Millefolium aquaticum cornutum. *Baub. prodr.* 72. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 784. *quoad iconem. Comm. holl.* 76.

γ. Ranunculus caule fluitante, petiolis unifloris, foliis capillaribus, laciniis divergentibus. *Hall. hiſt.* 1162.

Ranunculus aquatilis omnino. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 781.

Ranunculus trichophyllos aquaticus medio luteus. *Col. ecphr.* 1. *p.* 315. *t.* 316.

Millefolium aquaticum, foliis abrotani, ranunculi flore & capitulo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.

δ. Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumſcriptione oblongis. *Roy. lugdb.* 492. *Gelr.* 328.

Ranunculus caule fluitante, petiolis unifloris, foliis capillaceis longiſſimis, laciniis parallelis. *Hall. biſt.* 1161.

Ranunculo ſ. Polyanthemo aquatili albo affine Millefolium maratriphyllum fluitans. *Baub. biſt.* 3. *p.* 782.

Millefolium aquaticum, foliis foeniculi, ranunculi flore & capitulo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.

α. Overvloedig in de Graften en Slooten om Harderwyk; *aan de Duinkant in ſtilſtaande ondiepe Wateren by den* Aardenhout; *en in de Slooten aan den Ooſterweg te* Haren *en* Hemmen *buiten* Groningen. *β. Op veele plaatſen in de Vyvers. γ. In de Beekjes by* Hoophuiſen *omtrent* Harderwyk, *en langs de Duinkant. δ. In den* Yſſel *op verſcheide plaatſen, en overvloedig in de Rivier 't* Spaarne *op den inbam by 't Huis te* Heemſtede.

Ill. HALLERUS *varietates has pro diſtinctis ſpeciebus habet, ſed Cel.* LUDWIG (*Epiſt. erud. ad Hall. vol.* II. *p.* 165.) *recte monet folia ſuperiora ſubrotunda, ſi ſub aquis immerſa manent, capillacea fieri, ſi vero rapido flumine feruntur, ita elongari, ut peucedani foliis ſimilia ſint. Millefolium aquaticum cornutum Baub. bis occurrit in hoc Elencho, quippe quo ad deſcriptionem & iconem. Baub. prodr.* 73. *t.* 73. *eſt hujus plantæ varietas. β. Quo ad deſcriptionem vero Baub. biſt. eſt Ceratophyllum demerſum.*

C A L T H A.

paluſtris. 477. CALTHA. *Sp.* 784. *n.* 1. *Gelr.* 329. *Friſ.* 248.

Caltha paluſtris, flore ſimplici. *Baub. pin.* 276. *Comm. boll.* 19.

Caltha paluſtris. *Dod. pempt.* 598.

Boter-bloem, Dotter-Bloem. Belg.

Kleine Pompe-bloemen. Groninganis.

Veel

Digitized by Google

Veel in vochtige Wei-landen in de Betuwe, *en omtrent* Harderwyk, 's Hage, Amſterdam, Haarlem, Utrecht, Leeuwaarden, Zwol; *in de* Bergermeer *by* Alkmaar; *in 't* Gorecht *by* Groningen.

Petalorum numerus in hac planta inconſtans, frequentiſſime 5 adſunt, rarius 6 vel 7. rariſſime 8.

Digitized by Google

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

AJUGA.

reptans. 478. AJUGA glabra, ſtolonibus reptantibus. *Sp.* 785. *n.* 4. *Gelr.* 330. *Friſ.* 249.
Conſolida media pratenſis cærulea. *Baub. pin.* 260. *Comm. holl* 27.
Bugula. *Dod. pempt.* 135.
Zenegroen, *Ingroen.* Belg.
Veel in de Wei-landen; in de pannen en laagtens der Duinen; en ook by de Wegen.
Pharm. BUGULÆ *herb. flor.*
Variat interdum corollâ albâ & carneâ.

TEUCRIUM.

Scorodonia. 479. TEUCRIUM. foliis cordatis ſerratis petiolatis, racemis lateralibus ſecundis, caule erecto. *Sp.* 789. *n.* 18. *Gelr.*.
Scordium alterum, ſive Salvia agreſtis. *Baub. pin.* 247. *Comm. holl.* 103.
Salvia agreſtis ſive Sphacelus. *Dod. pempt.* 291.
Oed. dan. t. 485.
Wilde-Salie. Belg.
Op zandige plaatſen omtrent Uilenpas, Arnhem, Bilioen, Harderwyk, *en elders in* Gelderland; *Overvloedig in de Duinen by* 's Hage, Raaphorſt, Ben-

Bennenbroek, Heemſtede, Hillegom, Wyk op Zee, *agter den* Ardenhout *en by* Hartecamp *buiten* Haarlem; *aan den Weg tuſſchen* Liſſe *en de* Leidſche-Vaart; *ook omtrent* Zwol, *en aan den Berg by* Amerongen *in 't Sticht van* Utrecht.
Pharm. SALVIÆ AGRESTIS *herb.*

480. TEUCRIUM foliis oblongis ſeſſilibus dentato-ſerratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuſo. *Sp.* 790. *n.* 20. *Scordium.*
Scordium. *Baub. pin.* 247. *Cam. epit.* 588. *Dod. pempt.* 126. *Comm. boll.* 103.
Oed. dan. t. 593.
Water-Look. Belg.
Aan de Slooten in 't Graafſchap Zutphen *omtrent* Zevenar; *en in de vochtige Duin-Valeyen tuſſchen de* Sillik *en 't Dorp* Liſſe.
Pharm. SCORDII *herb.*

481. TEUCRIUM foliis cuneiformi-ovatis inciſis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus ſubpiloſis. *Sp.* 790. *n.* 22. *Friſ.* 250. *Chamædrys*
Chamædrys major repens. *Baub. pin.* 248. *Dod. pempt.* 43. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 422. *ſ.* 11. *t.* 22. *f.* 11. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 182.
Gamander, Bathengel. Belg.
β. Chamædrys minor repens. *Baub. pin.* 248. *Dod. pempt.* 43. *Comm. holl.* 24. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 422. *ſ.* 11. *t.* 22. *f.* 12.
In 't Haagſe-Boſch, *en in* Friesland *by* Bergum, Heerenveen, Dragten, &c. *op Heide-velden, en in zommige Boſſchen.*
Pharm. CHAMÆDRYOS *herb.*

HYSSOPUS.

482. HYSSOPUS ſpicis ſecundis, foliis lanceolatis. *Sp.* 796. *n.* 1. *Gelr.* 335. *officinalis.*
Hyſſopus officinarum cærulea ſeu ſpicata. *Baub. pin.* 217.
Hyſſopus vulgaris. *Dod. pempt.* 287.
Yzoop. Belg.
Te Harderwyk *op de muur van 't Choor der vervallen Broederen-Kerk, en eertyds op de muur van 't Huis*

te

te Bronkhorſt *in 't Graafſchap* Zutphen.
Pharm. Hyssopi *herb.*
Qui viderit binis illis in locis magna in copia e muris creſcentem hanc plantam, vix dubitaret eam eſſe veram Hyſſopum Hebræorum. Conf. Eph. Nat. Cur. Vol. 1. *Obſ.* DXX. *niſi obſtaret obſervatio Cl.* Fr. Hasselquist *de Bryo truncatulo. Linn. Suec.* 2. 1001.

N E P E T A.

Cataria. 483. Nepeta floribus ſpicatis: verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis. *Sp.* 796. *n.* 1.
Mentha cataria vulgaris & major. *Baub. pin.* 220. *Comm. boll.* 74.
Cataria herba. *Dod. pempt.* 99.
Oed. dan. t. 580.
Katte-kruid, Nipt. Belg.
In de Duinen by Overveen, *en groeit ook van zelf in de Zaai-landen en Hoven.*
Pharm. Nepetæ *herb.*

S I D E R I T I S.

hirſuta. 484. Sideritis foliis lanceolatis obtuſis dentatis piloſis, bracteis dentato-ſpinoſis, caulibus hirtis decumbentibus. *Sp.* 803. *n.* 10.
Sideritis hirſuta procumbens. *Baub. pin.* 233. *Comm. boll.* 105.
Herba judaica. *Dod. pempt.* 93.
Glis-kruid. Belg.
By de Wegen en Paden.

M E N T H A.

ſylveſtris. 485. Mentha. ſpicis oblongis tomentoſis ſerratis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Sp.* 804. *n.* 1. *Gelr.* 341.
Mentha ſylveſtris folio longiore. *Baub. pin.* 227. *Comm. boll.* 74. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 368. *ſ.* 11. *t.* 6. *f.* 6.
Oed. dan. t. 484.
Wilde Munte. Belg.
Aan de kanten der Zaai-landen op veele plaatſen.

Pharm.

Digitized by Google

Pharm. MENTHÆ SYLVESTRIS *herb.*

486. MENTHA ſpicis oblongis, foliis ſubrotundis rugoſis crenatis ſeſſilibus: *Sp.* 805. *n.* 3. *rotundifolia.*
Mentha ſylveſtris, rotundiore folio. *Baub. pin.* 227.
Menthaſtrum, folio rugoſo rotundiore, ſpontaneum, flore ſpicato odore gravi. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 219.
In de laage vochtige pannen der Duinen buiten 's Hage (*Cel.* SCHWENCKE.)

487. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Sp.* 805. *n.* 3. *Gelr.* 342. *Friſ.* 251. *aquatica.*
Mentha rotundifolia paluſtris, ſeu aquatica major. *Baub. pin.* 227. *Comm. holl.* 73. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 370. *ſ.* 11. *t.* 7. *f.* 6.
Water-Munte, Bruin-heilig. Belg.
Aan de kanten der Slooten en Graften, en in vochtige Duin-Valeyen.
Pharm. MENTHÆ AQUATICÆ *herb.*

488. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ſerratis, ſtaminibus corollam æquantibus. *Sp.* 806. *n.* 9. *Gelr.* 343. *Friſ.* 252. *arvenſis.*
Mentha paluſtris, folio oblongo. *C. B. Comm. holl.* 73.
Mentha arvenſis verticillata hirſuta. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 217. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 369. *ſ.* 11. *t.* 7. *f.* 5.
Calamintha arvenſis verticillata. *Baub. pin.* 229.
Oed. dan. t. 512.
Veld-Munte. Belg.
Kruis en Munt. Groninganis.
Aan de Slooten by Uilenpas, Zwol, Campen; *aan de Duinkant van* Holland; *in* Friesland *op de* Kley *en in de* Wouden *overvloedig aan de Wegen, en kanten van Koorn-landen, op dykjes en aan ruige Wallen, en aan Slooten; ook in de Koorn-landen en boven van 't* Goreght *buiten* Groningen.

489. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, caulibus ſubteretibus re- *Pulegium.*

Digitized by Google

pentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Sp.* 807. *n.* 12. *Gelr.* 344.
Pulegium latifolium. *Baub. pin.* 222.
Pulegium. *Fuchſ. biſt.* 199. *Dod. pempt.* 282.
Poley. Belg.
Op vochtige plaatſen aan de Waal *by* Wamel *over* Thiel; *en in de* Thieler-waard; *omtrent den* Yſſel *by* Gorſel, Uilenpas, *en elders in 't Graafſchap* Zutphen; *ook by* Salk *in* Overyſſel.
Pharm. PULEGII LATIFOLII *herb.*

GLECOMA.

hederacea. 490. GLECOMA foliis reniformibus crenatis. *Sp.* 807. *n.* 1. *Gelr.* 338. *Ingr.* 92. *Friſ.* 253.
Hedera terreſtris vulgaris. *Baub. pin.* 306. *Comm holl.* 57. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 409. *ſ.* 11. *t.* 21. *f.* 1.
Hondsdraf, Aard-Veil, Onder-have. Belg.
Kruip door den tuin. Hortulanis.
β. Hedera terreſtris minor & elegantior. *Baub. pin.* 306. *Comm. holl.* 57.
Klein Hondsdraf. Belg.
Overvloedig langs de wegen en paden. β. *Op vochtige gronden omtrent oude boomen.*
Pharm. HEDERÆ TERRESTRIS *herb.*

LAMIUM.

Oryala. 491. LAMIUM foliis cordatis inæqualiter arguteque ſerratis, corollis fauce inflata, calycibus coloratis. *Sp.* 808. *n.* 1.
Lamium maximum ſylvaticum alterum. *Baub. pin.* 231.
Galeopſis maxima pannonica. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 35.
In de Salker-waart *in* Overyſſel.

lævigatum. 492. LAMIUM foliis cordatis rugoſis, caule lævi, calycibus glabris longitudine corollæ. *Sp.* 808. *n.* 3.
Lamium purpureum non foetens, folio oblongo. *Baub. pin.* 231. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 157.
Galeopſis flore purpuraſcente majore, folio non maculato. *Baub. biſt.* 3. *p.* 321.
† *Volgens* BOERHAAVE.

album. 493. LAMIUM foliis cordatis acuminatis ſerratis peti-

tiolatis, verticillis vigintifloris. *Sp.* 809. *n.* 5. *Gelr.* 307. *Friſ.* 254.
Lamium album non foetens, folio oblongo. *Baub. pin.* 251. *Comm. holl.* 63.
Urtica iners ſive Lamium primum. *Dod. pempt.* 153.
Oed. dan. t. 594.
Doove Netelen, Honds-Netelen. Belg.
Suiker-Netel. Buuranis.
Melk-bloem. Weſtfriſiis.
β. Lamium urticæ folio, flore purpureo ſpicato. *Comm. holl.* 63.
By de Wegen en in de Hoven. β. op het Kraaijeneſt *langs den weg naar* Heemſtede, *en om* Utrecht.
Pharm. Urticæ mortuæ *herb. flor.*

494. Lamium foliis cordatis obtuſis petiolatis. *Sp.* 809. *n.* 6. *Gelr.* 346. *Jngr.* 93. *Friſ.* 255. *purpureum*
Lamium purpureum fœtidum, folio ſubrotundo, ſive Galeopſis. dioſcoridis. *Baub. pin.* 230. *Comm holl.* 62.
Urtica iners altera. *Dod. pempt.* 153.
Oed. dan. t. 523.
Stinkende Doove Netelen. Belg.
β. Lamium purpureum fœtidum, folio ſubrotundo minus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 157.
γ. Lamium album fœtidum, folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 251. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 157.
δ. Lamium album fœtidum, folio ſubrotundo minus. *pin.* 251. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 157.
By de Wegen, en in de Hoven.

495. Lamium foliis floralibus ſeſſilibus amplexicaulibus obtuſis. *Sp.* 809. *n.* 7. *Gelr.* 345. *Friſ.* 256. *amplexicaule.*
Lamium, folio caulem ambiente, minus. *Baub. pin.* 232. *Comm. holl.* 63.
Morſus gallinæ, folio hederulæ, alter. *Lob. ic.* 463.
Hoender-beet. Belg.
β. Lamium, foliis caulem ambientibus, majus. *Baub. pin.* 232. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 158.
In de Zaay-landen en Moeshoven; veel by Arnhem.

GALEOPSIS.

496. Galeopsis internodiis caulinis æqualibus; *Ladanum.*
ver-

verticillis omnibus remotis, calycibus inermibus. *Sp.* 810. *n.* 1. *Gelr.* 348. *Friſ.* 257.
Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra. *Baub. pin* 232.
Ladanum ſegetum, flore rubro quorundam. *Baub. biſt.* 3. *p.* 855.
Op de Akkers langs de Duinen, en in de Koornvelden op verſcheide plaatſen.

Tetrahit. 497. GALEOPSIS internodiis caulinis ſuperne incraſſatis, verticillis ſummis ſubcontiguis, calycibus ſubpungentibus. *Sp.* 810. *n.* 2. *Gelr.* 349. *Friſ.* 258.
β. Cannabina flore purpuraſcente. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 159.
Cannabis ſylveſtris quorundam urticæ inerti affinis. *Baub. biſt.* 3. *p.* 854.
Urtica aculeata, foliis ſerratis. *Baub. pin.* 232. *Comm. boll.* 116.
γ. Cannabina flore albo. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 159.
δ. Galeopſis corolla flava: labio inferiore maculato. *Linn. lapp.* 193.
Cannabina flore magno luteo, labiis purpureis. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 159.
Urtica aculeata, foliis ſerratis altera. *Baub. pin.* 232. *Comm. boll.* 117.
Urtica mortua quarta. *Dod. pempt.* 153.
Geele Doove Netelen, Leeuwebekken. Groninganis.
In de Koorn-landen. β. *Buiten* Haarlem, *aan de Duinkant, en by* Zwol. γ. *& δ. veel by* Utrecht, Harderwyk, Zwol, *in 't* Haagſe-Boſch; *in de* Wouden *in* Friesland; *aan de dykjes by* Haren *buiten* Groningen; *en elders.*

Galeobdolon. 498. GALEOPSIS verticillis ſexfloris: involucro tetraphyllo. *Sp.* 810. *n.* 3. *Gelr.* 354.
Galeopſis ſ. Urtica iners, flore luteo. *Baub. biſt.* 3. *p.* 323. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 162.
Lamium folio oblongo luteum. *Baub. pin.* 231.
In de Boſſchadien by Uilenpas, Zwol, *in* Friesland *by* Bergum; *en in* 't Haagſe-Boſch.

STACHYS.

ſylvatica. 499. STACHYS verticillis ſexfloris, foliis cordatis pe-

Digitized by Google

petiolatis *Sp.* 811. *n.* 1. *Gelr.* 350. *Friſ.* 259.
Lamium maximum ſylvaticum foetidum. *Baub. pin.* 231.
Urtica heraclea. *Tabern. ic.* 536.
In 't Boſcb van Ouden-Aller *op de* Veluwe; *in 't* Haagſe-Boſch; *in Boſcben en aan ruige Wallen, en aan de Wegen omtrent* Dragten, Oudega *en* Rotteval *in* Friesland; *te* Zwol *op de Wal; in de* Salkerwaart; *op den Dyk naar* Paterwolde, *by de* Mickelhorſt, *en elders buiten* Groningen; *en op veele andere plaatſen in de Boſcben en Heggen.*

500. STACHYS verticillis ſubſexfloris, foliis lineari-lanceolatis ſemiamplexi caulibus ſeſſilibus. *Sp.* 811. *n.* 2. *Gelr.* 351. *Friſ.* 260. *paluſtris.*
Stachys paluſtris foetida. *Baub. pin.* 236.
Stachys aquatica. *Tabern. ic.* 577.
Aan de kanten der Slooten by 's Hage, Zandhorſt; *op veele plaatſen in* Friesland; *aan de Griften tuſſcben* Deventer *en* Zwol; *in 't Veenland by 't* Cluvings-boſch *in 't Landſcbap* Drenthe.

501. STACHYS verticillis ſexfloris, foliis obtuſis nudiusculis, corollis longitudine calycis, caule debili. *Sp.* 814. *n.* 11. (*Gelr.* 339.) *arvenſis.*
Sideritis alſines trixaginis folio. *Baub. pin.* 233. *prodr.* 111.
Oed. dan. t. 587.
β. Lamium paludoſum belgicum, meliſſæ folio. *Herm. lugdb.* 351. *t.* 353.
In een Koorn-land by Marquette; *in 't Zand achter den* Kranenborgh, *en in de Hoven by* Zwol.

BALLOTA.

502. BALLOTA foliis cordatis indiviſis ſerratis, calycibus acuminatis. *Sp.* 814. *n.* 1. *Gelr.* 352. *Friſ.* 261. *nigra.*
Ballote ſ. Marrubium nigrum. *Dod. pempt.* 90.
Marrubium nigrum foetidum. *Baub. pin.* 230. *Comm. boll.* 72.
Zwarte Mulrove, Stinkende Andoorn. Belg.
Veel by de wegen en op ruwe plaatſen omtrent Harderwyk, Muiderberg, 's Hage, Utrecht, Zwol;

in Friesland *omtrent* Sumeer, Bergum, Gorradyk, *en elders.*

alba. 503. BALLOTA foliis cordatis indiviſis ſerratis, calycibus ſubtruncatis. *Sp.* 814 *n.* 2.
Ballote flore albo. *Tourn. inſt.* 185. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 175
Ballote. *Cam. epit.* 572.
† *Volgens* BOERHAAVE.

MARRUBIUM.

vulgare. 504. MARRUBIUM dentibus calycinis ſetaceis uncinatis. *Sp.* 816. *n.* 5. *Gelr.* 353.
Marrubium album vulgare. *Baub. pin.* 230. *Comm. boll.* 72. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 376. *ſ.* 11. *t.* 9. *f.* 1.
Malrove, Witte Andoorn. Belg.
Tuſſchen Maas *en* Waal *over* Tiel; *op verſcheide plaatſen buiten* Zutphen, *en in de Duinen; aan de Weg tuſſchen* Rotterdam *en* Schiedam; *en tuſſchen* Deventer *en* Twello.
Pharm. MARRUBII *herb.*

LEONURUS.

Cardiaca. 505 LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Sp.* 817. *n.* 1. *Gelr.* 355.
Marrubium Cardiaca dictum. *Baub. pin.* 230. *Comm. boll.* 72. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 378. *ſ.* 11. *t.* 9. *f.* 18.
Herts-geſpan. Belg.
Op Steenachtige ruwe plaatſen, en by de Wegen.

ORIGANUM.

vulgare. 506. ORIGANUM ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Sp.* 824. *n.* 7. *Gelr.* 335.
Origanum ſylveſtre. *Baub. pin.* 223. *Dod. pempt.* 285.
Wilde Orego, Wilde Majolein. Belg.
Overvloedig tuſſchen Nymegen *en* Gend; *tuſſchen* Zutphen *en* Doesburg; *by 't Dorp* Voorſt *op de* Veluwe; *aan den* Rhyndyk *in de* Betuwe; *in de Duinen achter* Zorgvliet; *aan de Wegen om* Wyk

by

Digitized by Google

by Duurſtede; *in de* Herkeloer - *en* Salker - Waart; *en elders*.

Pharm. ORIGANI VULGARIS *herb*.

THYMUS.

507. THYMUS floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis. *Sp.* 825. *n.* 1. *Gelr.* 332 *Friſ.* 262. *Serpyllum.*

Serpyllum vulgare minus. *Baub. pin.* 220. *Comm. boll.* 105.

Serpyllum vulgare. *Dod. pempt.* 277.

Quendel, *Wilde Thym.* Belg.

β. Serpyllum vulgare, flore albo. *Tourn. inſt.* 197.

Op zandige dorre gronden en Hei - velden in't Graafſcbap Zutphen; *op de* Veluwe; *te* Wamel *over* Tiel; *buiten* 's Hage, Haarlem, Rhenen, Zwol; *in* Friesland *omtrent* Bergum, Heerenveen, *en andere Woud plaatſen; buiten* Groningen *by* Harender - Moolen, &c. *β. Op de Heide by* Elspeet, *en in de Laan voor* Uilenpas.

Pharm. SERPILLI *herb*.

508. THYMUS floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis. *Sp.* 826 *n* 4. *Gelr.* 333. *Friſ.* 263. *Acinos.*

Clinopodium arvenſe ocymi facie. *Baub. pin.* 225.

Acinos multis *Baub. hiſt.* 3. *p* 295.

Op zandige plaatſen omtrent den Ouden - Yſſel *in 't Graafſcbap* Zutphen; *in de Duinen niet verre van* Weſterhout, *en by* Overveen; *in* Friesland *op verſcbeide plaatſen op bezaaide en beplante gronden; in de* Herkeloerſteeg *in* Overyſſel.

MELISSA.

509 MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus, caule adſcendente hirſuto. *Sp* 828. *n.* 4. *Gelr.* 337. *Nepeta.*

Calamintha pulegii odore. *Baub. pin* 228 *Comm. boll.* 19.

Pulegium ſylveſtre, ſive Calamintha altera. *Dod. pempt.* 98.

Wilde Poley. Belg.

Veel in braakleggende Koorn - velden by Uilenpas, U-

Utrecht, *de* Bilt, Zeiſt; *in de Duinen buiten* 's Hage, *en aan de Weg in 't groot* Bentveld *by* Haarlem, *en elders.*

SCUTELLARIA.

galericulata 510. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Sp.* 835. *n.* 5. *Gelr.* 357. *Friſ.* 264.

Lyſimachia cærulea galericulata, vel Gratiola cærulea. *Baub. pin.* 246. *Comm. boll.* 71.

Lyſimachia galericulata. *Dalech. biſt.* 1060.

Glid-kruid. Belg.

β. Caſſida paluſtris vulgatior, flore albo. *Tourn. inſt.* 182. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 177.

By de wegen en paden, veel aan de Sypel *by* Harderwyk, *en op* Princen-Loo; *in de Duin-valeyen achter* Zorgvliet; *in* Friesland *by* Langweer *en* Orange-woud; *aan de dykjes by* Haren *buiten* Groningen.

PRUNELLA.

vulgaris. 511. PRUNELLA foliis omnibus ovato-oblongis ſerratis petiolatis. *Sp.* 837. *n.* 1. *Gelr.* 356. *Friſ.* 265.

Brunella major, folio non diſſecto. *Baub. pin.* 260. *Comm. boll.* 17.

Brunella. *Dod. pempt.* 136.

Brinelle. Belg.

β. Brunella major, folio non diſſecto, flore albo. *Baub. pin.* 261. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 169.

In de Velden en Wei-landen.

Pharm. BRUNELLÆ *berb.*

laciniata. 512. PRUNELLA foliis ovato-oblongis petiolatis: ſupremis quatuor lanceolatis dentatis. *Sp.* 837. *n.* 2.

Brunella folio laciniato. *Baub. pin.* 261. *Comm. boll.* 17.

Brunella II non vulgaris. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 43.

Bentveld-kruid. Vulgo.

In bet Bent-veld *buiten* Haarlem.

Digitized by Google

ANGIOSPERMIA.

RHINANTHUS.

513. RHINANTHUS corollis labio ſuperiore compreſſo breviore. *Sp.* 840. *n.* 3. *Gelr.* 361. *Friſ.* 266. *Criſta galli.*

Pedicularis pratenſis lutea, vel Criſta galli. *Baub. pin.* 163. *Comm. boll.* 86. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 426. *ſ.* 11. *t.* 23. *f.* 1.

Geele Ratelen of Haane-Kammen. Belg.

Horde. Ruſticis.

Overvloedig in de Hooi-landen.

EUPHRASIA.

514. EUPHRASIA foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Sp.* 841. *n.* 2. *Gelr.* 364. *Friſ.* 267. *officinalis.*

Euphraſia officinarum. *Baub. pin.* 233. *Comm. boll.* 36. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 430. *ſ.* 11. *t.* 24. *f.* 1.

Oogen-trooſt. Belg.

β. Euphraſia ramoſa pratenſis, flore albo. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 236.

Overvloedig op vochtige zandige plaatſen in de Tielerwaard; *in 't Graafſchap* Zutphen; *op de* Veluwe; *in 't* Haagſe-boſch, *en daaromtrent in de Duinen; te* Heiloo *buiten* Alkmaar, *by* Haarlem, Utrecht; *in* Friesland *in de* Wouden *en op de* Kley *omtrent* Tjum, Spannum, &c. *te* Haren *buiten* Groningen; *en elders.*

Pharm. EUPHRASIÆ *berb.*

515. EUPHRASIA foliis linearibus: omnibus ſerratis. *Sp.* 841. *n.* 4. *Gelr.* 365. *Friſ.* 268. *Odontites.*

Euphraſia pratenſis rubra. *Baub. pin.* 234. *Comm. boll.* 36. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 431. *ſ.* 11. *t.* 24. *f.* 10.

Tweede Oogen-trooſt. Belg.

Overvloedig op vochtige Zand-gronden aan de wegen en kanten van Koorn-landen by Uilenpas, Enghuiſen, Oldbroek, *en elders in* Gelderland; *op*

op Staalduin *buiten* 's Hage; *ook by* Loosduinen, Monſter, Haarlem, Utrecht, Franeker, Zwol, *en elders.*

MELAMPYRUM.

arvenſe. 516. MELAMPYRUM ſpicis conicis laxis: bracteis dentato-ſetaceis coloratis. *Sp.* 842. *n.* 2. *Gelr.* 367.
Melampyrum purpuraſcente coma. *Baub. pin.* 224. *Comm. boll* 72.
Triticum vaccinum. *Dod. pempt.* 541.
Paards-bloemen. Belg.
Overvloedig in de Koorn-velden by Uilenpas, Steenderen, Bronkhorſt, *en elders in 't Graafſchap* Zutphen; *ook by* Thiel, Utrecht *en* Zwol.

pratenſe. 517. MELAMPYRUM floribus ſecundis lateralibus; foliorum conjugationibus remotis, corollis clauſis *Sp.* 843. *n.* 4. *Gelr.* 368. *Friſ p* 87.
Melampyrum luteum latifolium. *Baub. pin.* 243. *Comm boll.* 73. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 429. *ſ.* 11. *t.* 23. *f.* 3.
Geele Paards-bloemen. Belg.
Hengel. Ruſticis.
Overvloedig in de Boſſchen, en op ſchaduwachtige plaatſen in Gelderland, Utrecht, Friesland *en* Overyſſel; *ook in 't* Haagſe-boſch.
Oves ex eſu bujus pingueſcere teſtantur Ruſtici.

LATHRÆA.

Squamaria. 518. LATHRÆA caule ſimpliciſſimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido. *Sp.* 844. *n* 4.
Orobanche, radice dentata, major. *Baub. pin.* 88.
Orobanche, radice dentata altius radicata, foliis & floribus albo purpureis. *Mentz. pug t.* 3. *f.* 3. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 503. *ſ.* 12. *t.* 16. *f.* 14
In Delfland *langs den Dyk tuſſchen* Monſter *en de* Hey. (*Cel.* SCHWENCKE.)

PEDICULARIS.

paluſtris. 519. PEDICULARIS caule ramoſo, calycibus criſtatis calloſo-punctatis, corollis labio obliquis. *Sp.*

Sp. 845. *n.* 1.
Pedicularis pratenſis rubra elatior. *Raj. hiſt.* 700.
Pedicularis danica maxima. *Lob. illuſtr.* 147.
Oed. dan. t. 225.
Luis-kruid. Belg.
Op de Stads-weide by Harderwyk.

520. PEDICULARIS caule ramoſo, calycibus oblongis angulatis lævibus, corollis labio cordato. *Sp.* 845. *n.* 2. *Gelr.* 362. *Friſ.* 269. *ſylvatica.*
Pedicularis pratenſis purpurea. *Bauh. pin.* 163. *Comm. holl.* 86.
Fiſtularia. *Dod. pempt.* 556.
Roode Raatelen, Pyp-kruid. Belg.
In vochtige zandige Wei-landen en Hei-velden op verſcheide plaatſen; ook in de Veen-landen by Amſterveen.

ANTIRRHINUM.

521. ANTIRRHINUM foliis cordatis quinquelobis alternis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 851. *n.* 1. *Gelr.* 358. *Cymbalaria.*
Cymbalaria. *Bauh. pin.* 306. *Cam. epit.* 860.
Aan de Muuren te Nymegen, Bommel, Zutphen, Arnhem, Delft, Haarlem, Schoonhoven, Vianen, Utrecht, Yſelſtein; *aan de Grotten op* Roſendaal *buiten* Arnhem; *aan de ingewaterde Muuren der Bruggen by* 's Hage; *aan een brug te* Neer-Langbroek, *aan de Sluis te* Vreeswyk, *en aan de broeibakken op* Hardenbroek *in 't Sticht van* Utrecht.

522. ANTIRRHINUM foliis ovatis alternis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 851. *n.* 3. *Gelr.* 604. *ſpurium.*
Elatine folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 252. *Comm. holl.* 32.
Veronica femina. *Dod. pempt.* 42.
Te Elderik *en* Wehl *by 't Graafſchap* Zutphen; *in 't* Haagſe-Boſch; *in de Bouwlanden by* Haarlem, Utrecht *en* Zwol.

523. ANTIRRHINUM foliis pleriſque alternis lanceolatis obtuſis, caule ramoſiſſimo diffuſo. *Sp.* 852. *n.* 7. *Gelr.* 359. *minus.*

Antirrhinum arvenſe minus. *Baub. pin.* 212. *Comm. boll.* 11.
Antirrhinum tertium. *Cam. epit.* 922.
Oed. dan. t. 502.
Klein Veld-Orant. Belg.
In de Koorn-landen en Hoven by Harderwyk, Velſen, Utrecht, Zwol, *en elders.*

Linaria. 524. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis. *Sp.* 858. *n.* 33. *Gelr.* 360. *Friſ.* 270.
Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Baub. pin.* 212. *Comm. boll.* 67.
Oſyris. *Fuchs-biſt.* 513. *Cam. epit.* 930.
Vlas-kruid, *Wild Vlas.* Belg.
Overvloedig langs de Duinen, en op veele plaatſen langs de wegen.
Pharm. LINARIÆ *herb.*

Orontium. 525. ANTIRRHINUM corollis ecaudatis, floribus ſubſpicatis, calycibus corolla longioribus. *Sp.* 860. *n.* 36. *Gelr.* 603.
Antirrhinum arvenſe majus. *Baub. pin.* 212.
Antirrhinum ſylveſtre, Phyteuma. *Dod. pempt* 182.
Orant, *Knappers*, *Leeuwenbek*, *Kalfs-ſnuit.* Belg.
By Keppel *in 't Graafſchap* Zutphen, *en op de Akkers langs de Duinen by* s Hage.

SCROPHULARIA.

nodoſa. 526. SCROPHULARIA foliis cordatis trinervatis, caule obtuſangulo. *Sp.* 854. *n.* 2. *Gelr.* 370. *Friſ.* 271.
Scrophularia nodoſa foetida. *Baub. pin.* 235. *Comm. boll.* 103. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 482. *ſ.* 5. *t.* 8. *f.* 3.
Scrophularia. *Cam. epit.* 136. *Dod. pempt.* 50.
Groot Speen-kruid. Belg.
Helm-kruid. Quibusdam.
Aan ruige wallen en wegen by Tiel, *te* Maurik *in de* Betuwe; *te* Zutphen *op de Wal*; *by* Wilp *op de* Veluwe; *rondsom* Arnhem; *in 't* Haagſe-Boſch; *in de* Haarlemmer-Hout; *omtrent het* Orange-woud *in* Friesland; *en elders.*

Pharm.

Pharm. SCROPHULARIÆ NODOSÆ ſ. FOETIDÆ rad. herb.

527. SCROPHULARIA foliis cordatis obtuſis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Sp.* 864. *n.* 3. *Gelr.* 626. *Friſ.* 272. *aquatica.*

Scrophularia aquatica major. *Baub. pin.* 235. *Comm. boll.* 104.

Betonica aquatilis. *Dod. pempt.* 50.

Oed. dan. t. 507.

St. Anthonis-kruid, Beek-ſchuim, Water-Speenkruid, Water-Betonie. Belg.

Aan de kanten van de Wei-ſteeg by Harderwyk; *aan de Slooten in de* Tielerwaard; *by* Uilenpas *in 't Graafſchap* Zutphen; *by* Overveen *buiten* Haarlem; *omtrent* Kooten *en* Drogeham *in* Friesland; *in 't* Haagſe-Boſch; *en op andere vochtige plaatſen.*

Pharm. BETONICÆ AQUATICÆ *herb.*

DIGITALIS.

528. DIGITALIS calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtuſis: labio ſuperiore integro. *Sp.* 866. *n.* 1. *Gelr.* 371. *purpurea.*

Digitalis purpurea, folio aſpero. *Baub. pin.* 243.

Digitalis purpurea. *Dod. pempt.* 168.

Oed. dan. t. 74.

Vingerhoed-kruid. Belg.

In de Diergaarde van Billion, *en aan den weg by* Middagten, Rhederoort, *en elders tuſſchen* Arnhem *en* Dieren; *te* Lichtevoorde *en* Varſeveld *in 't Graafſchap* Zutphen; *in een Boſch tuſſchen 't* Huis ter Heide *en* Bergum *in* Friesland.

LIMOSELLA.

529. LIMOSELLA. *Sp.* 881. *n.* 1. *Gelr.* 627. *aquatica.*

Plantaginella paluſtris. *Baub. pin.* 190. *Comm. boll.* 89. *Moriſ. hiſt.* 3 *p.* 605. *ſ.* 15. *t.* 2. *f.* 1.

Alſine paluſtris exigua, floſculis albis, foliis lanceolatis plantaginellæ aquaticæ inſtar. *Mentz. pug.* 2. *t.* 7. *f.* 6. *Comm. boll.* 8.

Digitized by Google

Plantago aquatica minima. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 110. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 45.
Spergula perpuſilla, lanceolatis foliis. *Loeſ. pruſſ.* 261. *t.* 81.
Oed. dan. t. 69.
In de vochtige Valeyen op Vlieland, *en buiten* Haarlem; *en in een vochtig Valeytje omtrent* Veldwyk *buiten* Harderwyk.

OROBANCHE.

major. 530 OROBANCHE caule ſimpliciſſimo pubeſcente, ſtaminibus ſubexſertis. *Sp.* 882. *n.* 2. *Gelr.* 368.
Orobanche major garyophyllum olens. *Baub. pin.* 87. *Comm. holl.* 84.
Limodoron ſive Orobanche. *Dod. pempt.* 552.
Brem-Raap, Smeer-kruid. Belg.
In de Zaai-landen op de wortels van verſcheiden gewaſſen, veel by Hulſen *buiten* Nymegen; *by* Uilenpas *en* Rhenen *op de wortels van de Brem, en in de Duinen buiten* Haarlem *en* Alkmaar.

ramoſa. 531. OROBANCHE caule ramoſo, corollis quinquefidis. *Sp.* 882. *n.* 4. *Gelr.* 369.
Orobanche ramoſa. *Baub. pin.* 88. *Comm. holl.* 84.
Orobanche. *Cam. epit.* 311.
β. Orobanche ramoſa, floribus cæruleis. *Baub. pin.* 88. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 240.
γ. Orobanche ramoſa, floribus ſubalbidis. *Baub. pin.* 88. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 240.
In de Duinen tuſſchen de Helm, en by Heemſtede.

CLAS-

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

MYAGRUM.

532. Myagrum ſiliculis biarticulatis monoſpermis, foliis extrorſum ſinuatis denticulatis. *Sp.* 893. *n.* 1. (*Gelr* 404.) *perenne.*
Rapiſtrum monoſpermum. *Baub. pin.* 95. *prodr.* 37. *t.* 37.
Aan de Zeekant by Harderwyk.

533. Myagrum ſiliculis obovatis pedunculatis polyſpermis. *Sp* 894. *n.* 6. *Gelr.* 372. *ſativum.*
Myagrum ſativum *Baub. pin.* 109.
Camelina ſ. Myagrion. *Dod. pempt.* 532.
Vlas-Dotter Belg.
Uit en tuit Vulgo.
Komt van zelf voort uit 't Zaad, onder 't Vlas; en word veel gezaait in Twello *by* Deventer.

DRABA.

534. Draba ſcapis nudis, foliis ſubſerratis. *Sp.* 890. *n.* 2. *Gelr.* 381. *Friſ.* 273. *verna.*
Burſa paſtoris minor, loculo oblongo. *Baub pin.* 108. *Comm. holl.* 18. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 305. *ſ.* 3. *t.* 20. *f.* 6.
Paronychia vulgaris. *Dod. pempt.* 112.

A-

Alyſſon vulgare, polygoni folio, caule nudo. *Tourn. inſt.* 217. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 4. *n.* 9.
Vroegeling. Belg.
β. Alyſſon vulgare, polygoni folio, loculo rotundo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 4. *n.* 10.
γ. Alyſſon vulgare, polygoni folio trifido. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 4. *n.* 11.
Veel in de Duinen, en op dorre zandige plaatſen.

L E P I D I U M.

petraeum. 535. Lepidium foliis pinnatis integerrimis calyce minoribus. *Sp.* 899. *n.* 7.
Naſturtium alpinum tenuiſſime diviſum. *Baub. pin.* 105.
Naſturtium pumilum vernum. *Baub. pin.* 105. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 8.
Cardamine puſilla ſaxatilis montana diſcoides. *Col. ecphr.* 1. *p.* 274. *t.* 273.
† *Volgens* Boerhaave.

latifolium. 536. Lepidium foliis ovato-lanceolatis integris ſerratis. *Sp.* 899. *n.* 11.
Lepidium latifolium. *Baub. pin.* 97. *Comm. holl.* 65.
Lepidium plinii. *Dod. pempt.* 716.
Oed. dan. t. 557.
Peper-kruid. Belg.
In zommige Moes-hoven; in de Zee-Duinen by de Vuurbaak van Wyk op Zee; *en omtrent de kanten van zommige Slooten by* Haarlem.

ruderale. 537. Lepidium floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis. *Sp.* 900. *n.* 14. *Gelr.* 374. *Ingr.* 102. *Friſ.* 274.
Naſturtium ſylveſtre, oſyridis folio. *Baub. pin.* 105. *Comm. holl.* 80. capſulis minimis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 301. *ſ.* 3. *t.* 19. *f.* 7.
Oed. dan. t. 184.
Klein Bezem-kruid. Belg.
Buiten Arnhem *by de wegen; by* Amſterdam *aan de Dyken; in* Friesland *aan de Weſtkant van* Stavoren *digt aan Zee, by Vulnis-hoopen.*

THLAS-

Digitized by Google

THLASPI.

538. THLASPI ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Sp.* 901. *n.* 2. *Gelr.* 378. *Friſ.* *p.* 87. *arvenſe.*
Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis. *Baub. pin.* 105. *Comm. boll.* 109.
Thlaſpi latius. *Dod. pempt.* 712.
Boere-Kers, Viſſel-kruid. Belg.
In de Zaai-landen en Moesboven; veel op den Haek achter 's Gravezande.
Pharm. THLASPIOS *ſem.*

539. THLASPI ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis incanis. *Sp.* 902. *n.* 6. *Gelr.* 379. *campeſtre.*
Thlaſpi arvenſe, vaccariæ folio incano, majus. *Baub. pin.* 106. *Comm. boll.* 109.
Thlaſpi latifolium. *Fuchſ. hiſt.* 306.
Boere-Kers. Belg.
Tuſſchen Amersfoort *en* Nykerk, *en by* Zwol.
Pharm. THLASPIOS *ſem.*

540. THLASPI ſiliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Sp.* 903. *n.* 10. *Gelr.* 380. *Friſ.* 275. *Burſa paſtoris.*
Burſa paſtoris. *Dod. pempt.* 103.
Burſa paſtoris major, folio ſinuato. *Baub. pin.* 108. *Comm. boll.* 18.
Tasjes-kruid, Beursjes-kruid, Harders-Tasjes. Belg.
Moeders-Tasjes. Ultrajectinis.
β. Burſa paſtoris major, folio non ſinuato. *Baub. pin.* 108. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 9.
γ. Burſa paſtoris major, folio ſinuato eleganti inſtar coronopi repentis. *Baub. pin.* 108. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 9.
δ. Burſa paſtoris major media. *Baub. pin.* 108. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 9.
By de Wegen en in de Hoven.
Pharm. BURSÆ PASTORIS *herb.*

COCHLEARIA.

541. COCHLEARIA foliis radicalibus cordato-ſubrotundis, caulinis oblongis ſubſinuatis. *Sp.* 903. *n.* 1. *officinalis.*

n. 1. *Gelr.* 375. *Friſ. p* 87.
Cochlearia folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 110. *Comm. boll.* 27.
Cochlearia. *Dod. pempt.* 591.
Oed. dan. t. 135.
Lepel-blad of Lepel-kruid. Belg.
β. Cochlearia major batavica erecta, folio oblongo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 10.
Overvloedig aan de Dyken van het Y buiten Amſterdam *en by* Sparendam; *en aan de Hierder beek by* Harderwyk; *veel ten weſten de* Lemmer *aan de Zee-dyk; en langs de Duinen aan de Zee-kant by* Scheveningen.
Pharm. Cochleariæ *herb. ſem.*

anglica. 542. Cochlearia foliis omnibus ovato-lanceolatis. *Sp.* 903. *n.* 2.
Cochlearia folio ſinuato. *Baub. pin.* 110. *Comm. boll.* 27.
Cochlearia britannica. *Dod. pempt.* 594.
Oed. dan. t. 329.
Engelſch Lepel-blad. Belg.
Buiten Amſterdam *aan het* Y *buiten* Harderwyk; *en by* Scheveningen *by de voorige aan het Zee-ſtrand.*

danica. 543. Cochlearia foliis haſtato-angulatis: omnibus deltoidibus *Sp.* 903. *n.* 3.
Cochlearia aremorica. *Tourn. inſt.* 215.
Cochlearia hederæ folio. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 308. *ſ.* 3. *t.* 20. *f.* 3. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 10.
Thlaſpi hederaceum. *Lob. ic.* 615.
Oed. dan. t. 100.
† *Volgens* Boerhaave.

Coronopus. 544. Cochlearia foliis pinnatifidis, caule depreſſo. *Sp.* 904. *n.* 5. *Friſ.* 276.
Ambroſia campeſtris repens. *Baub. pin.* 138.
Cornu cervi alterum repens. *Dod. pempt.* 110.
Oed. dan. t. 110.
Kruipend Harts-hoorn, Zwynen-Kers, Varkens-Kers. Belg.
Overvloedig even buiten Franeker *aan den* Leeuwaarder *Trekweg, en elders aan de wegen.*
Pharm. Coronopi sylvestris *herb.*

Digitized by Google

545. COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. *Sp.* 904. *n.* 6 *Gelr.* 376. *Armoracia.*
Raphanus ruſticanus. *Baub. pin.* 96. *Comm. boll.* 97.
Moriſ. biſt. 2. *p.* 237. *ſ.* 3. *t.* 7. *f.* 2.
Meer-Edik, Peper-Wortel, Meer-Radys. Belg.
Op 't Bouwland by Uilenpas.
Pharm. RAPHANI RUSTICANI *rad.*

IBERIS.

546. IBERIS herbacea, foliis ſinuatis, caule nudo ſimplici. *Sp* 907. *n.* 12. *Gelr.* 377. *Friſ.* 277. *nudicaulis.*
Burſa paſtoris minor, foliis inciſis. *Baub. pin.* 108. *Comm. boll.* 18.
Burſa paſtoris minor. *Dod. pempt.* 103.
Oed. dan t. 323.
Klein Tasjes-kruid. Belg.
In de Duinen, en op oude muuren en dorre ſteenachtige plaatſen, veel buiten Harderwyk *by* s' Heeren-Loo; *buiten* Haarlem *op den weg naar* Sparendam; *buiten* Alkmaar *op de booge landen en kroften naar* Heiloo; *in* Friesland *aan de dykjes en wegen by* Balk, Bergum *en* 't Heerenveen.

SILIQUOSA.

CARDAMINE.

547. CARDAMINE foliis pinnatis inciſis ſtipulatis, floribus apetalis. *Sp.* 914. *n.* 9. *impatiens.*
Cardamine annua, exiguo flore. *Tourn. inſt.* 224.
Boerb lugdb. 2. *p.* 17.
Siſymbrii cardamines ſpecies quædam inſipida. *Baub. biſt.* 2. *p.* 886.
Siſymbrium montanum tenuifolium, flore muſcoſo purpuraſcente. *Barr. rar. t.* 155.
Sium impatiens. *Alp. exot.* 331.
Naſturtium minimum annuum, flore albo. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 221. *ſ.* 3. *t.* 4. *f.* 1.
† *Volgens* BOERHAAVE.

548. CARDAMINE foliis pinnatis exſtipulatis, foli- *parviflora.*
olis

olis lanceolatis obtuſis, floribus corollatis. *Sp.* 914. *n.* 10.
Cardamine pratenſis, parvo flore. *Tourn. inſt.* 224. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 17. *n.* 4.
Naſturtium pratenſe, parvo flore. *Baub. pin.* 104. *prodr.* 44.
In de Duinen op verſcheide plaatſen.

hirſuta. 549. CARDAMINE foliis pinnatis, floribus tetrandris. *Sp.* 915. *n.* 12. *Gelr.* 628.
Siſymbrium cardamine hirſutum minus, flore albo. *Baub. biſt.* 2. *p.* 888.
Naſturtium aquaticum minus. *Baub. pin.* 154.
In een Tuin aan de oude Touwbaan by Harderwyk, *en te* Byſel *by* Mulmer *tuſſchen* Harderwyk *en* Elburg; *in de Duinen by* 's Hage; *in de Boſſchen van* Zandhorſt; *in den* Haarlemmer-Hout; *en langs de wegen op zommige plaatſen.*

pratenſis. 550. CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis, caulinis lanceolatis. *Sp.* 915. *n.* 13. *Gelr.* 385. *Jngr.* 104. *Friſ.* 278.
Naſturtium pratenſe, magno flore. *Baub. pin.* 104. *Comm. boll.* 79.
Flos cuculi. *Dod. pempt.* 592.
Koekkoeks-bloem, Water-Violen, Klein Water-Kers. Belg.
Kievits-bloem. Ultrajectinis.
Pinxter-bloem. Friſiis.
β. Cardamine pratenſis, magno flore albo. *Tourn. inſt.* 224. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 16.
γ. Cardamine pratenſis, magno flore pleno. *Tourn. inſt.* 224. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 16.
Veel in vochtige Wei-en Hooi-landen, en langs de Slooten.

amara. 551. CARDAMINE foliis pinnatis, axillis ſtoloniferis. *Sp.* 915. *n.* 14. *Jngr.* 104. *Friſ.* 279.
Naſturtium aquaticum majus & amarum. *Baub. pin.* 104. *prodr.* 45.
Naſturtium Cardamine ſeu Naſturtium aquaticum flore majori elatius. *Baub. biſt.* 2. *p.* 885.
In de Slooten te Hulſen *by* Nymegen; *omtrent* Tjetjerk *by de Hofſtede* Hanenburg *in* Friesland; *te* Maſtebroek *in* Overyſſel; *en elders.*

Digitized by Google

SISYMBRIUM.

552. SISYMBRIUM ſiliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis ſubcordatis. *Sp.* 916. *n.* 1. *Friſ.* 280. *Gelr.* 398. *Naſturtium*
Siſymbria Cardamine. *Fuchſ. hiſt.* 723.
Naſturtium aquaticum ſupinum. *Baub. pin.* 104. *Comm. boll.* 80.
Water-Kers. Belg.
Veel in de Slooten by Harderwyk *en agter* Ryswyk *in de* Betuwe; *hier en daar omtrent* Tiel; *om* Haarlem, *en langs de Duinkant; by* Holten *in* Overysſel; *in de laage Landen by* Utrecht, Wyk by Duurſtede, *en* Zwol; *in veele Slooten in* Friesland; *en in 't* Gorcght *buiten* Groningen.
Pharm. NASTURTII AQUATICI *herb.*

553. SISYMBRIUM ſiliquis declinatis oblongo-ovatis, foliolis lanceolatis ſerratis. *Sp.* 916. *n.* 4. *Gelr.* 399. *ſylveſtre.*
Eruca paluſtris, naſturtii folio, ſiliqua oblonga. *Baub. pin* 98. *Comm. boll.* 35.
Eruca ſylveſtris. *Fuchſ. hiſt.* 263.
Water-Raket. Belg.
Veel op vochtige plaatſen in Hoorn *in* Overysſel; *by* Uilenpas; *en elders; ook in de Moes-hoven.*

554. SISYMBRIUM ſiliquis declinatis oblongo-ovatis, foliolis pinnatifidis ſerratis. *Sp.* 917. *n.* 5. *Jngr.* 105. *Friſ.* 281. *amphibium.*
α. Siſymbrium foliis infimis capillaceis, ſummis pinnatifidis. *Linn. h. Cliff.* 337. *Gelr.* 632. *paluſtre.*
Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias diviſis. *Baub. pin.* 97. *prodr.* 38. *t.* 38. *Comm. boll.* 97.
Wilde Water-Radys. Belg.
β. Siſymbrium foliis ſimplicibus dentatis ſerratis. *Linn. h. Cliff.* 336. *Gelr.* 631. *aquaticum.*
Raphanus aquaticus alter. *Baub prodr.* 38. *t.* 38.
Veel aan de kanten der Slooten, en in dezelven.

555. SISYMBRIUM foliis integerrimis: infimis tripinnatifidis; ſupremis integris. *Sp.* 719. *n.* 6. *tenuifolium.*
Sinapi erucæ folio. *Baub. pin.* 99. *Comm. boll.* 106
Eruca tenuifolia perennis. *Baub hiſt.* 2. *p.* 861.

Wild Moſtaart-zaad. Belg.
Veel aan de Dyken by Amſterdam, *en by de Wegen om* Utrecht.

Sophia. 556. SISYMBRIUM petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis. *Sp.* 920. *n.* 18. *Gelr.* 403. *Friſ.* 282.
Naſturtium ſylveſtre tenuiſſime diviſum. *Baub. pin.* 105. *Comm. boll.* 80.
Sophia chirurgorum. *Lob. ic.* 738.
Oed. dan. t. 528.
Vuur-kruid, Sophie-kruid, Fie-kruid. Belg.
β. Naſturtium ſylveſtre tenuiſſime diviſum, folio latiore. *Baub. pin.* 105.
Aan de Dyken, by de Wegen, op Kerkhoven; veel aan de Duinkant buiten Haarlem.
Pharm. SOPHIÆ *berb. ſem.*

Irio. 557. SISYMBRIUM foliis runcinatis dentatis nudis, caule lævi, ſiliquis erectis. *Sp.* 921. *n.* 21.
Eryſimum alterum ſilquis erucæ. *Baub. pin.* 101. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 14.
Eryſimum latifolium majus glabrum. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 218. *ſ.* 3. *t.* 3. *f.* 3.
Irio lævis apulus erucæ folio. *Col. ecpbr.* 1. *p.* 264. *t.* 265.
Buiten 's Hage *in 't Boſcb op den weg naar* Scheveningen. (*Cel.* SCHWENCKE.) *Veel by en in 't Zee-dorp* ter Heide. (*Cel.* van ROIJEN.)

ERYSIMUM.

officinale. 558. ERYSIMUM ſiliquis ſpicæ adpreſſis, foliis runcinatis. *Sp.* 922. *n.* 1. *Gelr.* 392. *Friſ.* 283.
Eryſimum vulgare. *Baub. pin.* 100. *Comm. boll.* 35. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 218. *ſ.* 3. *t.* 3. *f.* 1.
Oed. dan. t. 560.
Steen-Raket. Belg.
Veel op ruwe ſteenacbtige plaatſen, en by de wegen.
Pharm. ERYSIMI *berb.*

Barbarea. 559. ERYSIMUM foliis lyratis: extimo ſubrotundo. *Sp.* 922. *n.* 2. *Gelr.* 395. *Ingr.* 106.
Eruca lutea latifolia ſive Barbarea. *Baub. pin.* 98.
Barbarea. *Dod. pempt.* 712.

Win-

Winter-Kers. Belg.
Aan de Beeken by Harderwyk.

560. ERYSIMUM foliis cordatis. *Sp.* 922. *n.* 3. *Gelr.* 393. *Friſ.* 284. *Alliaria.*
Alliaria. *Baub. pin.* 110. *Fuchſ. biſt.* 104. *Cam. epit.* 589. *Comm. holl.* 5.
Look zonder Look. Belg.
Overvloedig omtrent Tiel; *aan de Wallen te* Zutphen; *en de Wal achter 's Heeren-Doelen te* Arnhem; *aan de Hoven by* Harderwyk; *buiten* 's Hage *op den weg naar* Scheveningen; *aan ruige wallen by* Beverwyk, Bredenrode, Bloemendaal; *in de* Alkmaarder-hout; *aan de Wegen by* Utrecht, Franeker, Zwol; *aan de Ooſtzyde van de Heereweg digt by* Haren *buiten* Groningen, *en elders.*
Pharm. ALLIARIÆ *herb.*

561. ERYSIMUM foliis lanceolatis integerrimis, ſiliquis patulis. *Sp.* 923. *n.* 5. *Gelr.* 394. *cheiranthoides.*
Myagrum ſiliqua longa. *Baub. pin.* 109. *Comm. holl.* 78.
Camelina, Myagrum alterum thlaſpi effigie. *Lob. ic.* 225.
Groote Wilde Kers. Belg.
In de Moes-hoven en Bouw-landen.

CHEIRANTHUS.

562. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoſo. *Sp.* 924. *n.* 2. *Gelr.* 382. *Cheiri.*
Leucojum luteum vulgare. *Baub. pin.* 202. *Comm. holl.* 65.
Leucojum luteum. *Dod. pempt.* 160.
Muur-bloemen, Steen-Violieren. Belg.
β. Leucojum, pleno flore, minus. *Baub. pin.* 202.
Aan oude muuren op veele plaatſen. β. *Op 't Choor van de vervallen Broederen-Kerk te* Harderwyk.
Pharm. CHEIRI *flor.*

ARABIS.

563. ARABIS foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Sp.* 929. *n.* 3. *Gelr.* 391. *thaliana.*

 Bur-

Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa major, ſeu majoribus foliis. *Baub. pin.* 108. *Comm. boll.* 19.

β. Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa minor, ſeu minoribus foliis. *Baub. pin.* 108 *Comm. boll.* 19.
Piloſella ſiliquoſa minor. *Thal. herc.* 84. *t.* 7. *f.* D.
Overvloedig in zandige Moes-hoven; en op zommige plaatſen in de Duinen.

TURRITIS.

glabra. 564. TURRITIS foliis radicalibus dentatis hiſpidis; caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Sp.* 930. *n.* 1. *Friſ.* 285. *Gelr.* 396.
Braſſica ſylveſtris, foliis circa radicem cichoraceis. *Baub. pin.* 112.
Braſſica ſylveſtris, foliis circa radicem cichoraceis aſperis, caulibus autem adhærentibus planis ſeu glabris. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 210. *ſ.* 3. *t.* 2. *f.* 22.
In de Salker-Waard; *in een donker Boſchje omtrent* Bontekoe *in* Friesland; *en hier en daar op oude vervalle muuren in de ſchaduwe.*

hirſuta. 565. TURRITIS foliis omnibus hiſpidis, caulinis amplexicaulibus. *Sp.* 930 *n.* 2. *Gelr* 397.
Eryſimo ſimilis hirſuta, non laciniata, alba. *Baub. pin.* 101. *prodr.* 42. *t.* 42.
Braſſica ſylveſtris hiſpida non ramoſa, C. B. *Comm. boll.* 17.
Turren-kruid. Belg.
Op oude Muuren te Harderwyk, Utrecht, Wyk by Duurſtede.

BRASSICA.

campeſtris. 566. BRASSICA radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis ſeſſilibus. *Sp.* 931. *n.* 2. *Gelr.* 388. *Friſ.* 286.
Braſſica campeſtris perfoliata, flore albo. *Baub. pin.* 112.
Braſſica campeſtris perfoliata, flore luteo. *Comm. boll.* 17. *Loeſ. pruſſ.* 29.
Oed. dan. t. 550.
Wilde Kool met Bladeren van Deurwas. Belg.
By Amſterdam, Haarlem, Alkmaar; *in* Friesland *in*

in de Wouden; *in* Overyſſel *by* Salk *aan de wegen en dyken*; *ook van zelf in de Moes- boven en Bouw- landen.*
Corolla huic ſemper lutea, non alba.

567. BRASSICA radice cauleſcente fuſiformi. *Sp.* 931. *n.* 3. *Napus.*
Napus ſylveſtris. *Baub. pin.* 95. *Comm. boll.* 79.
Napus ſeu Bunias ſylveſtris flore luteo. *Lob. ic.* 200. *Cam. epit.* 220.
Steek - Raapen. Belg.
Graveelzaad. Quibusdam.
By de Akkers en wegen in de Betuwe, *en* Noord-Holland.
Pharm. NAPI *ſem. Oleum, quod Raap - Oly noſtratibus audit.*

568. BRASSICA radice cauleſcente orbiculari depreſſa carnoſa. *Sp.* 931. *n.* 4. *Gelr.* 387. *Rapa.*
Rapa ſylveſtris. *Raj hiſt.* 800.
Wilde Raapen of *Knollen.* Belg.
Ruben. Tranſyſalanis
Aan de wegen by Heemſtede *en elders.*
Pharm. RAPÆ *rad.*

569. BRASSICA foliis runcinatis, caule hiſpido, ſiliquis lævibus. *Sp.* 932. *n.* 7. *Gelr.* 402. *Erucaſtrum*
Eruca ſylveſtris major lutea, caule aſpero. *Baub. pin.* 98. *Comm. boll.* 35.
Eruca ſylveſtris. *Dod. pempt.* 708.
Wilde Raket. Belg.
Op Steenachtige plaatſen, en aan de Muuren te Hattem, 's Hage, Utrecht, Wyk by Duurſtede, Zwol, Campen, *en elders.*

SINAPIS.

570. SINAPIS ſiliquis multangulis toroſo - turgidis lævibus roſtro ancipiti longioribus. *Sp.* 933. *n.* 1. *Gelr.* 390. *Friſ.* 288. *arvenſis.*
Rapiſtrum flore luteo. *Baub. pin.* 95. *Comm. boll.* 97.
Rapiſtrum. *Dod. pempt.* 675.
Herik. Belg.
Krodde. Friſiis.
Overvloedig in de Bouw - landen en by de wegen.

alba. 571. SINAPIS ſiliquis hiſpidis: roſtro obliquo longiſſimo enſiformi. *Sp.* 933. *n.* 2.
Sinapi album, ſiliqua hirſuta, ſemine albo. *Baub. biſt.* 2. *p.* 856.
Sinapi hortenſe ſemine albo. *Baub. pin.* 99. *Comm. boll.* 105.
Sinapi ſativum alterum. *Dod. pempt.* 707.
Witte Moſtaart. Belg.
In de Akkers op veele plaatſen, voornaamlyk in Noord-Holland.
Pharm. SINAPI ALBI *ſem.*

nigra. 572. SINAPIS ſiliquis glabris racemo appreſſis. *Sp.* 933. *n.* 3. *Gelr.* 389.
Sinapi rapi folio. *Baub. pin.* 99. *Comm. boll.* 105.
Sinapi ſativum prius. *Dod. pempt.* 706.
Moſtaart. Belg.
Als vooren.
Pharm. SINAPI NIGRI *ſem.*

RAPHANUS.

Raphaniſtrum. 573. RAPHANUS ſiliquis teretibus articulatis lævibus uniloculari bus. *Sp.* 935. *n.* 2. *Friſ.* 289. *Linn. amæn. acad. vol. VI. p.* 448. *t.* 451.
Raphaniſtrum ſegetum, flore luteo vel pallido.
Keik. Ruſticis.
In de Bouw-landen op zeer veele plaatſen.

BUNIAS.

Cakile. 574. BUNIAS ſiliculis ovatis lævibus ancipitibus. *Sp.* 936. *n.* 4. *Gelr.* 384. *Friſ.* 290.
Eruca maritima latifolia italica, ſiliqua haſtæ cuſpidi ſimili. *Baub. pin.* 99. *Comm. boll.* 35.
Cakile ſerapionis. *Lob. ic.* 223.
Zee-Raket. Belg.
Aan 't Strand by Scheveningen; *langs 't Zee- en Maasſtrand agter* 's Gravezande; *in de Zee-Duinen by* Wyk op Zee; *aan bet bangen der Duinen by* Zandvoort; *en elders aan de Zeekant van* Holland; *ook aan 't Strand buiten* Stavoren, *en aan de voet van 't* Roode Klif.

CLAS-

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA

DECANDRIA.

GERANIUM.

575. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis inciſis obtuſis, caule ramoſo. *Sp* 951. *n.* 26. *Gelr.* 407. *Friſ.* 291. *cicutarium.*
Geranium, cicutæ folio, minus & ſupinum. *Baub. pin.* 319. *Comm. boll.* 44.
Geranium ſeptimum ſive gruinum. *Dod. pempt.* 64.
Oijevaars-bek, Kraan-hals. Belg.
β. Geranium, cicutæ folio, minus & ſupinum, flore albo. *Baub. pin.* 319. *Comm. boll.* 44.
Overvloedig in de Duinen van Holland; *en in de Bouw-landen, en by de wegen op veele plaatſen.*
β. *In de* Haarlemmer-Hout.

576. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis inciſis, cotyledonibus pinnatifidis. *Sp.* 951. *n.* 27. *moſchatum.*
Geranium cicutæ folio, moſchatum. *Baub. pin.* 319.
Geranium ſupinum. *Dod. pempt.* 63.
β. Geranium, cicutæ folio, inodorum. *Baub. pin.* 319. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 266.
In de Duinen by 's Hage, *en aan de wallen der Bouw-landen agter den* Kranenborg *buiten* Zwol.

577. GERANIUM pedunculis ſolitariis oppoſitifoliis, *phæum.*

calycibus ſubariſtatis, caule erecto, petalis undulatis. *Sp.* 953. *n.* 37.

Geranium montanum fuscum. *Baub. pin.* 318.

Geranium phæum ſeu fuscum, petalis rectis ſeu planis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 515. *ſ.* 3. *t.* 16. *f.* 18.

In 't Boſch *van* Zuilen *by* Utrecht, *onder opgaande boomen over de poort van het Kaſteel tuſſchen het Geranium Robertianum, Eryſimum Alliaria, en andere gemeene kruiden.* (*Nob.* D. FABRICIUS SIX.)

Singulare eſt, plantam alpinam hic ſpontaneam eſſe, quamvis notum ſit plantas alpinas extra alpes ſolo humido delectari.

robertianum. 578. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus piloſis decemangulatis. *Sp.* 955. *n.* 45. *Gelr.* 406. *Friſ.* 292.

Geranium robertianum primum. *Baub. pin.* 319. *Comm. holl.* 44.

Geranium robertianum. *Dod. pempt.* 62.

Robberts-kruid, Roode Oijevaars-bek. Belg.

Op oude Muuren, Boomen, Steenachtige gronden, in Boſſchen, Heggen, Wilderniſſen; in 't Haagſe-Boſch *en in de* Haarlemmer-Hout.

Pharm. GERANII ROBERTIANI *herb.*

Corolla plerumque rubro-purpurea, interdum alba.

molle. 579. GERANIUM pedunculis bifloris, foliisque floralibus alternis, petalis bifidis, calycibus muticis, caule erectiuſculo. *Sp.* 955. *n.* 48. *Friſ.* 293.

Geranium columbinum villoſum, petalis bifidis purpureis. *Vaill. par.* 79. *t.* 15. *f.* 3.

Langs de Wegen by 's Hage, *en veele andere plaatſen; in de Zaai-landen en aan de ruige Wallen buiten* Franeker, *en elders; menigvuldig aan de dykjes langs de Heereweg buiten* Groningen.

diſſectum. 580. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villoſis. *Sp.* 956. *n.* 49.

Geranium batrachiodes, Collum gruis germanorum. *Baub. pin.* 319.

Geranium columbinum majus, foliis imis longis adusque pediculum diviſis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 511. *ſ.* 5.

Digitized by Google

ſ. 5. t. 3. f. 3. Vaill. par. t. 15. f. 2. optima.
Zeer veel tegens de Kaê-dyk van de Meerburger-Watering *buiten* Leiden. (*Cel.* D. van ROYEN.)
In de Wei-landen by 't Huis te Marquette, *en de Hofſtede* Vegtſtroom *niet verre van* Maarſſen. (*Nob.* D. FABRICIUS SIX.)

581. GERANIUM pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinquepartito-multifidis, arillis glabris, calycibus ariſtatis. *Sp.* 956. *n.* 51. *Friſ.* 294. *columbinum.*
Geranium columbinum, foliis diſſectis, pediculis florum longiſſimis. *Vaill. par.* 79. *t.* 15. *f.* 4.
Op ruwe plaatſen by Haarlem, Franeker, *en elders.*

582. GERANIUM pedunculis bifloris, petalis ſubintegris longitudine calycis, caule proſtrato, foliis reniformibus inciſis. *Sp.* 957. *n.* 53. *Gelr.* 405. *Friſ.* 295. *rotundifolium.*
Geranium folio malvæ rotundo. *Baub. pin.* 318. *Comm. boll.* 44.
Pes columbinus. *Dod. pempt.* 61.
Duive-Poot. Belg.
By de wegen op zandige plaatſen.

POLYANDRIA.

ALTHÆA.

583. ALTHÆA foliis ſimplicibus tomentoſis. *Sp.* 966. *n.* 1. *Gelr.* 410. *officinalis.*
Althæa dioſcoridis & plinii. *Baub. pin.* 315. *Comm. boll.* 8.
Althæa, Ibiſcus. *Dod. pempt.* 655.
Oed. dan. t. 530.
Heems-wortel. Belg.
β. Althæa folio rotundiori, aut minus acuminato. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 269.
In Gelderland *by* Doornſpyk, Oen, Weſtervoorde, Lathum, &c. *aan de dyken van* Maas *en* Waal; *in* Zuid-Holland *by* 's Gravezande *langs den binnendyk; in* Noord-Holland *by* Alkmaar

Digitized by Google

in de Huiger-Waart, *tuſſchen* Koedyk *en* St. Pancras; *aan de* Alkmaarder-vaart; *aan den dyk by* Schermerhorn; *aan den* Zaan *over* Knollendam; *op verſcheide plaatſen by* Enkhuiſen; *overvloedig in* Waterland *langs het* Y *kant; ook in* Overysſel *by* Zwol, Campen, *en elders.*

Pharm. Althææ *rad. herb. flor. ſem. far.*

MALVA.

rotundifolia. 584. Malva caule proſtrato, foliis cordato-orbiculatis obſolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. *Sp.* 969. *n.* 11. *Gelr.* 409. *Ingr.* 110. *Friſ.* 296.

Malva ſylveſtris, folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 314. *Comm. holl.* 71.

Malva ſylveſtris pumila. *Fuchſ. hiſt.* 508. *Dod. pempt.* 653.

Kleine Malowe of *Kaasjes-kruid.* Belg.

Aan de Wegen en Dyken.

ſylveſtris. 585. Malva caule erecto herbaceo, foliis ſeptemlobatis acutis, pedunculis petiolisque piloſis. *Sp.* 969. *n.* 13. *Gelr.* 408. *Friſ.* 297.

Malva ſylveſtris, folio ſinuato. *Bauh. pin.* 314. *Comm. holl.* 71.

Malva ſylveſtris procerior. *Dod. pempt.* 653.

Malowe, Kaasjes-kruid. Belg.

Op ruwe ongebouwde en ſteenachtige plaatſen.

Pharm. Malvæ *rad. herb. flor. ſem.*

CLAS-

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

FUMARIA.

586. Fumaria caule ſimplici, bracteis longitudine *bulboſa.*
florum. *Sp.* 983. *n.* 3. *Gelr.* 411.
Fumaria bulboſa radice non cava minor. *Baub. pin.* 144. *Comm. boll.* 39.
Radix cava minor *Dod. pempt.* 327.
Boontjes - Holwortel. Belg.
Vogeltjes. Vulgo.
In de Boſſchadien by Deutecom *en* Enghuiſen *in 't Graafſchap* Zutphen; *by* Zeddam *in 't Graafſchap* 's Heerenberg; *in 't* Haagſe-Boſch; *en in de* Haarlemmer-*en* Alkmaarder-Hout.
Pharm. Aristolochiæ cavæ *rad.*

587. Fumaria pericarpiis monoſpermis racemoſis, *officinalis.*
caule diffuſo. *Sp.* 984. *n.* 7. *Gelr.* 412. *Friſ.* 298.
Fumaria officinarum & dioſcoridis. *Baub. pin.* 143. *Comm. boll.* 39.
Fumaria. *Dod. pempt.* 59.
Duive-Kervel, Aard-Rook, Gryſecom. Belg.
Koe-gras. Moſa-Trajectinis.
β. Fumaria officinarum, foliis cæſiis, flore dilute rubello. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 308.
In de Zaai-landen en Moesboven.

Pharm.

Digitized by Google

Pharm. FUMARIÆ *herb. ſem.*

ſpicata. 588. FUMARIA pericarpiis monoſpermis ſpicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. *Sp.* 985 *n.* 8.
Fumaria minor tenuifolia. *Baub. pin.* 143.
Fumaria minor tenuifolia præcox, ſemine lini. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 262. *ſ.* 3. *t.* 12. *f.* 13.
In de Duinen by Catwyk *en* Waſſenaar. (*Hortulanus* MEERBURG.)

claviculata 589. FUMARIA ſiliquis linearibus, foliis cirrhiferis. *Sp.* 884. *n.* 10. *Gelr.* 213. *Friſ.* 299.
Fumaria claviculis donata. *Baub. pin.* 143. *Comm. holl.* 39. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 266. *ſ.* 3. *t.* 13. *f.* 3.
Op ſchaduwachtige zandige plaatſen in Hulshorſt *en te* Lovenich *by* Harderwyk; *op* Princen-Loo; *by* Haarlem, Utrecht; *op den Berg by* Rhenen; *omtrent* Oenkerk, Oudkerk, Heerenveen, Mildam, Bergum, *in* Friesland; *ook buiten* Groningen.

OCTANDRIA.

POLYGALA.

vulgaris. 590. POLYGALA floribus criſtatis racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Sp.* 986. *n.* 2. *Gelr.* 414. *Friſ.* 300.
Polygala vulgaris. *Baub. pin.* 215. *Comm. holl.* 90. *Vaill. par. t.* 32. *f.* 2.
Flos ambervalis. *Dod. pempt.* 273.
Oed. dan. t. 516.
Kruis-bloem. Belg.
Op Hei-velden by Hulſen *buiten* Nymegen; *op de Stads-weide by* Harderwyk; *overvloedig in de Duin-valeyen van* Holland; *op dorre velden by* Heerenveen, Orange-woud, Dragten, Ureterp, *en* Sygerswolde *in* Friesland; *ook by* Zwol, *en elders.*
Variat corolla cærulea, violacea, purpuraſcente, carnea & alba. Variat et ſtaminum numero ab octo ad de-

decem. Planta apud nos plerumque procumbens.

DECANDRIA.

SPARTIUM.

591. Spartium foliis ternatis ſolitariiſque, ramis inermibus angulatis. *Sp.* 996. *n.* 8. *Gelr.* 415. *Friſ.* 301. *ſcoparium.*
Geniſta anguloſa & ſcoparia. *Baub. pin.* 395. *Comm. boll.* 43.
Geniſta. *Dod. pempt.* 761.
Oed. dan. t. 313.
Brem, Brem-Kappers. Belg.
Veel omtrent Uilenpas, Keppel, *'t Huis t'* Velde, Harderwyk, Wageningen, 's Heeren-Loo, Haarlem, *in de Duinen by* Noordwyk, Weſterhout, Zorgvliet, Egmond op den Hoef *en* Bergen; *aan de Wegen by* Utrecht, Driebergen, Rhenen; *in de* Wouden *in* Friesland; *te* Onnen, *by* Harender-moolen, *en op de* Mickelhorſt *buiten* Groningen; *op de Heide by* Goor, *en elders.*
Pharm. Genistæ *herb. flor. ſem.*
Semina a noſtratibus condiuntur, & loco Capparidum acetariis inſerviunt.

GENISTA.

592. Genista foliis lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis. *Sp.* 998. *n.* 8. *Gelr.* 416. *tinctoria.*
Geniſta tinctoria germanica. *Baub. pin.* 395.
Geniſta tinctoria. *Dod. pempt.* 763.
Gemeene Akker-Brem. Belg.
In de Landen by den Ouden Yſſel *omtrent* Keppel *en* Uilenpas; *in de Duinen by* Weſterhout; *op de Heide in* Friesland, Groningen, *en te* Heemze *in* Overyſſel.

593. Genista ſpinis ſimplicibus, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis, *Sp.* 999. *n.* 11. *Friſ.* 302. *anglica.*

Ge-

Geniſta minor aſphaltioides. *Baub. pin.* 395. *prodr.* 157. *Comm. boll.* 43.
Geniſtella. *Dod. pempt.* 760.
Kleine Stekende Brem. Belg.
Heuckel-doorn. Zutphanienſibus.
Steekel-Heide. Groninganis.
Katten-doorn. Vulgo.
Veel op Hei-velden omtrent Uilenpas, Harderwyk, Naarden, Utrecht, Zwol; *in veele Woudplaatſen in* Friesland; *op 't Heideveld by* Haren *in 't witte Veen, en by Harender-Moolen buiten* Groningen.
Commelinus *confundit ſynonyma bujus & ſequentis ſpeciei.*

germanica. 594. Geniſta ſpinis compoſitis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Sp.* 999. *n.* 12.
Geniſta ſpinoſa minor germanica. *Baub. pin.* 395. *Comm. boll.* 43.
Geniſtella ſpinoſa. *Riv. tetr. t.* 67.
Gaspel-doorn. Belg.
Op Muiderberg.

ULEX.

europæus. 595. Ulex foliis villoſis acutis, ſpinis ſparſis. *Sp.* 1045. *n.* 1.
Ganiſta ſpinoſa major, longioribus aculeis. *Baub. pin.* 394.
Geniſta ſpinoſa. *Dod. pempt.* 759.
Op Zuideras *in 't Graafſchap* Zutphen; *op de Heide by* Mentenberg *en* Valkenhuiſen, *buiten* Arnhem; *en in den* Aardenhout *by* Haarlem.

ONONIS.

arvenſis. 596. Ononis floribus racemoſis geminatis, foliis ternatis: ſuperioribus ſolitariis, ramis inermibus ſubvilloſis. *Sp.* 1006. *n.* 2. *Gelr.* 418. *Friſ.* 303
ſpinoſa. α. Anonis ſpinoſa, flore purpureo. *Baub. pin.* 389. *Comm. boll.* 11.
Anonis. *Dod. pempt.* 743.
Stal-kruid, Prang-wortel. Belg.
Woert-baak. Ruſticis.
β. Anonis ſpinoſa, flore albo. *Baub. pin.* 389. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 33.

γ. Ano-

γ. Anonis ſpinis carens purpurea. *Baub. pin.* 389. *mitis.*
Comm. holl. 11.
Anonis mitior. 1. *Cluſ. hiſt.* 99.
Stal-kruid zonder doornen. Belg.
α & γ. Aan de kanten der zandige Bouw-landen op veele plaatſen; ook aan den Yſſel-dyk *in* Gelderland *en* Overysſel; *aan de Maas- en Zee-Dyken achter* s' Gravezande *en by* Monſter; *aan de* Zyp-dyk *in* Noord Holland; *aan de* Lek-dyk *by* Wyk te Duurſtede. β. *Omtrent* Doesburg, s' Gravezande, Monſter.
Pharm. ONONIDIS *rad.*
Plantæ inermes γ. æſtate ſpinoſæ evadunt.

ANTHYLLIS.

597. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Sp.* 1012. *n.* 2. *Vulneraria*
Anthyllis leguminoſa belgarum. *Lob. ic.* 2. *p.* 87.
Loto affinis vulneraria pratenſis. *Baub. pin.* 332.
Lagopodium flore luteo. *Tabern. ic.* 925.
Wond-kruid. Belg.
In de Duinen buiten 's Hage, *over* Velſen, *en tuſſchen* Egmond op den Hoef *en* Bergen.

LATHYRUS.

598. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, ſtipulis ſagittato-cordatis. *Sp.* 1029. *n.* 1. *Aphaca.*
Vicia lutea, foliis convolvuli minoris. *Baub. pin.* 345.
Aphaca. *Lob. ic.* 2. *p.* 70.
Op de nieuwe plantagie langs de Maas *by* Rotterdam. (D. RAINVILLE.)

599. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Sp.* 1033. *n.* 15. *Gelr.* 421. *tuberoſus.*
Lathyrus arvenſis repens tuberoſus. *Baub. pin.* 344. *Comm. boll.* 64.
Terræ glandes. *Dod. pempt.* 550.
Aard-Aakers. Belg.
Overvloedig in de Zaai- en Koorn-landen in Gelderland, *'t Sticht van* Utrecht *en* Overryſſel; *in de Heggen om* Wyk by Duurſtede; *ook hier en daar*

daar op de Akkers by 's Gravenhage, *dog zeldzaam.*

pratenſis. 600. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis: foliolis lanceolatis. *Sp.* 1033. *n.* 16. *Gelr.* 422. *Friſ.* 305.
Lathyrus ſylveſtris luteus, foliis viciæ. *Baub. pin.* 344. *Comm. boll.* 65.
Lathyrus luteus ſylveſtris dumetorum. *Baub. biſt.* 2. *p.* 304.
Oed. dan. t. 527.
Geele Wikken. Belg.
Linzen. Groninganis.
Op ſchaduwachtige plaatſen, en aan de kanten der Zaai-en Koorn-landen by Uilenpas, 's Heeren-Loo, 's Gravenhage, Utrecht; *in den* Aardenhout *op den weg naar* Overveen; *in de* Wouden *en op de* Kley *in* Friesland; *in 't* Goreght *om* Groningen; *en elders.*

ſylveſtris. 601. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis enſiformibus, internodiis membranaceis. *Sp.* 1033 *n.* 17.
Lathyrus ſylveſtris major. *Baub. pin.* 344.
Lathyrus ſylveſtris. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 129. *Dod. pempt.* 523.
Oed. dan. t. 525.
Op de Duinen by 's Gravenhage. (*Cel.* SCHWENCKE.)

latifolius. 602. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Sp.* 1033. *n.* 18. *Gelr.* 629.
Lathyrus latifolius. *Baub. pin.* 344.
Lathyrus major latifolius, flore purpureo ſpecioſior. *Baub. biſt.* 2. *p.* 303.
Tros-Lathyrus, Bouquet-Lathyrus. Vulgo.
Langs de Heggen by Uilenpas, *en overvloedig op den* Haak *by* 's Gravezande.

VICIA.

Cracca. 603. VICIA pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubeſcentibus, ſtipulis integris. *Sp.* 1035. *n.* 5. *Gelr.* 423. *Friſ.* 306.

Vi-

Vicia multiflora. *Baub. pin.* 345. *Comm. boll.* 114.
Vicia perennis multiflora ſpicata cærulea ſepiaria. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 61. *ſ.* 2. *t.* 11. *f.* 1.
Cracca. *Riv. tetr.* 49. *Rupp. jen.* 212.
Wilde Wikken of *Vitzen*, *Nacht-Wikken.* Belg.
In de Koorn-landen, en aan ruige Wallen op veele plaatſen.

604. Vicia leguminibus ſeſſilibus ſubbinatis erectis, foliolis retuſis, ſtipulis notatis. *Sp.* 1037. *n.* 10. *Gelr.* 424. *Friſ.* 307. *ſativa.*
Vicia ſativa vulgaris, ſemine nigro. *Baub. pin.* 344. *Comm. boll.* 114.
Vicia vulgaris ſativa. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 310.
Oed. *dan. t.* 522.
Wikken. Belg.
β. Vicia vulgaris, acutiori folio, ſemine parvo nigro. *Baub. pin.* 345. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 43.
γ. Vicia ſemine rotundo nigro. *Baub. pin.* 344.
Craccæ primum genus. *Dod. pempt.* 542.
In de Koorn- en Bouw-landen.

605. Vicia leguminibus ſeſſilibus ſolitariis erectis glabris, foliolis ſenis: inferioribus obcordatis. *Sp.* 1037. *n.* 11. *lathyroides.*
Vicia minima, radice granuloſa breynii. *Comm. boll.* 115. *amſt.* 364.
Vicia minima. *Riv. tetr.* 169.
Vicia lathyroides, purpureo-cæruleis floribus. *Herm. par.* 242. *t.* 242.
Oed. *dan. t.* 58.
Op de Duinen by Catwyk, *en buiten* Haarlem; *en op dorre plaatſen by* Naarden.
Nonnullæ hujus ſpeciei plantæ radice granulata gaudent.

606. Vicia leguminibus pedicellatis ſubquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decreſcentibus. *Sp.* 1038. *n.* 15. *Gelr.* 425. *Friſ.* 308. *ſepium.*
Vicia ſepium, folio rotundiore acuto. *Baub. pin.* 345. *Comm. boll.* 114.
Vicia. *Dod. pempt.* 531.
Vitzen, *Kleine wilde Wikken*, *Rinkel-Wikken.* Belg.

By de Wegen, en in de Akkers.

ERVUM.

tetraſpermum. 607. Ervum pedunculis ſubbifloris, ſeminibus globoſis quaternis. *Sp.* 1039. *n.* 2.
Vicia ſegetum, ſingularibus ſiliquis glabris. *Baub. pin.* 345.
Vicia minor ſegetum, cum ſiliquis paucis glabris. *Moriſ hiſt.* 2. *p.* 64. *ſ.* 2. *t.* 4. *f.* 16.
Oed. dan. t. 95.
Aan de kant van een Sloot op Zandhorſt; *en in de Zaai-landen tuſſchen* Utrecht *en* Maarſſen. (*Nob.* D. Fabricius Six.)

hirſutum. 608. Ervum pedunculis multifloris, ſeminibus globoſis binis. *Sp.* 1039. *n.* 3. *Gelr.* 436. *Friſ.* 310.
Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis hirſutis. *Baub. pin.* 345.
Cracca minor. *Tabern. ic.* 507.
Kleine Crock. Belg.
In de Koorn-en Bouw-landen.

ORNITHOPUS.

perpuſillus. 609. Ornithopus foliis pinnatis, leguminibus incurvatis. *Sp.* 1049. *n.* 1. *Gelr.* 438. *Friſ.* 311.
Ornithopodium majus. *Baub. pin.* 350. *Comm. boll.* 84. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 124. *ſ.* 2. *t.* 10. *f.* 13.
Vogel-voet, Vogel-pootjes. Belg.
β. Ornithopodium minus. *Baub. pin.* 350. *Comm. boll.* 84.
Ornithopodium perpuſillum. *Dalecb. hiſt.* 487.
γ. Ornithopodium radice tuberculis nodoſa. *Baub. pin.* 350. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 50.
In de Bouw-en Zaai-landen, op dorre zandige plaatſen, by Hillegom, Franeker, Groningen, &c. β. *by* Harderwyk, *op de Heerlykheid* Roozendaal *by* Arnhem; *aan de* Arnhemſe-berg *by* Wageningen; *langs de Wegen in 't Duin by* 's Hage *en* Alkmaar; *in de* Wouden *in* Friesland; *ook by de Wegen omtrent* Zwol.

TRI-

TRIFOLIUM.

610. TRIFOLIUM leguminibus racemoſis nudis diſpermis rugoſis acutis, caule erecto. *Sp.* 1078. *n.* 4. *Gelr.* 434. *Friſ.* 312. *M. officinalis.*
Trifolium odoratum ſ. Melilotus. *Dod. pempt.* 567.
Melilotus officinarum germaniæ. *Baub. pin.* 331. *Comm. boll.* 73.
Welriekende Klaveren, Melote, Mallote. Belg.
β. Melilotus officinarum germaniæ, flore albo. *Baub. pin.* 331. *Comm. boll.* 73.
Witte Mallote. Belg.
In Gelderland *by* Tiel, Zutphen, Doesburg, Twello, &c.; *aan de* Maas-dyk *by* 's Gravezande; *aan de* Muider-dyk *buiten* Amſterdam; *in* Friesland *buiten* Leeuwaarden, *en tuſſchen* Pinjum *en* Witmarſum, *ook op eenige ruige plaatſen in de* Wouden; *en overvloedig langs den* Yſſel-Dyk *buiten* Campen.
Pharm. MELILOTI *flor.*

611. TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente. *Sp.* 1080. *n.* 12. *Gelr.* 431. *Friſ.* 313. *repens.*
Trifolium pratenſe album. *Baub. pin.* 327. *Comm. boll.* 111.
Trifolium pratenſe. *Till. ic.* 103.
Witte Veld-Klaver. Belg.
β. Trifolium quadrifolium hortenſe album. *Baub. pin.* 327. *Boerb. lugdb.* 2 *p.* 31.
Overvloedig in de Wei-landen, en aan Wallen en Wegen.

612. TRIFOLIUM ſpicis globoſis ſubvilloſis, cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis, corollis monopetalis. *Sp.* 1082. *n.* 19. *Gelr.* 433. *Friſ.* 314. *pratenſe.*
Trifolium pratenſe purpureum. *Baub. pin.* 327. *Comm. boll.* 111.
Trifolium pratenſe. *Cam. epit* 582. *Dod. pempt.* 565.
Roode Klaver, Beemd-Klaver. Belg.
Varkens-Klaver Ruſticis.
β. Trifolium purpureum majus, foliis longioribus & anguſtioribus, floribus ſaturatioribus. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 31.

Digitized by Google

By de voorgaande.

arvenſe. 613. TRIFOLIUM ſpicis villoſis ovalibus, dentibus calycinis ſetaceis villoſis æqualibus. *Sp.* 1083. *n.* 5. *Gelr.* 432. *Friſ.* 315.
Trifolium arvenſe humile ſpicatum ſive Lagopus. *Baub. pin.* 328. *Comm. boll.* 112.
Lagopus. *Dod. pempt.* 577.
Haaze pootjes. Belg.
Te Maurik *op den* Bikkelenberg *in de* Betuwe; *langs de Hierder-weg, en in de zandige Bouw-landen buiten* Harderwyk, Zutphen, Haarlem, Alkmaar; *in de Duinen en in 't* Haagſe-Boſch; *in* Friesland *in de* Wouden *omtrent* Bergum, Zuiderhuiſum, Heerenveen, Dragten, *en elders; ook omtrent* Zwol.

reſupinatum. 614. TRIFOLIUM ſpicis ſubovatis, corollis ſupinatis, calycibus inflatis dorſo gibbis, caulibus proſtratis. *Sp.* 1086. *n.* 35. *Gelr.* 429.
Trifolium pratenſe folliculatum. *Bauh. pin.* 329.
Trifolium folliculatum ſ. veſicarium minus purpureum. *Baub. biſt.* 2. *p.* 379.
Aan den Ouden-Yſſel *by* Uilenpas.

fragiferum 615. TRIFOLIUM capitulis ſubrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. *Sp.* 1085. *n.* 37. *Gelr.* 428. *Friſ.* 316.
Trifolium fragiferum friſicum. *Baub. pin.* 329. *Cluſ. cur. app.* 38. *t.* 39. *Comm. boll.* 112.
Trifolium fragiferum. *Vaill. par.* 195. *t.* 22. *f.* 2.
Klaver met Beziën. Belg.
Aard-Beziën Klaver Vulgo.
By de voorgaande, en in de Wei-landen by Zandhorſt, *en op veele plaatſen buiten* Haarlem; *overvloedig langs de Maasſtrand op 't* Nieuwe land; *en in* Friesland, *zoo in de* Wouden *als op de* Kley.

agrarium. 616. TRIFOLIUM ſpicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Sp.* 1087. *n.* 39. *Gelr.* 430.
Trifolium pratenſe luteum, capitulo lupuli vel agrarium. *Baub. pin* 328. *Comm. boll.* 111.
Trifolium agrarium. *Dod. pempt.* 576.

Oed.

Oed. dan. t. 558.
Steen-Klaveren. Belg.
Op ruwe ſteenachtige en zandige gronden buiten Tiel, Harderwyk, Zwol, Campen; *langs de Duinkant buiten* Haarlem *en* 's Hage; *ook in 't* Haagſe-Boſch; *en op de Heereweg by* Haren *buiten* Groningen.

LOTUS.

617. LOTUS leguminibus ſolitariis membranaceo-quadrangulis, caulibus procumbentibus, foliis ſubtus pubeſcentibus. *Sp.* 1086. *n.* 2. *ſiliquoſus.*
Lotus pratenſis ſiliquoſus luteus. *Baub. pin.* 332. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 37.
Langs de Slooten by 's Gravenhage. (*Cel.* SCHWENCKE.)

618. LOTUS capitulis depreſſis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. *Sp.* 1092. *n.* 15. *Gelr.* 427. *Friſ.* 317. *corniculatus.*
Lotus ſive Melilotus pentaphyllos minor glabra. *Baub. pin* 332. *Comm. boll.* 68.
Trifolium corniculatum. 1. *Dod pempt.* 573.
Kleine geboorende Klaveren. Belg.
Juffers-Schoenen. Vulgo.
β. Lotus pentaphyllos, flore majore luteo ſplendente. *Baub. pin.* 332.
Veel op drooge dorre plaatſen by Tiel, Harderwyk, Hattem, Utrecht, Zwol, &c.; *in de Duinen van* Holland; *in zommige Wei-landen, en aan de Wegen in* Friesland. β. *Buiten* Balk *en elders in de* Wouden.

TRIGONELLA.

619. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congeſtis declinatis ſubfalcatis, pedunculo longo ſubſpinoſo, caule erecto. *Sp.* 1094. *n* 4. *corniculata.*
Melilotus corniculis reflexis major. *Baub. pin.* 331. *Comm. boll.* 73.
Trifolium corniculatum 2. *Dod. pempt.* 573.
Geboornde Klaveren. Belg.
In vochtige Wei-landen, en aan de vochtige kanten van de weg tuſſchen Haarlem *en* Overveen.

Digitized by Google

MEDICAGO.

falcata. 620. Medicago pedunculis racemoſis, leguminibus lunatis, caule proſtrato. *Sp.* 1096. *n.* 6. *Gelr.* 437. *Friſ* 318.
Medica flavo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 243.
Trifolium ſylveſtre luteum, ſiliqua cornuta, vel Medica fruteſceus. *Baub. pin.* 330.
Oed. dan. t. 233.
Hier en daar op de Krogbten by 's Hage; *tuſſchen de Akkers aan den weg in* Aſſendorp *in* Overyſſel; *en op zommige Velden en aan de wegen omtrent bet* Heereveen, *en elders in* Friesland.

lupulina. 621. Medicago ſpicis ovalibus, leguminibus reniflormibus monoſpermis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 1097. *n.* 7. *Friſ.* 319.
Trifolium pratenſe luteum, capitulo breviore. *Baub. pin.* 328.
Trifolium pratenſe luteum. *Fucbſ. hiſt.* 819.
Geele Veld-Klaver met kleine boofdjes. Belg.
Op de Krogbten by 's Hage; *in de graspaden op* Zandhorſt; *in de Zaai-landen langs de wegen tuſſchen* Utrecht *en* Maarſſen; *veel op Koornvelden, ook in Wei-en Moes-landen op veele plaatſen in* Friesland.

polymorpha 622. Medicago leguminibus cochleatis, ſtipulis dentatis, caule diffuſo. *Sp.* 1097. *n.* 9. *Friſ.* 320.
a. Medica cochleata dicarpos, capſula ſpinoſa rotunda minore. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 153. *ſ.* 2. *t.* 15. *f.* 11.
Slakken-kruid met Doorntjes. Belg.
In Friesland *by de voorgaande, dog minder in getal.* (Meese.)

CLAS-

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

HYPERICUM.

623. HYPERICUM floribus trigynis, caule quadrato herbaceo. *Sp.* 1104. *n.* 17. *Gelr.* 439. *Friſ.* 321. *quadrangulare.*

Hypericum Aſcyrum dictum, caule quadrangulo. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 382.

Aſcyron. *Dod. pempt.* 78.

Harts-Hooy. Belg.

Op vocht'ge plaatſen langs de Beeken in Gelderland *en* Overysſel; *aan de Duinkanten in* Holland; *in 't* Haagſe-Boſch; *in de* Wouden *in* Friesland; *aan de Kerklaan te* Haren *en elders buiten* Groningen.

624. HYPERICUM floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtuſis pellucido-punctatis. *Sp.* 1105. *n.* 18. *Gelr.* 440. *Friſ.* 322. *perforatum*

Hypericum vulgare. *Baub. pin.* 279. *Comm. holl.* 59.

Hypericum, Perforata, Fuga dæmonum. *Tabern. ic* 864.

St. Jans-kruid. Belg.

Jaagt den duivel. Ruſticis quibusdam.

Aan de kanten der Akkers, en aan de Wegen op veele plaatſen; ook in de Valeyen der Duinen.

Pharm. HYPERICI *herb. flor. ſem.*
Varietatem foliis variegatis vidi circa Uilenpaſſiam.

humifuſum. 625. HYPERICUM floribus trigynis axillaribus ſolitariis, caulibus ancipitibus proſtratis filiformibus, foliis glabris. *Sp.* 1105. *n.* 19. *Gelr.* 630.
Hypericum minus ſupinum, vel ſupinum glabrum. *Baub. pin.* 279.
Hypericum ſupinum III. minimum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 181.
Oed. dan. t. 141.
Klein kruipend St. Jans-kruid. Belg.
By de Sloot achter de Kampen aan 't Veld te Heemze *in* Overysſel.

hirſutum. 626. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ſerrato-glanduloſis, caule tereti erecto, foliis ovatis ſubpubeſcentibus. *Sp.* 1105. *n.* 21.
Hypericum Androſæmum dictum. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 382.
Androſæmum hirſutum. *Baub. pin.* 280. *Comm. holl.* 10.
Androſæmum Aſcyron dictum, caule rotundo hirſuto. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 271. *ſ.* 5. *t.* 6. *f.* 11.
Ruig-Harts-Hooy. Belg.
Op vochtige gronden te Hulſen *by* Nymegen; *in 't Bentveld aan de Duin-beken, en op andere plaatſen buiten* Haarlem; *ook buiten* Alkmaar; *in 't Sticht van* Utrecht *achter de* Bilt; *op de Borgh te* Hemmen *buiten* Groningen.
Planta eſt odorata.
COMMELINUS *confundit ſynonyma hujus & Hyperici quadranguli, nam Aſcyron Dod. ad utramque plantam refert. Deinde Hypericum Aſcyron dictum, caule quadrangulo* J. B. *non eſt Hypericum hirſutum, ſed quadrangulare Linn. Denique Aſcyrum ſive Hypericum bifolium glabrum non perforatum. Baub. pin.* 280. *non eſt Hypericum quadrangulare, ſed montanum Linnæi, qui illud ſpec. pl. edit. Imæ, pro varietate Hyperici hirſuti habuit. Vel forſan una eademque planta a Commelino bis citata eſt, quod eo magis credo, quia locus creſcendi utriusque convenit.*

tomentoſum 627. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ſerrato-

to-glanduloſis, foliis ſemiamplexicaulibus flexuoſis tomentoſis, caulibus proſtratis. *Sp.* 1106. *n.* 22. *Friſ.* 323.

β. Hypericum ſupinum tomentoſum majus & hiſpanicum. *Baub. pin.* 279.

Hypericum ſupinum tomentoſum hiſpanicum. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 181.

In de eerſte opvaart ten Ooſten het Verlaat *by de* Bontebok *in* Friesland. (Meese.)

Digitized by Google

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

TRAGOPOGON.

pratenſe. 628. Tragopogon calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis. *Sp.* 1109. *n.* 1. *Gelr.* 452. *Friſ.* 324.

Tragopogon luteum majus. *Baub. pin.* 274. *Comm. holl.* 111.

Tragopogon. *Dod pempt.* 256.

Boks-baard, *Salſafi*, *Joſephs-bloemen.* Belg. *Morgenſtar.* Quibusdam.

In de Heerlykheid Loenen *en* Hemmen *in de* Betuwe; *hier en daar om* Tiel; *in de Meben by* Harderwyk; *overal in de Duinen; overvloedig aan den* Ryn *by* Leiden; *aan den Lek-dyk by* Wyk te Duurſtede; *aan 't voetpad tuſſchen* Hardenbroek *en* Cothen, *en omtrent* Beverwaart *in 't Sticht van* Utrecht; *aan den Yſſel-dyk by* Campen; *tuſſchen 't Koorn op het* Oude-Bilt *in* Friesland; *en op andere plaatſen.*

Hujus flores omnium primo evigilant, unde ratio nominis belgici Morgenſtar.

porrifolium 629. Tragopogon calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris ſtrictis, pedunculis ſuperne incraſſatis. *Sp.* 1110. *n.* 3. *Friſ.* 325.

Tragopogon purpureo-cæruleum, porri folio, quod

quod Arteſi vulgo. *Baub. pin.* 274. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 8. *ſ.* 7. *t.* 9. *f.* 5.
Aan de kanten der Koorn-landen tuſſchen Beetgum *en* Marſum *in* Friesland.

PICRIS.

630. PICRIS perianthiis laxis, foliis integris, pedunculis ſquamatis in calycem. *Sp.* 1115. *n.* 2. *Gelr.* 448. *Hieracioides.*

Cichorium pratenſe luteum hirſutie asperum. *Baub. pin.* 126. *Comm. boll.* 26.

Hieracium asperum, majoreflore in agrorum limitibus. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 1029. *Moriſ hiſt.* 3. *p.* 69. *ſ.* 7. *t.* 4. *f.* 45.

Aan de kanten der Zaai-landen en by de Wegen omtrent Harderwyk, Hattem, Muiderberg, Zwol, *en elders; ook in de Duinen by* 's Hage.

SONCHUS.

631. SONCHUS pedunculis calycibusque hispidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi ariſtatis. *Sp.* 1116. *n.* 2. *paluſtris.*

Sonchus asper arboreſcens. *Baub. pin.* 124.

Sonchus lævior auſtriacus 5. altiſſimus *Cluſ hiſt.* 2. *p.* 147.

In de Riet-landen by Haarlem; *in de Elsbagen te* Maſtenbroek *in* Overyſſel; *en elders op ongebouwde plaatſen.*

632. SONCHUS pedunculis calycibusque hispidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi cordatis. *Sp.* 1116. *n.* 3. *Gelr.* 454. *Friſ.* 326. *arvenſis.*

Sonchus repens, multis Hieracium majus. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 1017.

Hieracium majus, folio ſonchi, vel Hieracium ſonchites. *Baub. pin.* 126 *Comm. boll* 57.

β. Hieracium majus, folio ſonchi anguſtiore. *Baub. pin.* 126. *Comm. boll.* 58.

Hieracium alterum. *Dod pempt* 639.

In kleyige Koorn-velden en Riet-landen op veele plaatſen; genoeg in de Duinen.

633. SONCHUS pedunculis tomentoſis, calycibus glabris. *Sp.* 1116. *n.* 5. *Gelr.* 453. *Friſ.* 327. *oleraceus.*

α. Son-

α. Sonchus lævis laciniatus latifolius. *Baub. pin.* 124. *Comm. boll.* 107.
Sonchus lævis. *Dod. pempt.* 643.
Haaze-Latouw, *Ganzen-Diſtel*, *Sogge-Diſtel*, *Dauw-Diſtel*, *Haazen-Diſtel.* Belg.
β. Sonchus lævis minor, pauciorbus laciniis. *Baub. pin.* 124.
Sonchus lævis latifolius. *Tabern. ic.* 190.
γ. Sonchus asper laciniatus. *Baub. pin.* 124. *Comm. boll.* 107.
Sonchus asper. *Dod. pempt.* 643.
δ. Sonchus asper non laciniatus. *Tourn. inſt.* 474. *Comm. boll.* 107.
Sonchus aspera. *Fuchſ. biſt.* 674.
ε. Sonchus lævis laciniatus latifolius, flore niveo. *Baub. pin.* 124. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 85.
Op ruwe plaatſen, en in de Moes-landen en Hoven.
Pharm. SONCHI ASPERI & LÆVIS *berb.*

L A C T U C A.

Scariola. 634. LACTUCA foliis verticalibus carina aculeatis. *Sp.* 1119. *n.* 4.
Lactuca ſylveſtris coſta ſpinoſa. *Baub. pin.* 123. *Comm. boll.* 62.
Lactuca ſylveſtris laciniata. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 58. *ſ.* 7. *t.* 2. *f.* 17.
Wilde Salade, *Wilde Latouw.* Belg.
In de Zaai-landen op Muiderberg.

P R E N A N T H E S.

muralis. 635. PRENANTHES floſculis quinis, foliis runcinatis. *Sp.* 1121. *n.* 4. *Gelr.* 441.
Sonchus lævis laciniatus muralis, parvis floribus. *Baub. pin.* 124.
Sonchus lævis vulgatior 2. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 146.
Oed. dan. t. 509.
Veel op de muuren te Schoonhoven *en* Zwol.

L E O N T O D O N.

Taraxacum. 636. LEONTODON calyce ſquamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus. *Sp.* 1122. *n.* 1. *Gelr.* 450. *Friſ.* 328.

Dens

Digitized by Google

Dens leonis latiore folio. *Baub. pin.* 126. *Comm. boll.* 31.
Dens leonis. *Dod. pempt.* 636.
Oed. dan. t. 574.
Paarde-bloem, Honds-bloem, Paapen-kruid, Kanker-bloem, Mol-Salade, Pis in 't bed. Belg.
Paapen-Stoelen. Moſa Trajectinis.
β. Dens leonis anguſtiore folio. *Baub. pin.* 126. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 88.
Veel in de Wei-landen en by de Wegen.
Pharm. TARAXACI *rad. berb.*
Variat etiam foliis magis minusque runcinatis.

637. LEONTODON caule ramoſo, pedunculis ſquamoſis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Sp.* 1123. *n.* 4. *Gelr.* 436. *Friſ.* 329. *autumnale.*
Hieracium, chondrillæ folio glabro, radice ſuccisa majus. *Baub. pin.* 127. *Comm. boll.* 58.
Hieracium quartum. *Dod. pempt.* 639.
β. Hieracium chondrillæ folio glabro, radice ſuccisa minus. *Baub. pin.* 128. *Comm. boll.* 58.
Hieracium quintum. *Dod. pempt.* 639.
In de Koorn- en Weilanden op veele plaatſen; ook in 't Haagſe-Boſch.

638. LEONTODON calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis hiſpidis: ſetis furcatis. *Sp.* 1124. *n.* 8. *hiſpidum.*
Hieracium, caule aphyllo, hirſutum. *Baub. biſt.* 2. *p.* 1038.
Hieracium dentis leonis folio, caulibus aphyllis glabris. *Dill. Eph. nat. cur. Cent. VI. app. p.* 62. *t.* 9. *f.* 18.
Picris nudo caule unifloro, foliis asperis dentatis. *Hall. biſt.* 25.
In de Weiden en andere met gras begroeide plaatſen in de Provincien Holland *en* Utrecht, *en buiten* Franeker; *zeer gemeen in de Weiden aan de Duinkant buiten* Leiden, *zoo dat 'er bet Duingras dikwils maar al te veel mede bezet is, als men bet tot graspaden wil gebruiken.*

HIERACIUM.

639. HIERACIUM foliis integerrimis ovatis ſubtus *Piloſella.*

tomentoſis, ſtolonibus repentibus, ſcapo unifloro. *Sp.* 1125. *n.* 4. *Gelr.* 444. *Jngr.* 124. *Friſ.* 330.
Piloſella major repens hirſuta. *Baub. pin.* 262. *Comm. boll.* 87.
Piloſella major. *Cam. epit.* 709.
Muizen-Oor, Nagel-kruid. Belg.
Overvloedig op booge zandige plaatſen in Gelderland, Utrecht *en* Overyſſel; *in de Duinen by* 's Hage, Haarlem, *en elders*; *in de* Wouden *in* Friesland; *in 't* Goreght *by* Groningen *aan de dykjes; en elders.*

Auricula. 640. Hieracium foliis integerrimis lanceolatis, ſtolonibus repentibus, ſcapo nudo multifloro. *Sp.* 1126. *n.* 6.
Piloſella major erecta altera. *Baub.* 262.
In de Duinen tuſſchen Hartecamp *en de Zee.* (*Linn. b. Cliff.* 388.)

murorum. 641. Hieracium caule ramoſo, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minori. *Sp.* 1128. *n.* 17.
Hieracium murorum, folio piloſiſſimo. *Baub. pin.* 129. *Comm. boll.* 58.
Pulmonaria gallica mas. *Tabern. biſt.* 504.
Franſch Longe-kruid. Belg.
Aan de Oude muuren der Stad Utrecht, *en op meer plaatſen*; *by de* Mickelhorſt *aan de weſtkant buiten* Groningen.

paludoſum. 642. Hieracium caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hiſpidis. *Sp.* 1129. *n.* 18. *Jngr* 123. *Friſ.* 331.
Hieracium montanum latifolium glabrum minus. *Baub. pin.* 129. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 69. *ſ.* 7. *t.* 5. *f.* 47.
Klein Berg-Haviks-kruid. Belg.
Aan de agterkant ten Noord-weſten op de Bergummer-heide *in* Friesland.

umbellatum. 643. Hieracium foliis linearibus ſubdentatis ſparſis, floribus ſubumbellatis. *Sp.* 1131. *n.* 28. *Gelr.* 443. *Jngr.* 124. *Friſ.* 332.
Hieracium fruticoſum anguſtifolium majus. *Baub. pin.* 129. *Comm. boll.* 58. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 69. *ſ.* 7. *t.* 5. *f* 66.
Gemeen groot Haviks-kruid. Belg.

Veel

Digitized by Google

Veel aan de dykjes en kanten der Wegen op den Eſſenburg *buiten* Harderwyk; *en omtrent* Zwol; *op de Duinen buiten* 's Hage *en* Haarlem; *in de* Wouden *in* Friesland; *aan de Heereweg en Ooſtweg by* Haren *buiten* Groningen, *en op andere plaatſen.*

CREPIS.

644. CREPIS foliis lanceolato-runcinatis ſeſſilibus lævibus: inferioribus dentatis. *Sp.* 1135. *n.* 13. *Gelr.* 445. *tectorum.*

α. Hieracium chondrillæ folio hirſutum. *Baub. pin.* 127.

Hieracium II. *Tabern. biſt.* 491. *bene.*

Hieracium foliis & facie chondrillæ. *Lob. ic.* 239.

β. Cichorium pratenſe luteum lævius. *Baub. pin.* 126. *Comm. boll.* 26.

Dens leonis tertia ſpecies. *Dod. pempt.* 636.

Oed. dan. t. 501.

Wilde Cicorey Belg.

α. In de Herkeloer-Waard *in* Overyſſel. β. *Veel op vochtige plaatſen omtren* Amſterdam *en* Utrecht; *ook op de Duinen tuſſchen de Heide.*

HYOSERIS.

645. HYOSERIS caule diviſo nudo, pedunculis incraſſatis. *Sp.* 1138. *n.* 5. *Gelr.* 449. *minima.*

Hyoſeris anguſtifolia. *Tabern. ic.* 180. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 93.

Hieracium minus, folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 127. *Comm. boll.* 58.

Hieracium minimum. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 142.

Oed. dan. t. 201

Veel in de Koorn-landen by Uilenpas, *in* Tonzel *by* Harderwyk, *op* Muiderberg, *en op de Duinen agter* Zorgvliet *by* 's Hage.

HYPOCHÆRIS.

646. HYPOCHÆRIS glabra, calycibus oblongis imbricatis, caule ramoſo nudo, foliis dentato-ſinuatis. *Sp.* 1140. *n.* 3. *glabra.*

Hy-

Hypochæris chondrillæ folio, parvo flore. *Vaill. act.* 1721. *p.* 214.
Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo glabro. *Baub. pin.* 127.
Oed. dan. t. 424.
In de zandige Zaai-landen by Zandhorſt, Teilingen, *'t Huis te* Marquette, *en elders in* Holland, *dog nergens in Kley-landen.* (*Nob.* D. FABRICIUS SIX.)
Solet eſſe glaberrima, interdum tamen villos raros in pagina ſuperiore foliorum exbibet.

radicata. 647. HYPOCHÆRIS foliis runcinatis obtuſis ſcabris, caule ramoſo nudo lævi, pedunculis ſquamoſis. *Sp.* 1140. *n.* 4. *Gelr.* 447. *Friſ.* 333.
Hieracium, dentis leonis folio obtuſo, majus. *Baub. pin.* 127. *Comm. boll.* 58. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 66. *ſ.* 7. *t.* 4. *f.* 27.
Hieracium longius radicatum. *Lob. biſt.* 120.
Oed. dan. t. 150.
Op de Duinen agter Zorgvliet; *in de zandige velden, en by de Wegen buiten* Harderwyk, Haarlem, Utrecht, Zwol; *in* Friesland *omtrent* Balk, Wykel, Gorradyk, Dragten, *en elders.*

LAPSANA.

communis. 648. LAPSANA calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramoſiſſimis. S*p.* 1141. *n.* 1. *Gelr.* 455. *Friſ.* 334.
Lampſana. *Dod. pempt.* 675.
Soncho affinis, Lampſana domeſtica. *Baub. pin.* 124. *Comm. boll.* 107.
Oed. dan. t. 500.
By de Wegen, en in de Bouw-landen.

CICHORIUM.

Intybus. 649. CICHORIUM floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis. *Sp.* 1142. *n.* 1. *Gelr.* 456.
Cichorium ſylveſtre ſive officinarum. *Baub. pin.* 126. *Comm. boll.* 25.
Intybus ſylveſtris. *Cam. epit.* 285.
Suikerey of *Cicorey.* Belg.
β. Cichorium ſylveſtre, flore cæruleo, caule pur-
pu-

pureo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 91.

γ. Cichorium ſylveſtre, flore albo. *Baub. pin.* 126. *Boerh lugdb.* 1. *p* 91.

δ. Cichorium ſylveſtre, flore roſeo. *Baub. pin.* 126. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 91.

In de braakleggende Koorn-velden op veele plaatſen; op de Zaai-landen in de Duinen; overvloedig aan den Yſsel-*en* Lek-dyk, *en door de gantſche* Betuwe *en* Tielerwaard; *ook aan den ingang van de Sypel by* Harderwyk; *op de Veſting by de Geeſter-poort te* Alkmaar, *en elders. γ. Overvloedig op* Zuideras *en by 't Dorp* Brummen *buiten* Zutphen.

Pharm. CICHOREI SYLVESTRIS *rad. herb. ſem.*

A R C T I U M.

650. ARCTIUM foliis cordatis inermibus petiolatis. *Sp.* 1143. *n.* 1. *Gelr.* 457. *Friſ.* 335. *Lappa.*

Lappa major; Arctium dioſcoridis. *Baub. pin.* 198. *Comm. holl.* 63. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 146. *ſ.* 7. *t.* 32. *f.* 1.

Kliſſen, Klaſſen, Klitten. Belg.

Startoffen. Enchuſanis.

Kladde-wortel. Quibusdam.

β. Lappa major montana, capitulis tomentoſis. *Baub. pin.* 198. *Comm holl.* 63.

Berg-Klitten. Belg.

Overvloedig by de dyken en wegen, en op ruwe plaatſen. β. Op de Veſten der Stad Amſterdam, *tuſſchen de Muider en Utrechtſe Poorten; en in de Botſtraat te* Enckhuiſen.

Pharm. BARDANÆ *rad. ſem.*

S E R R A T U L A.

651. SERRATULA foliis dentatis ſpinoſis. *Sp.* 1149. *n.* 16. *Gelr.* 462. *Friſ.* 336. *arvenſis.*

Carduus vinearum repens, ſonchi folio. *Baub. pin.* 377. *prodr.* 156.

Carduus in avena proveniens. *Baub. pin.* 377. *Comm. holl.* 21.

Ceonanthos theophraſti. *Col. ecphr.* 45. *t.* 45.

Haver-Diſtel. Belg.

β. Carduus in avena proveniens, flore albo. *Baub. pin.* 377.

Digitized by Google

In de Bouw-landen op verſcheide plaatſen.

CARDUUS.

lanceolatus 652. CARDUUS foliis decurrentibus pinnatifidis hiſpidis: laciniis divaricatis, calycibus ovatis ſpinoſis villoſis, caule piloſo. *Sp.* 1149. *n.* 2. *Gelr.* 459.

Carduus lanceolatus latifolius. *Baub. pin.* 385. *Comm. boll.* 21.

Carduus lanceolatus ſ. ſylveſtris dodonæi. *Baub. biſt.* 3. *p.* 58.

Carduus lanceolatus *Tabern. ic.* 699.

β. Carduus lanceolatus latifolius, flore albo. *Tourn. inſt.* 440.

Langs de Wegen en Paden buiten Haarlem, *en op andere plaatſen.* β. *Buiten* Alkmaar *by* Egmond op den Hoef.

COMMELINUS *non recte ſynonymum J. Baub. ab hac planta ſeparavit.*

nutans. 653. CARDUUS foliis ſemidecurrentibus ſpinoſis, floribus cernuis: ſquamis calycinis ſuperne patentibus. *Sp.* 1150. *n.* 3. *Gelr.* 460.

Carduus ſpinoſiſſimus latifolius ſphærocephalus vulgaris. *Baub. pin.* 385.

Carduus nutans. *Baub. biſt.* 3. *p.* 56.

Carduus alatus major, flore rubro moſchato, capite nutante. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 152. *ſ.* 7. *t.* 31. *f.* 6.

Cirſium majus ſingulari capitulo magno. C. B. *Comm boll.* 27.

Veel aan de Wegen en Dyken in 't Graafſchap Zutphen, *en by* Arnhem; *by* Twello *op de* Veluwe; *aan de Duinkant by* 's Hage *en* Haarlem; *aan de* Lek-dyk; *en elders.*

Varietatem flore roſeo legi circa pagum Elſt inter Neomagum & Arnbemiam.

acanthoides 654. CARDUUS foliis decurrentibus ſinuatis: margine ſpinoſis, calycibus pedunculatis ſolitariis erectis villoſis. *Sp.* 1150. *n.* 4.

Carduus polyacanthos. *Schreb. ſpicileg.* 915.

Polyacantha theophraſti. *Tabern. ic.* 701. *fig. bona.*

Aan de Wegen, veel buiten Doesburg.

Af-

Affinis ſequenti Carduo criſpo, & hinc forſan pro eodem habitus. Synonyma J. Bauhini ab Ill. Linnæo ad hunc et ſequentem Carduum relata dubia ſunt.

655. CARDUUS foliis decurrentibus ſinuatis: margine ſpinoſis, floribus aggregatis terminalibus: ſquamis inermibus ſubariſtatis patulis. *Sp.* 1150. *n.* 5. *Gelr.* 463 *Friſ.* 337. *criſpus.*
Carduus ſpinoſiſſimus anguſtifolius vulgaris. *Baub. pin.* 385. *Comm. holl.* 21. *Loeſ. pruſſ.* 34. *t.* 5.
β. Carduus ſpinoſiſſimus anguſtifolius, flore albo. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 136.
γ. Idem flore carneo.
In de Moes-hoven, by de Wegen, en op oude Muuren. γ. *Aan de Bronsbergen buiten* Zutphen.

656. CARDUUS foliis decurrentibus dentatis: margine ſpinoſis, floribus racemoſis erectis, pedunculis inermibus. *Sp.* 1151. *n.* 6. *Gelr.* 631. *Friſ.* 338. *paluſtris.*
Carduus paluſtris. *Baub. pin.* 377. *prodr.* 156.
Carduus ſpinoſiſſimus erectus anguſtifolius paluſtris. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 153. *ſ.* 7. *t.* 32. *f.* 13.
Kaale Jonker, Boeren-Rottingen. Ruſticis.
In ſlegte Wei-landen in 't Graafſchap Zutphen, Friesland, Overyſſel; *in de Duin-valeyen van* Raaphorſt, *en by 't Huis te* Marquette; *ook langs de Slooten op veele plaatſen.*

657. CARDUUS foliis amplexicaulibus haſtato-pinnatifidis ſpinoſis, calycibus aphyllis: ſpinis canaliculatis duplicato-ſpinoſis. *Sp.* 1153. *n.* 14. *Gelr.* 461. *marianus.*
Carduus albis maculis notatus vulgaris. *Baub. pin.* 381. *Comm holl.* 21.
Carduus mariæ. *Dalech. hiſt.* 1475.
Silybum nervis foliorum albis. *Hall. hiſt.* 181.
Marien-Diſtel, Onze Vrouwe-Diſtel, Melk-Diſtel Belg.
In de Moes-hoven en by de Wegen.
Pharm. CARDUI MARIÆ *ſem.*

658. CARDUUS foliis amplexicaulibus lanceolatis integris laciniatisque, caule ſubunifloro, calyce inermi. *Sp.* 1154. *n.* 20. *Ingr.* 128. *Friſ.* 339. *heterophyllus.*

Cirſium maximum, aſphodeli radice. *Baub. pin.* 377.
Oed. dan. t. 160.
Overvloedig in de laage Veenachtige Wei-landen en andere Velden tuſſchen Tjetjerk *en* Bergum, *en elders in de* Wouden *in* Friesland; *in Heivelden, op de* Mickelhorſt *en elders buiten* Groningen; *ook aan de Kleverlaan by* Haarlem.

acaulis. 659. Carduus acaulis, calyce glabro. *Sp.* 1156. *n.* 26.
Carlina acaulos, minore purpureo flore. *Baub. pin.* 380. *Comm. boll.* 23.
Chamæleon exiguus. *Trag. biſt.* 852. *Baub. biſt.* 3. *p.* 62.
Ever-wortel. Belg.
Op ruwe ſteenachtige plaatſen.

CNICUS.

oleraceus. 660. Cnicus foliis pinnatifidis carinatis nudis; bracteis concavis integris ſubcoloratis. *Sp.* 1156. *n.* 1.
Carduus pratenſis latifolius. *Baub. pin.* 376. *Comm. boll.* 20.
Carduus pratenſis. *Lob. ic.* 2. *p.* 11.
Beemdt- of *Veld-Diſtel.* Belg
In vochtige Wei-landen en Velden buiten Utrecht.

ONOPORDUM.

Acanthium. 661. Onopordum calycibus ſquarroſis: ſquamis patentibus, foliis ovato-oblongis ſinuatis. *Sp.* 1158. *n.* 1. *Gelr.* 458.
Spina alba tomentoſa latifolia ſylveſtris. *Baub. pin.* 382. *Comm. boll.* 108. *Loeſ. pruſſ.* 261. *t.* 82.
Acanthium. *Dod. pempt.* 721.
Witte Weg-Diſtel Belg.
Op ruwe plaatſen by Nymegen, Harderwyk, Rhenen; *en aan het opgaan van de Duinen by* Overveen *buiten* Haarlem.

illyricum. 662. Onopordum calycibus ſquarroſis: ſquamis inferioribus uncinatis, foliis lanceolatis pinnatifidis. *Sp.* 1158. *n.* 2.

Spi-

Spina tomentoſa altera ſpinoſior. *Baub. pin.* 382.
Carduus tomentoſus acanthi folio anguſtiore. *Tourn. inſt.* 441. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 137.
Carduus, quibusdam dictus Acanthium illyricum. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 55.
† *Volgens* BOERHAAVE.

CARLINA.

663. CARLINA caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus, calycibus radio albo. *Sp.* 1161. *n.* 4. *Gelr.* 158. *Friſ.* 340. *vulgaris.*
Carlina ſylveſtris vulgaris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 155.
Cnicus ſylveſtris ſpinoſior. *Baub. pin.* 378. *Comm. boll.* 27.
Drie-Diſtel, Wilde Veld-Saffraan. Belg.
In de Duinen by 's Hage, Weſterhout, Raaphorſt, Heemſtede, &c *ook in ſlegte landen by* Uilenpas, Zwol, *in* Friesland; *en elders.*

BIDENS.

664. BIDENS foliis trifidis, calycibus ſubfolioſis, ſeminibus erectis. *Sp.* 1165. *n.* 1. *Gelr.* 467. *Friſ.* 341. *tripartita.*
Cannabina aquatica, folio tripartitim diviſo. *Baub. pin.* 321. *Comm. boll.* 20.
Hepatorium aquatile. *Dod. pempt.* 595.
Water-Boelkens-kruid. Belg.
Aan de kanten der Slooten en Graften, in Moeraſſen, en andere vogtige plaatſen.

665. BIDENS foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, ſeminibus erectis. *Sp.* 1165. *n.* 5. *Gelr.* 632. *Friſ.* 342. *cernua.*
Cannabina aquatica, folio non diviſo. *Baub. pin.* 321. *Comm. boll.* 20.
Eupatorium cannabinum chryſanthemum. *Tabern. ic.* 117.
In en aan de Slooten om de Stads-Weide by Harderwyk; *in 't* Haagſe-Boſch; *by* Zandhorſt, Marquette; *tuſſchen* Haarlem *en* Overveen; *by* Bergen *buiten* Alkmaar; *en op andere plaatſen by de voorige, dog veel minder.*

EUPATORIUM.

cannabinum. 666. Eupatorium foliis digitatis. *Sp.* 1173. *n.* 12. *Gelr.* 465. *Jngr.* 130. *Friſ.* 343.
Eupatorium cannabinum. *Baub. pin.* 320. *Comm. boll.* 36.
Hepatorium vulgare. *Dod. pempt* 28.
Boelkens-kruid, Koninginne-kruid. Belg.
Aan de kanten der ſlooten op veele plaatſen.
Pharm. Eupatorii cannabini *herb.*

POLYGAMIA SUPERFLUA.

TANACETUM.

vulgare. 667. Tanacetum foliis bipinnatis inciſis ſerratis. *Sp.* 1184. *n.* 7. *Gelr.* 466. *Friſ.* 344.
Tanacetum vulgare luteum. *Baub. pin.* 132. *Comm. boll.* 109.
Athanaſia ſive Tanacetum. *Dalech. hiſt.* 955.
Rynvaar, Boere-Worm-kruid. Belg.
Veel langs de Wegen.
Pharm. Tanaceti *herb. flor. ſem.*

ARTEMISIA.

campeſtris. 668. Artemisia foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *Sp.* 1185. *n.* 4.
Artemiſia tenuifolia. *Dod. pempt.* 33.
Artemiſia tenuifolia ſeu leptophyllos, aliis abrotanum ſylveſtre. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 194. *Comm. boll.* 13.
Abrotanum campeſtre, cauliculis rubentibus. *Baub. pin.* 136.
Wild-Averuit of *Averone.* Belg.
β. Abrotanum campeſtre, cauliculis albicantibus. *Baub. pin.* 136. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 127.
Langs de zandige Wegen by Arnhem, Wageningen, Rhenen, &c. *in 't hangen der Duinen by* Overveen, *en naar* Velſen.

maritima. 669. Artemisia foliis multipartitis tomentoſis, race-

cemis cernuis, floſculis femineis ternis. *Sp.* 1186. *n.* 7. *Friſ.* 345.
Abſinthium ſeriphium belgicum. *Baub. pin.* 139. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 178. *Comm. holl.* 3.
Zee-Alſem. Belg.
Overvloedig langs de Zee-en Maas-ſtrand achter 's Gravezande; *op 't* Koegras *by de* Helder; *aan de Zee-Dyken van* Noord-Holland *en* Friesland; *en langs 't Zee-ſtrand te* Delfzyl.

670. ARTEMISIA foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis: receptaculo villoſo. *Sp.* 1188. *n.* 14. *Gelr.* 472. *Abſinthium*
Abſinthium ponticum ſeu romanum officinarum ſeu dioſcoridis. *Baub. pin.* 138. *Comm. holl.* 3.
Abſinthium. *Cam. epit.* 452.
Alſem. Belg.
β. Abſinthium inſipidum, abſinthio vulgari ſimile. *Baub. pin.* 139. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 126.
Abſinthium inodorum & inſpidum. *Dod. pempt.* 26.
Alſem zonder reuk en ſmaak. Belg.
Overvloedig in Gelderland *by* Genderingen, Uilenpas, *'t* Velde, Zuideras, Oen, Welſum, &c. *In* Holland *buiten* Haarlem, Naarden, *en langs de Zee-dyken achter* 's Gravezande; *in 't Sticht van* Utrecht *omtrent* Doorn, Drybergen, Leerſum; *in de Provintie* Groningen *aan de Ooſtkant van* Helper; *en elders op dorre plaatſen.*
Pharm. ABSINTHII *herb. ſumm. ſem.*

671. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis inciſis ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro. *Sp.* 1188. *n.* 16. *Gelr.* 471. *Friſ.* 346. *vulgaris.*
Artemiſia vulgaris major. *Baub. pin.* 137. *Comm. holl.* 13.
Artemiſia latifolia. *Dod. pempt.* 33.
Byvoet. Belg.
Krabbe-Klootjes. Harderovicenis.
β. Artemiſia vulgaris major, caule ex viridi albicante. *Baub. pin.* 137. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 127.
Overvloedig buiten Tiel, Zutphen, Harderwyk, Naarden, Haarlem, Alkmaar, Utrecht *by* Zeiſt, &c. *In* Friesland *omtrent* Joure, Langweer, *en elders in de* Wouden *ook in de andere Provintien.*

Pharm Artemisiæ *herb.*
Fumo hauritur a pueris ut Nicotiana.

cœruleſcens 672. Artemisia foliis caulinis lanceolatis integris: radicalibus multifidis, floſculis femineis ternis. *Sp.* 1189. *n.* 18.
Abſinthium maritimum lavendulæ folio. *Baub. pin.* 139. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 7. *ſ.* 6. *t.* 1. *f.* 5.
Langs het Zee - en Maas - ſtrand in Delfland. (*Cel.* Schwencke)

GNAPHALIUM.

luteo-album 673. Gnaphalium herbaceum, foliis ſemiamplexicaulibus enſiformibus repandis obtuſis utrinque pubeſcentibus floribus, conglomeratis. *Sp.* 1196. *n.* 23. *Gelr.* 634. *Friſ.* 349.
Gnaphalium majus, lato oblongo folio. *Baub. pin.* 263. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 88. *ſ.* 7. *t.* 11. *f.* 20.
Gnaphalium ad ſtoechadem citrinam accedens. *Baub. biſt.* 3. *p.* 160.
Elichryſum ſylveſtre latifolium, capitulis conglobatis. *Baub. pin.* 264. *Comm. boll.* 33.
Stink - bloem, Zevenjaars - bloem. Belg.
Buiten Leiden *tuſſchen* Katwyk *en* Noordwyk; *aan 't Zand-pad tuſſchen* Cothen *en* Hardenbroek *in 't Sticht van* Utrecht; *op ongebouwd Kleiland te* Oldonniel *in* Overyſſel; *aan de wegen en dykjes by* Nye Mirdum *in* Friesland.

dioicum. 674. Gnaphalium ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici, floribus diviſis. *Sp.* 1199. *n.* 35. *Gelr.* 468. *Ingr.* 132. *Friſ.* 347.
mas. β. Gnaphalium montanum, flore rotundiore. *Baub. pin.* 263. *Comm. boll.* 45.
Piloſella minor. *Dod. pempt.* 68. *fig. exterior.*
femina. γ. Gnaphalium montanum, longiore & folio & flore. *Baub. pin.* 263.
Piloſella minor. *Dod. pempt.* 68. *fig. interior.*
Katte - voet. Belg.
Rooze - kransjes. Zutphanienſibus.
Zevenjaars - bloem. Vulgo.
Veel op de Heide in Gelderland *en* Overyſſel; *in de laagtens van de Zee - Duinen agter* Zorgvliet; *op de*

de Duinachtige heuvelen by Bredenrode *buiten* Haarlem; *aan de* Bilt *buiten* Utrecht; *in een Boſch by* Bergum, *en op andere plaatſen in de* Wouden *in* Friesland; *in 't Heide-veld by* Harender-moolen *buiten* Groningen.

Variat corollæ colore ſubpurpureo, ſuave rubente, candido, & variegato.

Tranſyſalani oleum floribus infuſum vulneribus recentibus inugunt.

675. GNAPHALIUM caule herbaceo ſimpliciſſimo erecto, floribus ſparſis. *Sp.* 1200. *n.* 39. *Gelr.* 633. *Friſ.* 351. *ſylvaticum.*

Gnaphalium majus, anguſto oblongo folio, alterum. *Baub. pin.* 263.

Gnaphalium rectum. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 160.

Oed. dan. t. 254.

By Uilenpas *in de Klaver-landen; in de Boſſchen by* Marquette; *te* Emmen *in* Overysſel; *omtrent* Zumeer *en* Bergum, *als elders in de* Wouden *in* Friesland, *op Heide-velden, en aan zommige wegen en wallen.*

676. GNAPHALIUM caule herbaceo ramoſiſſimo diffuſo, floribus confertis terminalibus. *Sp.* 1200. *n.* 41. *Gelr.* 470. *Friſ.* 350. *uliginoſum.*

Gnaphalium medium. C. B. *Comm. holl.* 45.

Gnaphalium annuum ſerotinum, capitulis nigricantibus in humidis gaudens. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 92.

Gnaphalio vulgari ſimilis. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 159.

Klein Reur-of Roer-kruid. Belg.

Op vochtige plaatſen by Zelhem, Uilenpas, Harderwyk, *en elders in* Gelderland; *by de* Bilt *buiten* Utrecht; *op de* Kley *en in de* Wouden *in* Friesland; *ook omtrent* Zwol.

Ill. LINNÆUS *in Flor. belg.* Gnaphalium medium C. B. *Comm. holl.* 45. *habet pro* Filagine arvenſi; ſed autopſia hanc eſſe plantam docet.

C O N Y Z A.

677. CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymboſo, calycibus ſquarroſis. *Sp.* 1205. *n.* 1. *ſquarroſa.*

Conyza major vulgaris. *Baub. pin.* 265.

Donder-kruid. Belg.
Veel buiten 's Hage.

E R I G E R O N.

canadenſe. 678. ERIGERON caule floribus paniculatis, hirtis, foliis lanceolatis ciliatis. *Sp.* 1214. *n.* 5. *Gelr.* 475.
Conyzella. *Dill. giſſ.* 160. *gen.* 142.
Conyza annua acris alba elatior, linariæ foliis. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 115. *ſ.* 7. *t.* 20. *f.* 29. *Bocc. ſicc.* 85. *t.* 46.
Langs de wegen by Arnhem, Harderwyk, Duurſtede; *in de Duinen van* Raaphorſt, *en tuſſchen* Velſen *en* Beverwyk; *op de Muuren te* Haarlem, &c.
Quotannis vulgatius.

acre. 679. ERIGERON pedunculis alternis unifloris. *Sp.* 1211. *n.* 9. *Gelr.* 474.
Conyza cærulea acris. *Baub. pin.* 265. *Comm. holl.* 28.
Amellus montanus æquilocorum. *Col. ecpbr.* 2. *p.* 25. *t.* 26.
Blaauw bytend Donder-kruid. Belg.
In de Koorn-velden, ook wel op oude Muuren omtrent Haarlem *en* Utrecht; *in de Duinen tuſſchen* 's Hage *en het Huis ten* Deil *by de Hofſtede* Eikenhorſt; *by* Overveen, *en elders.*

T U S S I L A G O.

Farfara. 680. TUSSILAGO ſcapo unifloro imbricato, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. *Sp.* 1214. *n.* 5. *Gelr.* 475. *Friſ.* 353.
Tuſſilago vulgaris. *Baub. pin.* 197. *Comm. holl.* 113.
Tuſſilago. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 163. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 130. *ſ.* 7. *t.* 12. *f.* 1.
Oed. dan. t. 595.
Hoefblad, Paarden-klaauw. Belg.
Op veele plaatſen, alwaar klei-grond is, in de Bouwlanden en aan de Dyken.
Pharm. TUSSILAGINIS *rad. herb.*

hybrida. 681. TUSSILAGO thyrſo oblongo, floſculis femineis

nudis plurimis. *Sp.* 1214. *n.* 8. *Gelr.* 478. *Friſ.* 351.

Petaſites major, floribus pediculis longis inſidentibus. *Dill. eltb.* 309. *t.* 32. *f.* 297.

Peſtilentie-wortel, Dokke-bladen. Belg.

Podde-bladen. Vulgo.

Te Arnhem *op de* Glacis, *te* Weſtervoort *op de Schans*; *by* Harderwyk *in de Weiſteeg aan de Hoven, en omtrent* Biſel; *aan de Vaart tuſſchen* Rotterdam *en* Overſchie; *en by* Delft; *buiten* Utrecht *tuſſchen* Breukelen *en de* Nieuwerſluis; *in* Friesland *by* Herbajum, Dron-Ryp, *overvloedig aan 't Bolwerk te* Leeuwaarden; *aan de dykjes in de witteſteeg te* Haren *by* Groningen.

682. TUSSILAGO thyrſo ovato, floſculis femineis nudis paucis. *Sp.* 1215. *n.* 9. *Gelr.* 477. *Petaſites.*

Petaſites major & vulgaris. *Baub. pin.* 197. *Comm. boll* 87

Petaſites. *Dod. pempt.* 597.

Belg. ut præcedens.

Aan de Dyken en Wegen om Tiel, *en in 't Stift* Sennewynen *in de* Tielerwaard; *in de landen agter* Hierden *buiten* Harderwyk, *by 't Dorp* Voorſt *op de* Veluwe; *aan den Dyk by* Rotterdam *en* Gouda; *te* Elshout *over* Krimpen aan de Lecq; *buiten* Haarlem *aan de Haazepaterslaan.*

Pharm. PETASITIDIS *rad.*

Locus creſcendi inter Breukelen & Nieuwerſluis *a Commelino adſignatus pertinet ad præcedentem plantam.*

SENECIO.

683. SENECIO corollis nudis, foliis pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, floribus ſparſis. *Sp.* 1216. *n.* 7. *Gelr.* 483. *Friſ.* 355. *vulgaris.*

Senecio minor vulgaris. *Baub. pin.* 131. *Comm. boll.* 105.

Erigerum minus. *Dod. pempt.* 641.

Oed. dan. t. 513.

Klein Grind-kruid, Kruis-kruid, Kruis-wortel. Belg.

Schaaps-teentjes. Moſa-Trajectinis.

Zeer gemeen in de Moes-boven, en Zaai-landen, en

en by de Wegen.
Pharm. Senecionis *herb.*

viſcoſus. 684. Senecio corollis revolutis, foliis pinnatifidis viſcidis, ſquamis calycinis laxis longitudine perianthii. *Sp.* 1217. *n.* 12. *Friſ.* 356.
Senecio incanus pinguis. *Baub. pin.* 131. *Comm. holl.* 105.
Senecio hirſutus viſcidus graveolens. *Dill. elth.* 347. *t.* 258. *f.* 336.
Erigerum primum. *Dod. pempt.* 640.
Stinkend Kruis-kruid. Belg.
Veel aan de St. Antonis-Dyk *buiten* Amſterdam, *en aan de* Zwart-Waters-dyk.

ſylvaticus. 685. Senecio corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboſo erecto. *Sp.* 1217. *n.* 13.
Senecio minor, latiore folio, ſive montanus. *Baub. pin.* 131. *Dill. elth.* 258. *t.* 258. *f.* 337.
Jacobæa, ſenecionis folio incano, perennis. *Raj. hiſt.* 285. *Hall. jen.* 177. *t.* 3.
In Holland *niet zeldzaam: word gevonden in de Boſſchen van de Hofſteden* Zandhorſt *en* Marquette, *en in de Zaai-landen by 't Dorp* Heemskerk *in* Noord-Holland, *en by 't Huis te* Teilingen. (*Nob.* D. Fabricius Six.)
Anteceſſores de hac planta mentionem non fecerunt forſan quod eam confuderunt cum ſenecione viſcoſa.

Jacobæa. 686. Senecio corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. *Sp.* 1219. *n.* 25. *Gelr.* 482. *Friſ.* 357.
Jacobæa vulgaris laciniata. *Baub. pin.* 131. *Comm. holl.* 60.
Jacobæa. *Dod. pempt.* 642.
St. Jacobs-kruid. Belg.
Grondheel. Groninganis.
β. Senecio jacobææ folio. *Moriſ. bleſ.* 309. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 117.
Overvloedig in de Wei-landen. β. *Op dorre zand-gronden.*
Varietas β. *ex natura ſoli provenit, nequaquam igitur pro diſtincta ſpecie, multo minus alio genere*

ha-

habenda cum Matthiolo & aliis. Conf. Baub. hiſt. 3. *p.* 1057.

Varietatem foliis variegatis legi circa Uilenpaſſiam.

687. SENECIO corollis radiantibus, foliis enſiformibus acute ſerratis ſubtus ſubvilloſis, caule ſtricto. *Sp.* 1220. *n.* 29. *Gelr.* 635. *paludoſus.*

Jacobæa foliis longis integris & mucronatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 110. *ſ.* 7. *t.* 19. *f.* 22.

Conyza paluſtris ſerratifolia. *Baub. pin.* 266.

Oed. dan. t. 385.

Hier en daar in de Kolken buiten Tiel; *aan den* Ryn *by* Maurik *in de* Betuwe; *in de Droogmakeryen by* Rotterdam, *en elders; aan de binnen Kolken te* Herkeloo *in* Overyſſel.

688. SENECIO corollis radiantibus, floribus corymboſis, foliis lanceolatis ſerratis glabriuſculis. *Sp.* 1221. *n.* 32. *Gelr.* 481. *ſaracenicus.*

Solidago ſaracenica. *Dod. pempt.* 141. *Fuchſ. hiſt.* 728. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 1062.

Virga aurea anguſtifolia ſerrata. *Baub. pin.* 268. *Comm. holl.* 115.

Heidens Wond-kruid. Belg.

Janekley. Quibusdam.

Veel aan de Waal-Dyk *by* Nymegen *en* Tiel; *aan de* Maas-Dyken; *en aan den* Yſſel-Dyk *by* Gouda, Deventer, Zwol, Campen, &c.

Pharm. SOLIDAGINIS SARACENICÆ *herb.*

A S T E R.

689. ASTER foliis lanceolatis integerrimis carnoſis glabris, ramis inæquatis, floribus corymboſis. *Sp.* 1226. *n.* 9. *Gelr.* 484. *Friſ.* 358. *Tripolium.*

Tripolium majus cæruleum. *Baub. pin.* 267. *Comm. holl.* 112.

Tripolium. *Dod. pempt.* 379.

Zee-Aſter of Zee-Sterre-kruid. Belg.

β. Tripolium majus, flore albo. *Comm. holl.* 112.

Veel aan de Noord- en Zuider-Zee-kant; langs de Maas *agter* 's Gravezande; *aan den* Amſtel *omtrent* Amſterdam, *en aan de* Haarlemmer-Vaart; *in overſtroomde landen by* Franeker, Bergum, Groningen, Delfzyl, &c.

In

In Comm. holl. edit. 1709. Trifolium majus cæruleum *legendum* Tripolium majus cæruleum.

SOLIDAGO.

Virgaurea. 690. Solidago caule ſubflexuoſo angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Sp.* 1235. *n.* 9. *Gelr.* 480.

Virga aurea anguſtifolia minus ſerrata. *Baub. pin.* 268.

Virga aurea. *Dod. pempt.* 142.

Virga aurea vulgaris latifolia. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 1062.

Gulde-*Roede.* Belg.

Veel in de Boſſchadien aan de Nunſpeeter-beek *buiten* Elburg; *tuſſchen* Amerongen *en* Elſt *in 't Sticht van* Utrecht, *en agter den* Kranenborg *by* Zwol.

Pharm. Virgæ aureæ *herb.*

CINERARIA.

paluſtris. 691. Cineraria floribus corymboſis, foliis lato-lanceolatis dentato-ſinuatis, caule villoſo. *Sp.* 1243. *n.* 6.

Othonna *paluſtris. Gelr.* 638. *Friſ.* 371.

Conyza aquatica laciniata. *Baub. pin.* 266. *Comm. holl.* 28.

Conyzæ mediæ ſpecies altera. *Dod. pempt.* 52.

Oed. dan. t. 573.

In de Moeraſſen om Tiel, *en by* Uilenpas *en* Boedelhof *in 't Graafſchap* Zutphen; *ook omtrent* Amſterdam *en* Utrecht; *aan 't* Gain *tuſſchen* Ouderkerk *en de* Voetangel; *overvloedig buiten* 's Hage *in een Poel op Staalduin*; *buiten de* Helder *in de hoek van 't doog*; *in de* Schermer *in* Noord-Holland; *by* Donſega, Eeſterga, Vollega, &c. *in* Friesland.

INULA.

Oculus. Chriſti. 692. Inula foliis amplexicaulibus oblongis integris hirſutis, caule piloſo corymboſo. *Sp.* 1237 *n.* 5. *Gelr.* 485. *Friſ.* 359.

Conyza pannonica lanuginoſa. *Baub. pin.* 265. *Comm.*

Comm. boll. 28. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 113. *ſ.* 7. *t.* 19. *f.* 1.

Overvloedig buiten' Haarlem *naar* Overveen; *in de Duinen achter* Zorgvliet, *en tuſſchen beide* Katwyken; *en aan zommige Wegen en Hei-velden omtrent 't* Heereveen *in* Friesland.

693. INULA foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villoſo paniculato, ſquamis calycinis ſetaceis. *Sp.* 1237. *n.* 7. *Gelr.* 636. *Friſ.* 360. *dyſenterica.*

Conyza media aſteris flore luteo, vel tertia dioſcoridis. *Baub. pin.* 265.

Conyza media matthioli, flore magno luteo, humidis locis proveniens. *Baub. biſt.* 2. *p.* 1050.

Conyza I. *Tabern. biſt.* 1243.

Oed. dan. t. 410.

Gemeen Donder-kruid. Belg.

Heel-blaadtjes. Ruſticis.

Aan de Sypels by Harderwyk; *aan de kanten der Slooten by* Wyk by Duurſtede, Amerongen, Franeker, *langs de Wegen tuſſchen de laage landen in* Dieze *in* Overyſſel.

694. INULA foliis amplexicaulibus undulatis, caule proſtrato, floribus ſubgloboſis radio breviſſimo. *Sp.* 1238. *n.* 9. *Gelr.* 473. *Pulicaria.*

Conyza minor, flore globoſo. *Baub. pin* 266.

Conyza minima. *Dod. pempt.* 52.

In Overyſſel *te* Weſterholte *in de laagte by Heinbsbuis.*

ARNICA.

695. ARNICA foliis ovatis integris: caulinis geminis oppoſitis. *Sp.* 1245. *n.* 1. *Gelr.* 479. *Friſ.* 361. *montana.*

Arnica lapſorum panacea. *Eph. Nat. Cur. Dec.* 1. *Ann.* 9. *p.* 22. *t.* 3.

Doronicum, plantaginis folio, alterum. *Baub. pin.* 263.

Oed. dan. t. 63.

Wolverley, Groot Luciaan-kruid, Val-kruid, Woud-kruid. Belg.

Veel op de Stads-weide by Harderwyk; *in ééne weide by* Uilenpas, *en op* Zuideras, *op de Heide by* Selhem, *en elders in 't Graafſchap* Zutphen; *op de Hei-velden omtrent* Bergum, Oudega, Au-

Auguſtinisga *en* Heerenveen *in* Friesland; *en by de Harender - moolen buiten* Groningen.
Pharm. ARNICÆ *rad. herb. flor.*
Herbam in Cerevişia coctam Ruſtici pro vulnerariis interne adbibent.

BELLIS.

perennis. 696. BELLIS ſcapo nudo. *Sp.* 1248. *n.* 1. *Gelr.* 494. *Friſ.* 362.
Bellis ſylveſtris minor. *Baub. pin.* 261. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 108.
Bellis ſylveſtris. *Dod. pempt.* 265.
Oed. dan. t. 503.
Maagdelieven, May-zoetjes, Margarieten. Belg.
Kransjes. Harlemenſibus.
Fenne-bloemen. Friſiis.
Overvloedig in de Weiden.
Pharm. BELLIDIS *herb. flor.*
Variat petalis ex candido & rubro miſtis; ex candido rubris; diſco rubris, radio albis. Vidi etiam plantas ſpontaneas flore pleno.
In Commelini Catalogo omiſſa.

CHRYSANTHEMUM.

Leucanthemum. 697. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus oblongis: ſuperne ſerratis; inferne dentatis. *Sp.* 1251. *n.* 4. *Gelr.* 486. *Friſ.* 363.
Bellis ſylveſtris, caule folioſo, major. *Baub. pin.* 261. *Comm. holl.* 15.
Bellis major. *Cam. epit.* 635. *Dod. pempt.* 265.
Groote Maagdelieven, of *Ganze-bloemen.* Belg.
Wammis-knoopen of Wambuis-knoopen. Arnhemienſibus.
In en aan de Zaai-landen op veele plaatſen.

ſegetum. 698. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus: ſuperne laciniatis; inferne dentato-ſerratis. *Sp.* 1154. *n.* 15. *Gelr.* 487. *Friſ.* 364.
Chryſanthemum ſegetum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 334.
Bellis lutea, foliis profunde inciſis, major. *Baub. pin.* 262. *Comm. holl.* 15.
Vokelaar of Geele Ganze-bloemen. Belg.
In zandige Bouw-landen op veele plaatſen.

Va-

Digitized by Google

Variat interdum foliis minoribus, floribusque ex albo & luteo variegatis. Boerh. lugdb. 1. *p.* 106. *n.* 10 & 11.

MATRICARIA.

699. MATRICARIA foliis compoſitis planis: foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Sp.* 1255. *n.* 1. *Gelr.* 488. *Parthenium*

Matricaria vulgaris ſeu ſativa. *Baub. pin.* 133.

Matricaria ſylveſtris flore toto luteo. C. B. *Comm. boll.* 72.

Matricaria. *Dod. pempt.* 35.

Mater, Moeder-kruid. Belg.

Komt van zelfs voort in de Hoven, ook aan oude Muuren, en op ruwe ſteenachtige plaatſen.

Pharm. MATRICARIÆ *herb. flor.*

700. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis patentibus, ſquamis calycinis margine æqualibus. *Sp.* 1256. *n.* 3. *Gelr.* 489. *Chamomilla*

Chamæmelum vulgare, Leucanthemum dioſcoridis. *Baub. pin.* 135.

Chamæmelum vulgare. *Dod. pempt.* 257.

Camille. Belg.

Overvloedig in de Zaai-landen op veele plaatſen.

Pharm. CHAMÆMELI VULGARIS *herb. flor.*

701. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis deflexis, ſquamis calycinis margine æqualibus. *Sp.* 1256. *n.* 5. *Friſ.* 366. *ſuaveolens.*

Matricaria leucanthemos annua ſuaveolens, chamæmeli folio, ovariis albicantibus. *Vaill. act.* 1720. *p.* 370.

Welruikende Camille. Belg.

Op veele plaatſen in de Bouw-landen.

Non confundenda cum Anthemide nobili.

ANTHEMIS.

702. ANTHEMIS receptaculis conicis: paleis lanceolatis, ſeminibus coronato-marginatis. *Sp.* 1261. *n.* 8. *Gelr.* 637. *arvenſis.*

Chamæmelum inodorum. *Baub. pin.* 135. *Rupp. jen.* 173.

Wilde Camille. Belg.
Op veel plaatſen langs de Wegen en Akkers.

Cotula. 703. ANTHEMIS receptaculis conicis; paleis ſetaceis, ſeminibus nudis. *Sp.* 1261. *n.* 10. *Gelr.* 491. *Friſ.* 367.
Chamæmelum fœtidum. *Baub. pin.* 135. *Comm. holl.* 24.
Cotula fœtida. *Dod. pempt.* 258.
Padde-bloem, Stinkende Camille, Koedille. Belg.
Langs de wegen omtrent Amſterdam, Utrecht; *in de* Wouden *en op de* Kley *in* Friesland; *aan de* Muyder-*en* Yſeldyk, *en elders.*

valentina. 704. ANTHEMIS caule ramoſo, foliis pubeſcentibus tripinnatis ſetaceis, calycibus villoſis pedunculatis. *Sp.* 1262. *n.* 14. *Gelr.* 490.
Buphthalmum cotulæ folio. *Baub. pin.* 134. *Comm. holl.* 18.
Buphthalmum alterum penæ. *Dalech hiſt.* 863.
Te Campen *aan de Muuren.*

tinctoria. 705. ANTHEMIS foliis bipinnatis ſerratis ſubtus tomentoſis, caule corymboſo. *Sp.* 1263. *n.* 17. *Ingr.* 138.
Buphthalmum tanaceti minoris foliis. *Baub. pin.* 134. *Comm. holl.* 18.
Chryſanthemum foliis tanaceti. *Loeſ. pruſſ.* 47. *t.* 9.
Koe-Ooge. Belg.
Op oude Muuren te Utrecht *en in andere plaatſen.*

ACHILLEA.

Ptarmica. 706. ACHILLEA foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis. *Sp.* 1266. *n.* 13. *Gelr.* 493. *Friſ.* 368.
Dracunculus pratenſis, ſerrato folio. *Baub. pin.* 98. *Comm. holl.* 32.
Draco ſylveſtris ſive Ptarmica. *Dod. pempt.* 710.
Wilde Dragon, Wilde Bertram. Belg.
Langs de gruppels der Bouw-landen te Zandwyk *by* Tiel; *langs de wegen by* Uilenpas *en elders in 't Graafſchap* Zutphen; *in de Meben by* Harderwyk, Nykerk, &c. *in den Aardenbouts-Laan buiten* Haarlem; *aan de Kade buiten de Leuter-poort*

poort te Wyk by Duurſtede; *omtrent* Haskerdyken, Heerenveen, Wolvega, *en elders in de* Wouden *in* Friesland.
Pharm. PTARMICÆ VULGARIS *herb.*

707. ACHILLEA foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus ſuperne ſulcatis, *Sp.* 1267. *n.* 18. *Gelr.* 492. *Ingr.* 139. *Friſ.* 369. *Millefolium*
Millefolium vulgare album. *Baub. pin.* 140. *Comm. boll.* 76.
Millefolium ſive Achillæa. *Dod. pempt.* 100.
Haaze-Gerwe, Geruwe, Duizend-blad. Belg.
β. Millefolium purpureum majus. *Baub. pin.* 140. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 112.
γ. Millefolium purpureum minus. *Baub. pin.* 140. *Comm. boll.* 76. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 112.
Langs de Wegen, aan de kanten der Akkers, en in de Weiden op veele plaatſen.
Pharm. MILLEFOLII *herb.*

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

COREOPSIS.

708. COREOPSIS foliis lanceolatis ſerratis oppoſitis amplexicaulibus. *Sp.* 1281. *n.* 4. *Bidens.*
Chryſanthemum aquaticum bidens, folio non diviſo, flore aureis petalis undique radiato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 17. *ſ.* 6. *t.* 5. *f.* 25.
In de Slooten van 't Haagſe-Boſch, *en elders.*

CENTAUREA.

709. CENTAUREA calycibus ciliatis: ſquamula ovata: ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato-angulatis, floribus floſculoſis. *Sp.* 1288. *n.* 11. *nigra.*
Jacea nigra laciniata. *Baub. pin.* 271. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 142. (*non Commelini. Vide Centauream Jaceam.*) †
Jacea auſtriaca VI. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 7.
† *Volgens* BOERHAAVE.

Cyanus. 710. CENTAUREA calycibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Sp.* 1289. *n.* 14. *Gelr.* 495. *Friſ.* 370.
Cyanus ſegetum. *Baub. pin.* 273. *Comm. holl.* 30.
Cyanus vulgaris. *Lob. ic.* 546.
Koorn-bloemen, Rogge-bloemen. Belg
Veel tuſſchen 't Koorn.
Pharm. CYANI *flor.*
Variat interdum corollæ colore albo, purpureo, incarnato, violaceo, rubro, &c.

Scabioſa. 711. CENTAUREA calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis. *Sp.* 1291. *n.* 22. *Ingr.* 140.
Scabioſa major, ſqamatis capitulis. *Baub. pin.* 269.
Centaurium collinum gesneri, flore purpureo. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 32.
Habitat in pratis aridioribus Belgii. (*Linn. h. Cliff.* 422.

Jacea. 712. CENTAUREA calycibus ſcarioſis laceris, foliis lanceolatis: radicalibus ſinuato-dentatis: ramis angulatis. *Sp.* 1293. *n.* 29. *Gelr.* 492.
Jacea nigra pratenſis latifolia. *Baub. pin.* 271.
Jacea nigra laciniata. C. B. *Comm. holl.* 60.
Oed. dan. t. 519.
Knoop-kruid. Belg.
Veel in de Bouw- en Wei-landen buiten Harderwyk, 's Hage, Haarlem, Zwol; *aan de* Lek-Dyk; *aan de dykjes te* Haren *by* Groningen; *ook op de Heide.*
Commelinus perperam Jaceam nigram laciniatam C. B. *quæ eſt* Centaurea nigra, *pro hac planta poſuit. Ceterum ſynonyma vix diſtinguenda.*

Calcitrapa. 713. CENTAUREA calycibus ſubduplicato-ſpinoſis ſeſſilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloſo. Sp. 1297. *n.* 44. *Gelr.* 496.
Carduus ſtellatus, foliis papaveris erratci. *Baub. pin.* 387. *Comm. holl.* 21.
Carduus ſtellatus. *Dod. pempt.* 733.
Carduus muricatus vulgo Calcitrapa dictus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 7.
Sterre-Diſtel. Belg.
Op verſcheide plaatſen aan de Dyken, tuſſchen Muiden

Digitized by Google

den *en* Naarden; *ook aan den* Yſſel-dyk *in* Gelderland *en* Overyſſel *by* Campen, &c.

POLYGAMIA NECESSARIA.

FILAGO.

714. FILAGO floribus acaulibus ſeſſilibus, foliis floralibus majoribus. *Sp.* 1311. *n.* 1. *acaulis.*
Filago maritima, capite folioſo. *Tourn. inſt.* 454. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 119.
Gnaphalium roſeum ſylveſtre. *Baub. pin.* 263. *prodr.* 122.
Gnaphalium umbellatum minimum. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 162.
† *Volgens* BOERHAAVE.

715. FILAGO panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirſutis, foliis acutis. *Sp.* 1311. *n.* 2. *Gelr.* 469. *germanica.*
Filago ſeu Impia. *Dod. pempt.* 66.
Gnaphalium vulgare majus. *Baub. pin.* 263. *Comm. holl.* 45.
Reur-of Roer-kruid. Belg.
In de Zaai-landen en Moes-hoven; veel op zandige plaatſen by 's Heeren-Loo *buiten* Harderwyk; *en langs de Wegen buiten* Groningen.

716. FILAGO caule ſubdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axillaribusque. *Sp.* 1311. *n.* 4. *Friſ.* 352. *montana.*
Gnaphalium minus repens. *Baub. pin.* 263.
Gnaphalium minimum. *Lob. ic.* 481. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 159. *Pet. herb. t.* 18. *f.* 11.
Klein kruipend Roer-kruid. Belg.
Op zandige Wegen en op Zaai-landen by Oude-Schoot, Rottum, Katlyk, *en elders in de* Woud-kant *in* Frieſland.

717. FILAGO caule dichotomo erecto, floribus ſubulatis axillaribus, foliis filiformibus. *Sp.* 1312. *n.* 5. *gallica.*

Filago vulgaris tenuiſſimo folio erecta. *Tourn. inſt.* 454. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 119.
Gnaphalium vulgare tenuifolium. *Baub. biſt.* 3. *p.* 159.
Gnaphalium vulgare medium. *Moriſ. biſt.* 3. *ſ.* 7. *t.* 11. *f.* 14. *Pet. berb. t.* 18. *f.* 12.
† *Volgens* BOERHAAVE.

arvenſis. 718. FILAGO caule paniculato, floribus conicis lateralibus. *Sp.* 1312. *n.* 6.
Filago altera. *Dod. pempt.* 67. *abſque icone. Boerb. lugdb.* 1. *p.* 119.
Gnaphalium majus anguſto oblongo folio. *Baub. pin.* 263.
By Uilenpas, Keppel *en elders in 't Graafſchap* Zutphen.

MONOGAMIA.

JASIONE.

montana. 719. JASIONE. *Sp.* 1317. *n.* 1. *Gelr.* 498. *Friſ.* 372.
Rapunculus ſcabioſæ capitulo cæruleo. *Baub. pin.* 92. *Comm. boll.* 98.
Scabioſa minor. *Dod. pempt.* 122.
Oed. dan. t. 319.
Schaaps - Scabioſa. Belg.
Veel langs de Wegen by Uilenpas, Harderwyk, Wageningen, Amerongen, &c. *in de Duinen by* Haarlem *en* Alkmaar; *in de Zaai - landen by* Velſen; *in de* Wouden *in* Friesland; *in de Noordlarender eſſen, en elders aan de dykjes in 't* Goreght *buiten* Groningen; *en op andere plaatſen op dorre zandige gronden.*

LOBELIA.

Dortmanna 720. LOBELIA foliis linearibus bilocularibus integerrimis, caule ſubnudo. *Sp.* 1318. *n.* 3.
Dortmanna paluſtris, floribus ſparſis pendulis. *Rudb. act. ups.* 1720. *p.* 97. *t.* 2. *opt.*

Gla-

Gladiolus aquaticus ſ. Gladiolus paluſtris. *Dod. hiſt.* 950.
Leucojum paluſtre, flore ſubcæruleo. *Baub. pin.* 202.
Oed. dan. t. 39.
In de Slooten by 't Dorp Weſterveld *en* Narch *in* Drenthe. (*Linn. h. Cliff.* 426.) *By* Zwol. (*Bruman. zuoll.* 11.)

VIOLA.

721. VIOLA acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus. *Sp.* 1324. *n.* 8. *Gelr.* 500. *Friſ.* 373. *odorata.*
Viola martia purpurea, flore ſimplici odoro. *Baub. pin.* 199. *Comm. holl.* 115.
Viola martia purpurea. *Dod. pempt.* 156. *t.* 1. 2.
Oed. dan. t. 309.
Tammen Blaauwe Violen. Belg.
Styfmoertjes. quibusdam.
β. Viola martia alba. *Baub. pin.* 199.
Overvloedig in de Boſſchadien in de Tielerwaard; *te* Welſum, Oen, *en daar omtrent in* Gelderland; *ook by* Zutphen *en* Amersfoort; *in eenige Duin-Valeyen buiten* Haarlem; *op verſcheide plaatſen in* Friesland; *te* Holten *in* Overysſel; *veelaan de Stads-wal te* Groningen, *ook te* Haren *en* Onnen; *en elders.* β *Op 't Nieuwe-werk by* Rotterdam, *en aan de Wegen omtrent* Wyk by Duurſtede.
Pharm. VIOLARIÆ *herb. flor. ſem.*

722. VIOLA caule adultiore adſcendente, foliis oblongo-cordatis. *Sp.* 1324. *n.* 9. *Gelr.* 499. *Friſ.* 374. *canina.*
Viola martia inodora ſylveſtris. *Baub. pin.* 199. *Comm. holl.* 115.
Viola cærulea martia inodora ſylvatica, in cacumine ſemen ferens. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 543.
Wilde Violen. Belg.
In de Mehen by Harderwyk; *in de Boſſchen by* Putten, Clarenbeek, Uilenpas, *en elders in* Gelderland *en* Overysſel; *overvloedig in de Duin-valeyen; en laage natte grieven by* Harkama-opeinde; *en op verſcheide plaatſen onder geboomte by* Donkerbroek, Haule *en* Ooſterwoude *in* Friesland.

tricolor. 723. VIOLA caule triquetro diffuſo, foliis oblongis inciſis, ſtipulis pinnatifidis. *Sp.* 1326. *n.* 15. *Gelr.* 501. *Friſ.* 375.

Viola bicolor arvenſis. *Baub. pin.* 200. *Comm. holl.* 115.

Wilde Penſeen of *Viooltjes.* Belg.

β. Viola tricolor. *Dod. pempt.* 158. *Renealm. ſpec.* 144. *t.* 140.

Viola tricolor hortenſis repens. *Baub. pin.* 199. *Comm. holl.* 115.

γ. Eadem flore albo & luteo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 244.

δ. Eadem flore pallide cæruleo, purpureo & luteo. *Boerh.*

Veel aan de binnenweg tuſſchen Harderwyk *en* Hierden; *in de Duin-valeyen op dorre zandige gronden; omtrent* Balk, Wykel, Heerenveen, *en elders in de* Wouden *in* Friesland.

IMPATIENS.

Nolitangere. 724. IMPATIENS pedunculis multifloris ſolitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Sp.* 1329. *n.* 7. *Gelr.* 502.

Impatiens herba. *Dod. pempt* 659.

Balſamina lutea ſive Noli me tangere. *Baub. pin.* 306. *Comm. holl.* 15.

Oed. dan. t. 588.

Kruidje roer my niet, *Spring-kruid.* Belg.

In Gelderland *hier en daar aan de kanten der Slooten om* Tiel; *in 't Boſch van* Uilenpas, *en by den* Engelenborg, *te* Ermello *op de Paſtory aan de kant van een ſloot; buiten* Haarlem *in het Schaapen-boſch, en op 't Bent-veld; te* Paterwolde *in 't Landſchap* Drenthe.

CLAS-

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

ORCHIS.

725. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longiſſimo, petalis patentibus. *Sp.* 1331. *n.* 8. *Jngr.* 143. *Friſ.* 376. *bifolia.*
Orchis radicibus oblongis, labello lineari. *Hall. hiſt.* 1285. *t.* 35.
Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Baub. pin.* 83. *Comm. boll* 82. *Vaill. par.* 151. t. 30. *f.* 7. *ſegu. ver. t.* 15. *f.* 10.
Orchis ſerapias primus. *Dod. pempt.* 237.
Balletjes - kruid, Standel - kruid, Voſſe - kulletjes. Belg.
Oed. dan. t. 235.
In de Zee - Duin - Valeyen agter Hillegom; *op Staalduin by* 's Gravenhage; *en op Hei - velden in de* Wouden *in* Friesland.

726. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio bicorni trifido æquali integerrimo: cornu longo, petalis ſublanceolatis. *Sp.* 1332. *n.* 12. *pyramidalis.*
Orchis radicibus ſubrotundis, ſpica denſa calcare longiſſimo, labello bicorni æqualiter tripartito. *Hall. hiſt.* 1286. *t.* 35.
Orchis flore glomerato. *Riv. hex. t.* 14.
Orchis purpurea ſpica congeſta pyramidali. *Segu.* ver.

ver. t. 15. *f.* 11.
Cynoſorchis militaris montana, ſpica rubente conglomerata *Baub. pin.* 81. *prodr.* 28.
By 's Gravenhage, *en in de Velden langs de Duinen.* (*Linn. b. Cliff.* 429.)

Morio. 727. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuſo adſcendente, petalis obtuſis conniventibus. *Sp.* 1333. *n.* 16. *Gelr.* 504. *Friſ.* 377.
Orchis radicibus ſubrotundis, galeæ petalis lineatis, labello trifido crenato, medio ſegmento emarginato. *Hall. biſt.* 1282. *t.* 33.
Orchis morio femina. *Baub. pin.* 82. *Comm. boll.* 82. *Vaill. par. t.* 31. *f.* 13. 14. *Segu. ver. t.* 15. *f.* 7.
Orchis anguſtifolia. *Riv. bex. t.* 19.
Oed. dan. t. 253.
Kulletjes-kruid. Belg.
Volg my na. Groninganis.
By Harderwyk *en* Doornſpyk *in vocbtige landen;* by Alkmaar *op den weg naar* Egmond, *in de Velden;* in 't *Sticht van* Utrecht, *en in* Friesland *op verſcheiden plaatſen;* by Haren *in 't witteveen; ook in de veenlanden langs 't* Horenſche diep, *en by de* Harender-molen *in 't Heide-veld buiten* Groningen.
Pharm. SATYRII FEMINÆ *rad.*
Variat corollarum colore purpureo carneo, albo &c. Boerb. lugdb. 2. *p.* 152.

maſcula. 728. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuſo, petalis dorſalibus reflexis. *Sp.* 1333. *n.* 17.
Orchis radicibus ſubrotundis, petalis lateralibus reflexis, labello trifido, ſegmento medio longiori bifido. *Hall. biſt.* 1283. *t.* 33.
Orchis morio mas, foliis maculatis. *Baub. pin.* 81. *Comm. boll.* 82. *Vaill. par.* 151. *t.* 31. *f.* 11. 12.
Palmata major. *Riv. bex. t.* 10.
Oed. dan. t. 457.
By de voorgaande; ook in de pannen der Duinen op Staalduin by 's Gravenhage, Haarlem, *en in* Brees-Aap.

Pharm.

Digitized by Google

Pharm. SATYRII MARIS *rad.*

729. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio quinque- *militaris.*
fido punctis ſcabro: cornu obtuſo, petalis confluentibus. *Sp.* 1333. *n.* 19.
Orchis radicibus ſubrotundis, ſpica conica, labello quadrifido brachiolis & pectore peranguſtis. *Hall. hiſt.* 1277. *t.* 28.
Orchis galea & alis fere cinereis. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 755.
Orchis latifolia, hiante cucullo, major. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 490. *Vaill. par.* 148. *t.* 31. *f.* 21.
Orchis maſcula. *Riv. hex. t.* 15. 16.
Cynoſorchis latifolia, hiante cucullo major. *Baub. pin.* 80 *Comm. holl.* 82. (*ſub. Orchide.*)
Honds-kulletjes. Belg.
β. Orchis latifolia, hiante cucullo, altera. *Tourn. inſt.* 432. *Boerh. lugdb* 2. *p.* 152. *Vaill. par. t.* 31. *f* 22. 23. 24.
Op grasachtige plaatſen, in Koeymans-Boſch.

730. ORCHIS bulbis ſubpalmatis rectis, nectarii cor- *latifolia.*
nu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Sp.* 1334. *n.* 21. *Gelr.* 503.
Orchis radicibus palmatis, caule fiſtuloſo, bracteis maximis, labello trifido ſerrato, medio ſegmento obtuſo. *Hall. hiſt.* 1279 *t.* 32.
Orchis palmata pratenſis latifolia, longis calcaribus. *Baub. pin.* 85. *Comm. holl.* 83. *Vaill. par. t.* 31. *f.* 1. 2. 3. 4. 5.
Oed. dan. t. 266.
Handekens-kruid. Belg.
β. Orchis palmata paluſtris latifolia. *Baub. pin.* 86. *Comm. holl.* 83.
Palmata paluſtris latifolia. *Riv. hex. t.* 19.
Satyrion baſilicum folioſum. *Eod. pempt.* 241.
Water-Handekens-kruid. Belg.
γ. Orchis palmata pratenſis maculata. *Baub. pin.* 85.
In de Duin-valeyen. β. *in de Meben en Hooi-landen by* Harderwyk, Nykerk, &c. *Tuſſchen den* Overtoom *en* Amſtelveen *buiten* Amſterdam; *in de moeraſſen by* Groningen. γ. *Overvloedig in de Meben by* Harderwyk; *op de Hei-velden en in laage Wei-landen omtrent* Bergum, Ooſtermeer, Eeſt-

Eeſtrum, *en elders in de* Wouden *in* Friesland; *ook overvloedig in de Provintie* Groningen *en* Omlanden.

Variat etiam corollis carneis & albis.

maculata. 731. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore: labio plano, petalis dorſalibus erectis. *Sp.* 1335. *n.* 24. *Gelr.* 639. *Friſ.* 378.

Orchis radicibus palmatis, caule ſolido, labello trifido ſerrato, medio ſegmento. acuminato. *Hall. hiſt.* 1278. *t.* 32.

Orchis palmata montana maculata. *Baub. pin.* 86. *Vaill. par. t.* 31. *f.* 9. 10.

Orchis palmata pratenſis maculata. C. *B. Comm. holl.* 83.

Palmata maculata. *Riv. hex. t.* 8. 11.

Koekkoeks-Bloemen. Zutphanienſibus.

In de Velden by Zutphen; *in de Meben by* Harderwyk; *buiten* Haarlem *by 't Kraayeneſt aan de koediefsvaart*; *in de* Wouden *in* Friesland, *en* Groningen.

Diſtinguitur a præcedenti caule non fiſtuloſo, bracteis flore non longioribus, et reliquis notis ab Ill. Hallero traditis.

conopſea. 732. ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu ſetaceo germinibus longiore: labio trifido, petalis duobus patentiſſimis. *Sp.* 1335. *n.* 26.

Orchis radicibus palmatis, calcare longiſſimo, labello trifido obtuſo unicolore. *Hall. hiſt.* 1287. *t.* 29.

Orchis palmata minor, calcaribus oblongis. *Baub. pin.* 85. *Vaill. par.* 153. *t.* 30. *f.* 8. 8.

Orchis anguſtifolia non maculata. *Riv. hex. t.* 11.

Oed. dan. t. 224.

In de Duin-valeyen, vry overvloedig by Raaphorſt.

SATYRIUM.

viride. 733. SATYRIUM bulbis palmatis, foliis oblongis obtuſis, nectarii labio lineari trifido: intermedia lacinia obſoleta. *Sp.* 1337. *n.* 2.

Orchis radicibus palmatis, galea connivente, label-

Digitized by Google

bello triſulco, calcare breviſſimo. *Hall. hiſt.* 1269. *t.* 26.
Orchis palmata, flore viridi. *Baub. pin.* 26. *prodr.* 30.
Orchis palmata flore galericulato dilute viridi. *Loeſ. pruſſ.* 182. *t.* 56.
Oed. dan. t. 77.
In de Valeyen op Staal - duin by 's Gravenhage. (*Cel.* SCHWENCKE.)

OPHRYS.

734. OPHRYS bulbo fibroſo, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Sp.* 1340. *n.* 5. *Gelr.* 506. *ovata.*
Ophris bifolia. *Baub. pin.* 87. *Comm. holl.* 82.
Epipactis foliis binis ovatis, labello bifido. *Hall. hiſt.* 1291. *t.* 37.
Bifolium. *Riv. hex. t.* 7.
Pſeudo-orchis bifolium. *Dod. pempt.* 242.
Twee-blad. Belg.
Oed. dan. t. 137.
In een Wei-land by Zuideras, *en op de Hofſtede* Blik *buiten* Zutphen; *op de Stads-weide by* Harderwyk; *in de Boſchjes te* Overveen; *in de pannen der Duinen achter* Zorgvliet, *en op veele andere plaatſen aan de Duinkant van* Holland; *op 't Woud tuſſchen* Bergen *en* Egmond op den Hoef *buiten* Alkmaar; *in de Landen by* Leerzum *in 't Sticht van* Utrecht; *in een Boſch by* Franeker; *en elders.*

735. OPHRYS bulbo fibroſo, caule bifolio, foliis cordatis. *Sp.* 1340. *n.* 6. *cordata.*
Ophris minima. *Baub. pin.* 87. *prodr.* 31. *Comm. holl.* 82.
Epipactis foliis binis cordatis, labello bifido, poſtice bidentato. *Hall. hiſt.* 1292. *t.* 22. *f.* 4.
Bifolium minimum. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 534.
In de Duin-valeyen achter Overveen, *by* Haarlem, *op opene luchtige plaatſen.*

736. OPHRYS bulbo ſubrotundo, ſcapo nudo, foliis lanceolatis, nectarii labio integro, petalis dorſalibus linearibus. *Sp.* 1341. *n.* 7. *liliifolia.*

Her-

Herminium bulbo infra radicato, nectarii labio bifido. *Linn. act. upſ.* 1740. *p.* 31.
Orchis lilifolia minor ſabuletorum zelandiæ & bataviæ. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 770. *figuræ duæ priores. Comm boll.* 83.
Chamæorchis lilifolia. *Baub. pin.* 84.
Bifolium bulboſum *Dod. pempt.* 242.
Ehret. act. angl. 1764. *n.* 53. *p.* 81. *t.* 4.
In Brees - Aap.

Monorchis. 737. Ophrys bulbo globoſo, ſcapo nudo, nectarii labio trifido cruciato. *Sp.* 1342. *n.* 11.
Orchis bulbo unico ſubrotundo, labello cruciformi. *Hall. hiſt.* 1262. *t.* 22. *f.* 3.
Orchis odorata moſchata ſ. Monorchis. *Baub. pin.* 84.
Monorchis. *Mich. gen.* 30. *t.* 26. *Rupp. jen.* 421. *t.* 2.
Oed. dan. t. 102.
In de Duinen by Velſen. (*Nob.* D. Fabricius Six.)

S E R A P I A S.

latifolia. 738. Serapias bulbis fibroſis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. *Syſt. edit.* 13. *p.* 678. *n.* 1.
Serapias *Helleborine. Sp.* 1344. *n.* 1. *Gelr.* 505.
Helleborine latifolia montana. *Baub. pin.* 186. *Comm. boll.* 57.
Epipactis ſive Helleborine. *Cam. epit.* 889.
Epipactis foliis amplexicaulibus ovato-lanceolatis, labello lanceolato. *Hall. hiſt.* 1297. *t.* 40.
Damaſonium flore mixto. *Riv. hex. t.* 5.
Oed. dan. t. 267.
Berg - Nieskruid. Belg.
β. Helleborine flore carneo. *Baub. pin.* 187. *Comm. boll.* 57.
γ. Helleborine altera, atro - rubente flore. *Baub. pin.* 186.
Op de zyde van 't Kraayeneſt, *op de hoogte by de* Koediefs - vaart; *veel op* Uilenpas *en* Baank *in 't Graafſchap* Zutphen; *ook omtrent* Zwol. β. *Op den weg van 't* Kraayeneſt *naar* Heemſtede *op drooge zandige gronden.* γ. *Op* Uilenpas.

739. Se-

739. SERAPIAS bulbis fibroſis, foliis enſiformibus *longifolia.*
ſeſſilibus, floribus pendulis. *Syſt. edit.* 13. *p.* 679. (*Sp.* 1345. *n.* 3.)
Helleborine anguſtifolia paluſtris ſive pratenſis. *Baub. pin.* 87. *Comm. holl.* 57.
Helleborine. *Riv. hex. t.* 3.
Epipactis foliis enſiformibus caulinis, floribus pendulis, labello obtuſo per oras plicato. *Hall. hiſt.* 1296. *t.* 39.
Damoſonium flore herbaceo, intus nonnihil candicante. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 317.
Oed. dan. t. 267.
In de vochtige Duin-valeyen buiten Haarlem; *by den* Hoef, Bergen, &c. *buiten* Alkmaar; *en agter* Zorgvliet *langs den weg naar* Scheveningen.

740. SERAPIAS bulbis fibroſis, foliis enſiformibus, *rubra.*
floribus erectis: nectarii labio acuto. *Syſt. edit.* 13. *p.* 679.
Helleborine montana anguſtifolia purpuraſcens. *Baub. pin.* 187. *Boerh. lugdb.* 2 *p.* 153.
Elleborines genus. 5. *Cluſ. pan.* 275.
Epipactis caule paucifloro, labello lanceolato lineato, lineis undulatis. *Hall. hiſt.* 1299. *t.* 42.
Damaſonium flore roſeo. *Riv. hex. t.* 6.
Oed. dan. t. 345.
† *Volgens* BOERHAAVE.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

741. ARISTOLOCHIA foliis cordatis, caule erecto, *Clematitis.*
floribus axillaribus confertis. *Sp.* 1364. *n.* 20.
Ariſtolochia Clematitis recta. *Baub. pin.* 307. *Comm. holl.* 12.
Ariſtolochia Clematitis vulgaris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 71.
Dunne Hol-Wortel, Sarratyns-kruid. Belg.
Overvloedig op de Kamp van het Haaze-woold by de Bronsbergen by Zutphen; *in de Duinen niet verre van*

van Wyk op Zee *op zommige plaatſen overvloedig; langs een weg by de* Beverwyk, *die van de Herberg* Romen *naar de duinen loopt; overvloedig op de Kruidberg by* Brederode; *ook om* Utrecht.
Pharm. ARISTOLOCHIÆ VULGARIS *rad.*

POLYANDRIA.

ARUM.

maculatum. 742. ARUM acaule, foliis haſtatis integerrimis, ſpadice clavato. *Sp.* 1370 *n.* 12. *Gelr.* 508.
Arum vulgare maculatum & non maculatum. *Baub. pin.* 195. *Comm. holl.* 13.
Arum. *Fuchſ. hiſt.* 69. *Lob. ic.* 597.
Oed. dan. t. 597.
Kalfsvoet, Aarons-baart. Belg.
By de Vos *agter de Kanons-dyk buiten* Zutphen; *in 't Boſch van den* Uilenpas *en by* Ubbergen; *op* Zandwyk *by* Tiel; *te* Dodeweerd *by 't Huis den* Appelenburg; *te* Ochten *in de* Neder-Betuwe; *ook omtrent* Leiden; *in vochtige Elſe Boſchjes by 't Huis te* Brederode; *in* Neer-Langbroek *in de Provintie* Utrecht; *in 't Boſch op de* Mickelhorſt *by* Groningen; *en elders.*
Pharm. ARI *rad.*

CALLA.

paluſtris. 743. Calla foliis cordatis, ſpatha plana, ſpadice undique hermaphrodito. *Sp.* 1373. *n.* 2. *Gelr.* 507. *Ingr.* 147.
Dracunculus puluſtris ſive radice arundinacea plinii. *Baub. pin.* 195. *Comm. holl.* 32. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 545. *ſ.* 13. *t.* 5. *f.* 23.
Dracunculus aquatilis. *Dod. pempt.* 330.
Oed. dan. t. 423.
Water-Slange-kruid. Belg.
In de Slooten en ſtaande Wateren by Oldbroek *op de* Veluwe; *tuſſchen* Rotterdam *en* Gouda, *langs den Hoogen-dyk; en achter* Weſtbroek *by* Utrecht.

ZOS-

Z O S T E R A.

744. ZOSTERA pericarpiis ſeſſilibus. *Sp.* 1374. *n.* 1. *marina.*
it. W. gotb. t. 4. *f.* 1. *Gelr.* 222. *Friſ.* 379.
Fucus anguſtifolius ligulas referens. *Baub. pin.* 364.
Comm. boll. 38.
Fucus marinus ſecundus. *Dod. pempt.* 479.
Zee-Wiert of Wier, Zee-Neſtelen. Belg.
Oed. dan. t. 15.
Overvloedig omtrent 't Eiland Wieringen *in de Zuider-Zee.*

745. ZOSTERA pericarpiis pedicellatis oliviformibus. *oceanica.*
Mant. 123. *Syſt.* 605. *edit.* 13. *p.* 691.
Alga anguſtifolia vitriariorum. *Baub. pin.* 364.
Alga marina. *Lob. ic.* 251.
By de voorige.
Confunditur facile cum Zoſtera marina, ſed fructibus pedunculatis, et radicibus in pilam complicatis differt.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

ZANNICHELLIA.

paluſtris. 746. Zannichellia *Sp.* 1375. *n.* 1. *Friſ.* 380.
Zannichellia paluſtris major, foliis gramineis acutis. *Mich. gen.* 71. *t.* 34. *f.* 1. 2.
Algoides vulgaris. *Vaill. act.* 1719. *p.* 15. *t.* 1. *f.* 1.
Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis. *Bauh. pin.* 193. *prodr.* 101.
Oed. dan. t. 67.
Overvloedig in Vaarten en Slooten op verſcheide plaatſen.

CHARA.

vulgaris. 747. Chara caulibus lævibus, frondibus interne dentatis. *Sp.* 1624. *n.* 2. *Friſ.* 504.
Chara vulgaris foetida. *Vaill. act.* 1719. *p.* 23. *t.* 3. *f.* 1.
Equiſetum foetidum ſub aqua repens. *Bauh. pin.* 16. *prodr.* 25. *theatr.* 251. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 731. *Comm. holl.* 33.
Oed. dan. t. 150.
Stinkende Paarde-ſtaart. Belg.
In de Kolken aan den Yſſel, *en in veele Slooten.*

748. **Chara** caulibus aculeis capillaribus confertis. *Sp.* 1624. *n.* 3. *Friſ.* 505. *hiſpida.*
Chara major, caulibus ſpinoſis. *Vaill. act.* 1719. *p.* 18. *t.* 3. *f.* 3.
Equiſetum ſive Hippuris muſcoſus ſub aqua repens, in hibernia. *Pluk. alm.* 135. *t.* 193. *f.* 6.
Hippuris muſcoſa, ſetis per maturitatem ſtellatis. *Dill. Eph. Nat. Cur. Cent. VI. app.* 58. *t.* 13. *f.* 1.
Oed *dan. t.* 154.
In de Slooten by Enckhuiſen, Franeker, *en elders.*

D I A N D R I A.

L E M N A.

749. **Lemna** foliis petiolatis lanceolatis. *Sp.* 1376. *n.* 1. *Gelr.* 590. *Friſ.* 382. *triſulca.*
Hydrophace caule filiformi, foliis ellipticis lanceolatis viviparis. *Hall. hiſt.* 1901.
Lenticularia ramoſa monorhiza, foliis oblongis pediculis longioribus donatis. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f* 5.
Lenticula aquatica triſulca. *Bauh. pin.* 362. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 786. *Comm. holl.* 65.
Hederula aquatica. *Lob. ic.* 2. *p.* 36.
Klein Water-Veil. Belg.
In ſtilſtaande zoete Wateren tuſſchen Haarlem *en* Overveen, *by* Harderwyk, Zwol, Franeker, *en elders.*

750. **Lemna** foliis ſeſſilibus utrinque planiuſculis, radicibus ſolitariis. *Sp.* 1376. *n.* 2. *Gelr.* 592. *Friſ.* 383. *minor.*
Hydrophace monorrhiza, foliis planis ovatis. *Hall. hiſt.* 1900.
Lenticularia minor monorhiza, foliis ſubrotundis utrinque viridibus. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f.* 3.
Lenticula paluſtris vulgaris. *Bauh. pin.* 362. *Comm. holl.* 61. *Vaill. par.* 114. *t.* 20. *f.* 3.
Lens paluſtris. *Dod. pempt.* 587. *Cam. epit.* 852. *Raj. angl.* 3. *p.* 129. *t.* 4. *f.* 1.

Digitized by Google

Kroos, *Eenden-kroos*, *Eenden-groen*, *Water-Linzen*. Belg.
Overvloedig in Graften, *Slooten*, *en andere ſtilſtaande zoete Wateren*.
Pharm. LENTICULÆ *herb*.

gibba. 751. LEMNA foliis ſeſſilibus ſubtus hemiſphæricis, radicibus ſolitariis. *Sp.* 1377. *n.* 3. *Friſ.* 384.
Hydrophace monorrhiza, foliis pulvinatis, inferne convexiſſimis. *Hall. hiſt.* 1898.
Lenticula paluſtris major: inferne magis convexa, fructu polyſpermo. *Mich. gen.* 15. *t.* 11. *f.* 1.
In verſcheide Slooten in Friesland.

polyrhiza. 752. LEMNA foliis ſeſſilibus, radicibus confertis. *Sp.* 1377. *n.* 4. *Gelr.* 591. *Friſ.* 385.
Hydrophace polyrrhiza, foliis ovatis planis. *Hall. hiſt.* 1899.
Lenticularia major polyrhiza inferne atropurpurea. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f.* 1.
Lenticula paluſtris major. *Comm. holl.* 65. *Dill. app.* 51. *Raj. angl.* 3. *p.* 129. *t.* 4. *f.* 2. *Vaill. par.* *t.* 20. *f.* 2.
In de Vaart van Amſterdam *op* Gouda, *niet verre van de Goudſe ſluis*; *in de Grift tuſſchen* Nymegen *en* Arnhem; *en in* Friesland *by de voorgaande*, *maar minder*.

TRIANDRIA.

TYPHA.

latifolia. 753. TYPHA foliis ſubenſiformibus, ſpica maſcula feminea que approximatis. *Sp.* 1377. *n.* 1. *Gelr.* 514. *Friſ.* 386.
Typha paluſtris major. *Bauh. pin.* 20. *Comm. holl.* 113. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 246. *ſ.* 8. *t.* 13. *f.* 1.
Liſch-Dodden of *Donzen*, *Bulpeſerikken*, *Duivelskoppen*, *Raboorden*. Belg.
Zweſeriken. Zutphanie nſibus.

Gree-

Groote Haanebolte, ook wel *Doete-bolten.* Groninganis.
Op veele plaatſen in de Graften, Rivieren, en Rietpoelen.

754. TYPHA foliis ſemicylindricis, ſpica maſcula femineaque remotis. *Sp.* 1377. *n.* 1. *anguſtifolia.*
Typha paluſtris, clava gracili. *Baub. pin.* 20. *Comm. boll.* 113.
Typha paluſtris media. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 246. *ſ.* 8. *t.* 13. *f.* 2.
β. Typha paluſtris minor. *Baub. pin.* 20. *Comm. boll.* 113.
Kleine Haanebolten. Groninganis.
In het Spaarne *by* Haarlem; *ook in den* Ysſel *op veele plaatſen*; *buiten* Groningen *in de Slooten by* Haren, Meckelhorſt, Onnen, *en elders.*

SPARGANIUM.

755. SPARGANIUM foliis erectis triquetris. *Sp.* 1378. *n.* 1. *Gelr.* 513. *Friſ.* 387. *erectum.*
Sparganium ramoſum. *Baub. pin.* 15. *theatr.* 228. *Comm. boll.* 107. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 247. *ſ.* 8. *t.* 13. *f.* 1.
Platanaria ſ. Butomon. *Dod. pempt.* 601.
Riet-gras, Driekantig Lieſcb. Belg.
Duikers. Groninganis.
β. Sparganium non ramoſum. *Baub. pin.* 15. *theatr.* 231. *Tabern. ic.* 247. *Comm. boll.* 107. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 248. *ſ.* 8. *t.* 13. *f.* 2.
Oed. dan. t. 260.
In byna uitgedroogde Slooten, Moeraſſen, en aan de kanten der Graften, op verſcheide plaatſen. β. *Voornaamlyk tuſſchen* Haarlem *en* Overveen, *en by* Cuilenburg.

CAREX.

Spica unica ſimplici.

756. CAREX ſpica ſimplici dioica. *Sp.* 1379. *n.* 1. *dioica.*
Cyperoides parvum, caulibus & foliis tenuiſſimis

Digitized by Google

triangularibus, ſpica longiore capſulis oblongis. Mich. *gen.* 56. *t.* 32. *f.* 1.

Gramen Cyperoides minimum, ſpica ſimplici craſſa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f. ult.* (*mas.*)

Oed. dan. t. 166.

Te Hulſen *by* Nymegen, *en elders in vochtige Weilanden, en in de Mebes by* Harderwyk.

capitata. 757. Carex ſpica ſimplici androgyna ovata: ſuperne maſcula, capſulis imbricato-patulis. *Sp.* 1379. *n.* 2.

Gramen Cyperoides minimum, ranunculi capitulo ſimplici asperiore rotundo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 245. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 36.

Oed. dan. t. 379.

By Groningen. (D. Rainville.)

pulicaris. 758. Carex ſpica ſimplici androgyna: ſuperne maſcula, capſulis divaricatis retroflexis. *Sp.* 1380. *n.* 3.

Gramen Cyperoides minimum, ſeminibus deorſum reflexis puliciformibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 21.

Te Hulſen *by* Nymegen *in een vochtig land, en op veele plaatſen in Modderpoelen.*

Spicis androgynis.

baldenſis. 759. Carex ſpicis ternis congeſtis ſeſſilibus ovatis triquetris androgynis, involucro diphyllo. *Sp.* 1380. *n.* 5.

Carex alpina, capitulis albis: ſquamis triquetris et pulchre lucentibus. *Segu. ver.* 1. *p.* 125.

Gramen junceum montanum, capite ſquamoſo. *Bauh. pin.* 6. *prodr.* 13. *t.* 13.

Op de Cingel van Rotterdam, *dog zeldzaam.* (D. Rainville.)

arenaria. 760. Carex ſpica compoſita, ſpiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori inſtructis, culmo triquetro. *Sp.* 13. *n.* 6.

Carex maritima humilis, radice repente, caule triquetro, ſpica ſpadicea. *Mich. gen.* 67. *t.* 33. *f.* 4.

Gra-

Digitized by Google

Gramen Cyperoides minus repens, ſpica diviſa.
Loeſ. pruſſ. 116. *t.* 31.
Oed. dan. t. 425.
Helm-draad. Vulgo.
Overvloedig in de Duinen by Haarlem, Velſen, Scheveningen, *en aan de kanten van zandige Akkers.* (*Nob.* D. FABRICIUS SIX, & D. RAINVILLE.)
Ill. HALLERUS *duas facit* Caricis arenariæ *Linnæi ſpecies. Hiſt. ſtirp. Helv. n.* 1362. *et* 1363. *ſed. neutra illarum cum noſtra convenit. Conf.* C. E. WEIGEL *obſerv. bot.* 22.
Reptatu moleſta eſt & inviſa ruſticis.
Loco Saſſaparillæ uſurpandam commendat C. F. REUSS *orat. inaug. Tubing.* 1771.

761. CAREX ſpica compoſita, ſpiculis ovatis ſeſſilibus approximatis alternis androgynis nudis. *Sp.* 1381. *n.* 8. *Gelr.* 641. *leporina.*
Gramen Cyperoides paluſtre majus, ſpica diviſa. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 88. *Comm. holl.* 52. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 29.
Klein Wild-Water-Galigaan. Belg.
Variat tribus modis.
α. Spiculis omnibus androgynis.
β. Spiculis ſuperioribus maſculis.
γ. Spiculis ſuperioribus & inferioribus femineis, mediis maſculis.
In vochtige Weiden aan de Slooten op veele plaatſen. α. *by* Gouda. β. *te* Bodegraaven; γ. *by* Nymegen.

762. CAREX ſpica compoſita, ſuperne maſcula, inferne feminea; ſpiculis ovatis mollibus; capſulis marginatis. *marginata.*
Carex paluſtris elatior, radice repente, caule trilatero, ſpica ſpadicea, capitulis craſſioribus, capſulis marginatis. *Mich. gen.* 67. *t.* 33. *f.* 3.
Gramen nemoroſum, ſpica rufeſcente molli *Baub. pin.* 7.
Gemeen by Bodegraven *aan de kanten der Slooten.* (D. RAINVILLE.)
Variat ſpica interrupta, id eſt ſpiculis ſuperioribus & inferioribus femineis, mediis maſculis.
Capſulæ hinc planæ, inde convexæ, utrinque nervoſæ &

Digitized by Google

& quaſi ſtriatæ. Pericarpium ſemine latius, unde marginatum apparet.

vulpina. 763. CAREX ſpica ſupradecompoſita inferne laxiore: ſpiculis androgynis ovatis ſeſſilibus glomeratis: ſuperne maſculis. *Sp.* 1382. *n.* 10. *Gelr.* 509. *Friſ.* 388.
Gramen Cyperoides paluſtre majus ſpica compacta. *Baub. pin.* 6, *theatr.* 87. *Comm. boll.* 52. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 24.
Oed. dan. t. 308.
Wild Water-Galigaan-Gras. Belg.
By de voorgaande, en veel aan de kanten der Graften om Rotterdam.

muricata. 764. CAREX ſpiculis ſubovatis ſeſſilibus remotis androgynis, capſulis acutis divergentibus ſpinoſis. *Sp.* 1382. *n.* 11.
Carex nemoroſa, fibroſa radice, anguſtifolia minima, caule exquiſite triangulari, ſpica brevi interrupta. *Micb. gen.* 69. *t.* 32. *f.* 11.
Gramen nemoroſum, ſpicis parvis aſperis. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 100. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 27.
Oed. dan. t. 284.
Overvloedig te Hulſen *by* Nymegen; *ook langs ſommige Vaarten en Slooten om* Rotterdam, *en langs den Cingel aldaar, dog weinig* (D. RAINVILLE.)

loliacea. 765. CAREX ſpiculis ſubovatis ſeſſilibus remotis androgynis, capſulis ovatis teretiuſculis muticis divaricatis. *Sp.* 1382. *n.* 13.
By Groningen. (D. RAINVILLE.)
Ill. HALLERUS *Hiſt.* 1365. *eandem eſſe vult cum Carice muricata, et tantum plantam juniorem.*

remota. 766. CAREX ſpiculis ovatis ſubſeſſilibus remotis androgynis, bracteis culmum æquantibus. *Sp.* 1383. *n.* 14.
Cyperoides anguſtifolium, ſpicis parvis ſeſſilibus in foliorum alis. *Raj. biſt.* 1295. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 17. *Pluk. alm.* 178. *t.* 34. *f.* 3. *Scbeucb. gram.* 483.
Oed. dan. t. 370.
Gemeen aan de kanten der Vyvers op Roſendaal *by* Arn-

Digitized by Google

Arnhem; *langs de Graften om* Nymegen; *onder aan den boogendyk onder de dikke boomen buiten* Rotterdam; *by het Huis ten* Donk; *en elders.*

767. CAREX racemo compoſito, ſpiculis androgynis. *Sp.* 1383. *n.* 17. *paniculata.*

Cyperus longus inodorus ſylvaticus. *Baub. pin.* 14. *theatr.* 221.

Gramen Cyperoides paluſtre elatius, ſpica longiore laxa. *Raj. hiſt.* 1296. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 23.

Gemeen langs diepe en door boomen overdekte graften by Rotterdam, 's Hage, Voorburg, Bodegraven, &c (D. RAINVILLE.)

Variat panicula ampliori & tenuiori, imo et filiformi.

Spicis ſexu diſtinctis: femineis ſeſſilibus.

768. CAREX ſpicis confertis ſubſeſſilibus ſubrotundis: maſcula lineari, capſulis acutis recurvis. *Sp.* 1384. *n.* 18. *flava.*

Gramen paluſtre aculeatum germanicum ſ. minus. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 109 *Comm. holl.* 53. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 19.

Water-Gras met Steekende Airen. Belg.

In laage waterachtige Velden by Amſterdam, Utrecht, Zwol, *te* Hulſen *by* Nymegen, *en elders.*

769. CAREX ſpicis linearibus erectis: maſcula breviore inferioreque, bracteis aphyllis, capſulis diſtantibus. *Sp.* 1384. *n.* 20. *digitata.*

Gramen caryophyllatum montanum, ſpica varia. *Baub. pin.* 4. *prodr.* 9.

Gramen caryophyllatum polycarpon, fructu triangulari. *Loeſ. pruſſ.* 112. *t.* 27.

In het Boſch by Putten *en* Elſpeet *op de* Veluwe.

770. CAREX ſpicis femineis ſeſſilibus ſubſolitariis ovatis maſculæ approximatis, culmo nudo, capſulis pubeſcentibus. *Sp.* 1385. *n.* 21. *montana.*

Cyperoides montanum, foliis anguſtis parvis, ſpi-

Digitized by Google

ſpica ſpadicea diviſa. *Scheuch. gram.* 419.
Cyperoides alpinum ſaxatile, capillaceo folio, caule rotundo triquetro, ſpica feminali nigricante plerumque unica. *Mich. gen.* 64. *t.* 32. *f.* 3.
In de Duinen by Haarlem, *en in de Heide by* Hulſen *buiten* Nymegen. (D. RAINVILLE.)
Synonymum Scheuchzeri Ill. LINNÆUS *dubitanter hic appoſuit, Ill.* HALLERUS *omnino negat hanc eſſe plantam; ſed Ill.* SCHREBERUS *recte ſtatuit eandem eſſe, cum in uno eodemque ceſpite folia capillaria, atque latiuſcula inveniantur.*

globularis. 771. CAREX ſpica maſcula oblonga, feminea ſeſſili ovata folio florali breviori approximata. *Sp.* 1385. *n.* 22.
Cyperoides alpinum ſaxatile, capillaceo folio, caule rotundo triquetro, ſpica ſeminali nigricante plerumque unica, capſulis oblongis turbinatis trilateris ſubhirſutis in apicem tenuiſſimum nonnihil bifidum terminatis. *Mich. gen.* 64. *t.* 32. *f.* 3.
Op de Duinen by Egmond op den Hoef.

filiformis. 772. CAREX ſpica maſcula oblonga, femineis ſeſſilibus oblongis: inferiore foliolo proprio breviore. *Sp.* 1385. *n.* 23. *Friſ.* 389.
Cyperoides ſylvaticum tenuifolium, ſpicis parvis tenuibus ſpadiceo-viridibus. *Scheuch. gram.* 425. *t.* 10. *f.* 11.
By Gouda, Haarlem, Groningen, *en in* Friesland *op veele plaatſen in de Wei-landen, en aan de kanten der zelven; als ook aan ſommige Wegen.*

pilulifera. 773. CAREX ſpicis terminalibus confertis ſubrotundis: maſcula oblonga. *Sp.* 1385. *n.* 24.
Gramen Cyperoides tenuifolium, ſpicis ad ſummitatem caulis ſeſſilibus globulorum æmulis. *Pluk. alm.* 178. *t.* 91. *f.* 8.
Te Hulſen *by* Nymegen, *en op de Duinen by* Scheveningen. (D. RAINVILLE.)
Variat multum longitudine culmi & foliorum.

ſaxatilis. 774. CAREX ſpicis tribus ovatis ſeſſilibus alternis; maſcula oblonga. *Sp.* 1385. *n.* 25.

Ced.

Digitized by Google

Oed. dan. t. 159.
Op de Duinen by Haarlem *en* Scheveningen. (D. RAINVILLE.)

Spicis ſexu diſtinctis: femineis pedunculatis.

775. CAREX ſpicis androgynis terminalibus pedunculatis: florentibus erectis; fructiferis pendulis. *Sp.* 1386. *n.* 26. *atrata.*
Gramen alpinum pulchrum, foliis caryophyllæis, ſpicis atris & tumentibus. *Scheuch. gram.* 481.
Oed. dan. t. 138.
Op de Duinen by Haarlem. (D. RAINVILLE.)

776. CAREX ſpicis ovatis pendulis: maſcula longiore erectiore, radice repente. *Sp.* 1386. *n.* 27. *limoſa.*
Cyperoides ſpica pendula breviore, ſquamis e ſpadiceo vel fuſco rutilante viridibus. *Scheuch. gram.* 442. *t.* 10. *f.* 15.
Gramen Cyperoides ſpica pendula minus. *Baub. pin.* 85.
Oed. dan. t. 158?
Tuſſchen de Duinen by Haarlem. (D. RAINVILLE.)

777. CAREX ſpicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capſulis obtuſiuſculis inflatis. *Sp.* 1385. *n.* 39. *Friſ.* 390. *panicea.*
Cyperoides foliis caryophyllæis, ſpicis e rarioribus & tumidioribus veſicis compoſitis. *Mich. gen.* 61. *t.* 32. *f.* 11. *Pluk. alm.* 178. *t.* 91. *f.* 7.
Oed. dan. t. 261.
In de Veenen en natte Hei-gronden, te Hulſen *by* Nymegen, Sneek, Groningen, *en elders.*

778. CAREX ſpicis pendulis, pedunculis geminatis. *Sp.* 1387. *n.* 32. *Gelr.* 511. *Pſeudo-Cyperus.*
Pſeudo-Cyperus. *Dod. pempt.* 339.
Gramen Cyperoides ſpica pendula breviore. *Baub. pin.* 6. *Comm. holl.* 51. *Moriſ. hiſt.* 340. *p.* 242. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 5.
Langs de Rivier het Spaarne, *den* Yſſel, *en aan de*

de kanten der Slooten op veele plaatſen.

diſtans. 779. CAREX ſpicis remotiſſimis ſubſeſſilibus, bractea vaginali, capſulis angulatis mucronatis. *Sp.* 1387. *n.* 33.
Gramen Cyperoides gracile alterum, glomeratis torulis ſpatio diſtantibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 18.
Aan de weg tuſſchen Rotterdam *en* Gouda, *by de eerſte Schuur.* (D. RAINVILLE.)

caeſpitoſa. 780. CAREX ſpicis erectis cylindricis ternis ſubſeſſilibus: maſcula terminali, culmo triquetro. *Sp.* 1388. *n.* 34.
Gramen Cyperoides caryophyllatum, folio longiore et angnſtiore, ſpicis ſeſſilibus compactis erectis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 14.
In de Turf-Veenen.

Spicis ſexu diſtinctis: maſculis pluribus.

acuta. 781. CAREX ſpicis maſculis pluribus, femineis ſubſeſſilibus, capſulis obtuſiuſculis. *Sp.* 1388. *n.* 35. *Gelr.* 510. 512.
ruffa. *α.* Gramen Cyperoides latifolium, ſpica ruffa ſive caule triangulo. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 83. *Comm. holl.* 51. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 242. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 1.
Variat hæc rurſus.
a. Spicis fructiferis androgynis.
b. Spicis fructiferis ſeſſilibus, inferiore tantum pedunculata.
c. Spica fructifera inferiore longius pedunculata & pendula.
d. Spica maſcula ſuperiore clavata ſeu abrupta.
nigra major β. Cyperoides nigro-luteum vernum majus. *Tourn. inſt.* 529.
Gramen Cyperoides majus anguſtifolium. *Park. theatr.* 1295. *Raj. hiſt.* 1293. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 165. *n.* 2.
Graminis nigro-lutei verni varietas major. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 494.

Hæc

Digitized by Google

Hæc gaudet ſæpe ſpicis femineis ſuperioribus binis.

γ. Cyperoides nigro-luteum vernum minus. *Tourn. inſt.* 529. *nigra minor*

Gramen nigro-luteum vernum. *Baub. biſt.* 2. *p.* 494. *Comm. boll.* 52. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 165. *n.* 3.

Gramen caryophyllatæ foliis minus, ſpica divulſa. *Baub. pin.* 3. *theatr.* 46. *Boerb. n.* 4.

Gramen ſpicatum foliis veronicæ caryophyllatæ. *Lob. ic.* 10.

Hæc porro variat

a. *Spicis femineis omnibus ſeſſilibus.*

b. *Spicis femineis longioribus, inferiore pedunculata.*

c. *Spica feminea inferiore longiſſime pedunculata*

Op vochtige plaatſen. α. in de Wei-landen aan het Spaarne *buiten* Haarlem, *om* Utrecht, Rotterdam, Bodegraven, Utrecht, Zwol, *in de Meben by* Harderwyk, *en elders. β. tuſſchen* Rotterdam *en* Overſchie. *γ. in vochtige zand gronden.*

Varietatis α. d. figura clavata in viva planta multo evidentior quam in ſicca.

782. Carex ſpicis maſculis pluribus, femineis pedunculatis, capſulis inflatis acuminatis. *Sp.* 1388. *n.* 36. *Gelr.* 647. *Friſ.* 391. *veſicaria.*

Gramen Cyperoides anguſtifolium, ſpicis longis erectis *Baub. pin.* 48. *theatr.* 14. *Comm boll.* 51.

Gramen Cyperoides majus præcox, ſpicis turgidis teretibus flaveſcentibus. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 242. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 6.

Zegge, of *Water-Riet-Gras.* Belg.

Menigvuldig aan de kanten van ſommige Vaarten en Slooten, en in laage moeraſſige Landen en Poelen.

Ill. Hallerus *biſt. pl. Helv. n.* 1401. *citans ad banc Caricem Floram meam Ingricam, excludit ſynonyma a me addita: ſed ex qua ratione non video, cum mea non alia ſint, quam quæ Ipſe Carici veſicariæ adſcripſit, ut conferenti patebit.*

783. Carex ſpicis remotis: maſculis pluribus, femineis ſubpedunculatis erectis, capſulis hirtis. *Sp.* 1389. *n.* 37. *hirta.*

Gramen ſpicatum, foliis & ſpicis hirſutis mollibus. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 48.

Gra-

Gramen Cyperoides polyſtachion lanuginoſum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 10. *Pluk. alm.* 178. *t.* 34. *f.* 6.
Oed. dan. t. 379.
Veel op dorre zandige plaatſen; te Rotterdam *op het* Bolwerk *tuſſchen de ſteenen.*
In humidis & herboſis creſcit ad altitudinem 2. 3. *&* 4. *pedum.*

TETRANDRIA.

LITTORELLA.

lacuſtris. 784. LITTORELLA. *Linn. mant.* 295.
Plantago *uniflora. Sp.* 167. *n.* 16. *Friſ.* 70.
Plantago floribus femineis ſeſſilibus ad exortum ſcapi uniflori maris. *Juſſ act. gall.* 1742. *p.* 131. *t.* 7.
Gramen junceum minus, capitulis longiſſimis filamentis donatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 230. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 3. *opt.*
Oed. dan. t. 170.
Op veele plaatſen in de Wouden *in* Friesland, *in Veen- en Zand-grond.*

BETULA.

alba. 785. BETULA foliis ovatis acuminatis ſerratis. *Sp.* 1393. *n.* 1. *Gelr.* 519. *Friſ.* 392.
Betula. *Baub. pin.* 427. *Dod. pempt.* 839. *Comm. holl.* 16.
Berke-boom. Belg.
Op verſcheide plaatſen, vooral in de Boſſchen.
Plantatur etiam & creſcit in arenoſis Velaviæ, ubi vix alia degit planta.

Alnus. 786. BETULA pedunculis ramoſis. *Sp.* 1394. *n.* 5. *Friſ.* 303.
glutinoſa. α. Alnus. *Dod. pempt.* 839. *Gelr.* 518.
Alnus rotundifolia glutinoſa viridis. *Baub. pin.* 428.
Elze-boom. Belg.

β. Al-

β. Alnus folio incano. *Baub. pin.* 428. *incana.*
a. Veel aan de Water-kanten. β. in de Salker-Waard.

B U X U S.

787. Buxus. *Sp.* 1394. *n.* 1. *Gelr.* 517. *Dod. pempt.* 782. *ſempervirens.*
Buxus arboreſcens. *Baub. pin.* 471.
Grove of *Boom-Palm, Busboom* of *Bosboom.* Belg.
Op de Duinkant buiten Haarlem *by den* Weligen berg *by* Overveen.
Pharm. Buxinum *lign.*
An vera indigena ſit, dubito.

U R T I C A.

788. Urtica foliis oppoſitis ovalibus. *Sp.* 1396. *n.* 5. *Gelr.* 515. *Friſ.* 394. *urens.*
Urtica urens minor. *Baub. pin.* 232. *Comm. holl.* 116.
Kleine Brand-Netelen. Belg.
By de Wegen.
Pharm. Urticæ minoris *herb.*

789. Urtica foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis. Sp. 1396. *n.* 6. *Gelr.* 515. *Friſ.* 395. *dioica.*
Urtica urens maxima. *Baub. pin.* 232. *Comm. holl.* 116.
Groote Netelen. Belg.
Op ruwe ongebouwde gronden langs de Wegen.
Pharm. Urticæ. *rad. herb.*

P E N T A N D R I A.

X A N T H I U M.

790. Xanthium caule inermi, foliis cordatis trinervatis. *Sp.* 1400. *n.* 1. *ſtrumarium*
Xanthium. *Fuchſ. hiſt.* 579. *Dod. pempt.* 39.
Lappa minor ſive Xanthium dioſcoridis. *Baub. pin.*

pin. 198. *Comm. boll.* 63.
Kleine Klitzen. Belg.
Aan den Yſſel-dyk by Campen; *te* Utrecht *buiten de Tolſteeg-poort; en op andere plaatſen.*

AMARANTHUS.

Blitum. 791. Amaranthus glomerulis lateralibus: floribus trifidis, foliis ovatis retuſis, caule diffuſo. *Sp.* 1405. *n.* 11. *Gelr.* 522.
Blitum album minus. *Baub. pin.* 118. *Cam. epit.* 236. *Comm. boll.* 16.
Witte Mayer. Belg.
By de wegen op verſcheide plaatſen.

POLYANDRIA.

CERATOPHYLLUM.

demerſum. 792. Ceratophyllum foliis dichotomo-bigeminis, fructibus triſpinoſis. *Sp.* 1409. *n.* 1. *Friſ.* 396.
Hydroceratophyllum folio aſpero quatuor cornibus armato. *Vaill. act.* 1719. *p.* 21. *t.* 2. *f.* 1.
Equiſetum ſub aqua repens, foliis bifurcis. *Loeſ. pruſſ.* 67. *t.* 12.
Pinaſtella infirmioribus & hamoſioribus caulibus, foliis inſtar cornu cervi diviſis. *Hall. jen.* 350.
Millefolium aquaticum cornutum *Raj. hiſt.* 1. *p.* 191. *Baub. hiſt.* 3 *p.* 789. *quoad deſcriptionem Comm. boll.* 76.
Op veele plaatſen in de Slooten; overvloedig in de Kolken by den Ouden-Ysfel, *en in de Graften om* Harderwyk.

MYRIOPHYLLUM.

ſpicatum. 793. Myriophyllum floribus maſculis interrupte ſpicatis. *Sp.* 1409. *n.* 1. *Gelr.* 525. *Friſ.* 397.
Millefolium aquaticum pennatum ſpicatum. *Baub. pin.* 141. *prodr.* 73. *f.* 1. *Comm. boll.* 76.
Water-Duizend-blad. Belg.

In

In de Vyvers en ſtilſtaande Wateren op veele plaatſen.

794. MYRIOPHYLLUM floribus omnibus verticillatis hermaphroditis. *Sp.* 1410. *n.* 2. *Friſ.* 398. *verticillatum.*
Myriophyllum aquaticum minus. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 252.
Millefolium aquaticum, floſculis ad foliorum nodos. *Baub. pin.* 151. *Comm. boll.* 75.
In ſtilſtaande Slooten by Tiel, *te* Loenen *aan de* Vecht; *in* Friesland *in de Wouden, alwaar Veenen zyn; gelyk ook by* Veenendaal *in 't Sticht van* Utrecht; *en elders.*

SAGITTARIA.

795. SAGITTARIA foliis ſagittatis acutis. *Sp.* 1410. *n.* 1. *Gelr.* 524. *Friſ.* 399. *Sagittifolia*
Sagitta aquatica minor latifolia. *Baub. pin.* 194. *Comm. boll.* 100.
Sagitta minor. *Dod. pempt.* 588.
Oed. dan. t. 172.
α. Sagitta aquatica minor anguſtifolia. *Baub. pin.* 194. *Comm. boll.* 100.
β. Sagitta aquatica major. *Baub. pin.* 194. *Comm. boll.* 100.
Sagitta major. *Dod. pempt.* 588.
γ. Sagitta aquatica major, falio anguſtiore. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 46.
Serpents-Tongen. Belg.
In ſtaande Wateren en Slooten op veele plaatſen. α. *By* Oidenbroek *in* Gelderland, *en by* Overveen *in* Holland. β *By den* Aardenhout. γ. *In de Graften om* Harderwyk; *in de Slooten by* Leerdam, *en elders.*

POTERIUM.

796. POTERIUM inerme, caulibus ſubanguloſis. *Sp.* 1411. *n.* 1. *Gelr.* 523. *Sanguiſorba.*
Pimpinella ſanguiſorba minor hirſuta. *Baub. pin.* 160. *Comm. boll.* 88.
Pimpinella Sanguiſorba. *Dod. pempt.* 105. *Cam. epit.* 777.
Pimpernel. Belg.
In de Duinen niet verre van Velſen; *en in het*

Bentveld *by* Haarlem; *overvloedig in de Weiden langs den* Yſſel *by* Zutphen.
Pharm. PIMPINELLÆ *rad. herb.*

QUERCUS.

Robur. 797. QUERCUS foliis deciduis oblongis ſuperne latioribus: ſinubus acutioribus, angulis obtuſis. *Sp.* 1414. *n.* 12. *Gelr.* 526. *Jngr.* 154. *Friſ.* 490.
Quercus cum longo pediculo. *Bauh. pin.* 420. *Comm. holl.* 94.
Quercus. *Fuchſ. hiſt.* 229. *Loeſ. pruſſ.* 31. *t.* 69.
Eike-boom. Belg.
β. Quercus latifolia mas, quæ brevi pedunculo. *Bauh. pin.* 419. *Comm. holl.* 94.
Quercus platyphyllos mas. *Dalech. hiſt.* 2.
Veel op de Veluwe; *in* Friesland *in de* Wouden; *by* Groningen *in 't* Goreght *in verſcheide boſſchen.* β. *In het* Haagſe-boſch, Haarlemmerhout, *en buiten* Utrecht.
Pharm. QUERCUS *cort. fol. glandes, gallæ.*

FAGUS.

ſylvatica. 798. FAGUS foliis ovatis obſolete ſerratis. *Sp.* 1416. *n.* 3. *Gelr.* 528. *Friſ.* 401.
Fagus. *Bauh. pin.* 419. *Dod. pempt.* 832. *Comm. holl.* 37.
Beuke-boom. Belg.
In veele Boſſchen in 't wild.

CORYLUS.

Avellana. 799. CORYLLUS ſtipulis ovatis obtuſis. *Sp.* 1417. *n.* 1. *Gelr.* 530. *Friſ.* 402.
Corylus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 418.
Avellana nux ſylveſtris. *Fuchſ. hiſt.* 398.
Haſelaar, Haaze-nooten-boom. Belg.
St. Lamberts-nooten. Gelris.
In het Haagſe-Boſch; *in veele Boſſchen in* Gelderland *en* Overyſſel; *op verſcheide Woud-plaatſen in* Friesland; *en in 't* Goreght.
Pharm. AVELLANÆ *nux.*

Digitized by Google

MONADELPHIA.

PINUS.

800. PINUS foliis geminis: primordialibus ſolitariis. *ſylveſtris.*
Sp. 1418. *n.* 1. *Gelr.* 532.
Pinus ſylveſtris. *Baub. pin.* 491. *Comm. holl.* 86.
Pinus ſylveſtris vulgaris genevenſis. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 253.
Wilde Pyn-boom, Sparre-boom. Belg.
Op veele plaatſen in Gelderland; *in het Boſch van* Uitenbogaard *buiten* Naarden; *in 't Schaapenboſch buiten* Haarlem; *te* Liſſe *tuſſchen* Haarlem *en* Leiden; *te* Drybergen, Maarsbergen, &c. *in 't Sticht van* Utrecht.
Pharm. PINI *reſina*, *Pix alba & nigra*, *Pix liquida*, *Terebinthina communis.*
In Prædio Viri Ill. H. a WESTERVELT *Eſſenburgo prope Harderovicum, Ao.* 1753. *lectus eſt ramus hujus arboris conis mire onuſtus, ita quidem ut centum circiter numerari potuerint, qui invicem inſidentes globum capitis humani magnitudinem æquantem efficiebant.*

SYNGENESIA.

BRYONIA.

801. BRYONIA foliis palmatis utrinque calloſo-ſcabris. *Sp.* 1438. *n.* 1. *Gelr.* 536. *alba.*
Bryonia aſpera ſive alba, baccis rubris. *Baub. pin.* 297. *Comm. holl.* 17. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 4. *ſ.* 1. *t.* 1. *f.* 5.
Wilde Wyngaard. Belg.
Veel aan de Waal-dyk by Nymegen *en* Tiel; *aan de dykjes langs de Wegen buiten* Zutphen; *aan de Hoven buiten* Harderwyk; *in de Duinen buiten*

'sHage, Haarlem, Alkmaar; *in de Heggen en Boſſchen in* Friesland; *en elders op ſchaduwachtige plaatſen.*

Pharm. BRYONIÆ *rad. far.*

Baccis nigris, quæ apud nos, ſemper monoica.

CLAS.

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

VALLISNERIA.

802. VALLISNERIA. *Sp.* 1441. *n.* 1. *Spiralis.*
Vallisneria paluſtris, algæ folio, italica, foliis in ſummitate denticulatis, flore purpuraſcente. *Mich. gen.* 12. *t.* 10. *f.* 1.
Habitat in piſcinis juxta foſſas Belgii rarius. (*Linn. h. Cliff.* 454.)

SALIX.

803. SALIX foliis ſerratis glabris, floribus pentandris. *Sp.* 1442. *n.* 3. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 153. *t.* 34. *f.* 1. *pentandra.*
Salix folio laureo ſive lato glabro odorato. *Raj. hiſt.* 1420. *angl.* 3. *p.* 449.
Duin-wilg. Belg.
Aan de Duinkant buiten Haarlem.

804. SALIX foliis ſerratis ovatis acutis glabris: ſerraturis cartilagineis, petiolis calloſo-punctatis. *Sp.* 1442. *n.* 5. *vitellina.*
Salix ſativa lutea, folio crenato. *Baub. pin.* 473.
Salix perſicæ folio, non auriculato. *Comm. holl.* 101.
Geele Wilg.
By 't Huis te Berkenrode *buiten* Haarlem, *en ook* in

in veele Waarden aan de Rivieren.

Arbor ſtaturæ parvæ. Folia longiora & anguſtiora, quam Salicis fragilis, ſerrata, pagina ſuperiore ſplendentia viridia, inferiore pallidiora. Rami juniores ſunt tenaces flexiles. (Comm.)

amygdalina 805. SALIX foliis ſerratis glabris lanceolatis petiolatis, ſtipulis trapeziformibus. *Sp.* 1443. *n.* 6.

Salix folio amygdalino utrinque virente aurito. *Baub. pin.* 43.

Salix ſylveſtris latifolia. *Tabern. ic.* 1037.

Wervelen-bout. Vulgo.

In de Salker-Waart; *in* Vieracker *en aan den Toldyk buiten* Zutphen; *ook buiten* Wyk by Duurſtede, *en elders.*

Eligno ſcalarum gradus conficiuntur; rami teneriores ad vitilia inſerviunt.

fragilis. 806. SALIX foliis ſerratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulofis. *Sp.* 1443. *n.* 8. *Fl. lapp.* 349. *t.* 8. *f.* B.

Salix fragilis. *Baub. pin.* 474. *prodr.* 159. *Comm. boll.* 101.

Salix, folio longo latoque ſplendente, fragilis. *Raj. angl.* 3. *p.* 448. *n.* 8. *cantab.* 143.

Katten-bout. Vulgo.

By Bloemendaal, *aan de Duinkant langs de Bleekeryen; by* Tiel, Uilenpas, Ouden-Aller *en elders in* Gelderland *aan de Slooten.*

purpurea. 807. SALIX foliis ſerratis glabris lanceolatis: inferioribus oppoſitis. *Sp.* 1444. *n.* 10.

Salix vulgaris nigricans, folio non ſerrato. *Baub. pin.* 473. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 210.

Salix rubra minime fragilis folio longo anguſto. *Baub. biſt.* 1. *p.* 215.

β. Salix vulgaris rubens. *Baub. pin.* 473. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 210. *Comm. boll.* 101.

γ. Salix folio longo non auriculato, viminea rubra. *Raj. cantab.* 143. *Comm. boll.* 102.

Roode Wilg. Belg.

Op veele plaatſen aan de Waterkanten. γ. *In Zeeland, en in de Zyp.*

Helix. 808. SALIX foliis ſerratis glabris lanceolato-linearibus: ſuperioribus oppoſitis obliquis. *Sp.* 1444. *n.* 11.

Sa-

Salix humilis, capitulo ſquamoſo. *Bauh. pin.* 474.
Salix tenuior, folio minore utrinque glabro, fragilis. *Baub. biſt.* 1. *p.* 213. *f.* 2. *Comm. boll.* 101.
Salix humilior, foliis anguſtis ſubcæruleis ex adverſo binis. *Raj. biſt.* 1421. *cantab.* 144. *angl.* 3. *p.* 448.
Bittere Wilg. Vulgo.
By Berkenroode, *en niet verre van* Velſen *in de Duinen, dog niet overvloedig.*

809. SALIX foliis integris ovatis acutis ſupra ſubvilloſis, ſubtus tomentoſis. *Sp.* 1447. *n.* 23. *Gelr.* 643. *arenaria.*
Salix pumila, foliis utrinque candicantibus & lanuginoſis. *Baub. pin.* 474. *Comm. boll.* 102. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 164. *t.* 36. *f.* 1.
Klein Zand-Wilg. Belg.
Kleine Wirf. Vulgo.
Overvloedig in de Duin-valeyen; en in de Meben by Harderwyk.

810 SALIX foliis integerrimis ovatis ſubtus pubeſcentibus. *Sp.* 1447. *n.* 26. *Friſ.* 403. *Linn. lapp.* 364. *t.* 8. *f.* R. *fuſca.*
Salix pumila, folio utrinque glabro. *Baub. biſt.* 1. *p.* 217.
Salix pumila brevi anguſtoque folio incano. C. B. *Comm. boll.* 102.
In de Duinen; en in de Wouden in Friesland.

811. SALIX foliis integerrimis lanceolato-linearibus ſtrictis ſeſſilibus ſubtus tomentoſis. *Sp.* 1448. *n.* 27. *Gelr.* 542. *Friſ.* 404. *roſmarinifolia.*
Salix humilis anguſtifolia. *Baub. pin.* 474.
Salix humilis repens anguſtifolia. *Lob. ic.* 2. *p.* 137.
Veel in de Gagel-kampen by Harderwyk; *en op de Heivelden in de* Wouden *in* Friesland.

812. SALIX foliis ovatis rugoſis ſubtus tomentoſis undatis ſuperne denticulatis. *Sp.* 1448. *n.* 28. *Gelr.* 540. *Friſ.* 405. *caprea.*
Salix latifolia rotunda. *Baub. pin.* 474. *Raj. angl.* 3. *p.* 449. *Comm. boll.* 101.
β. Salix foliis obſcure crenatis utrinque villoſis ovato-

 oblon-

Digitized by Google

oblongis. *Linn. lapp.* 365. *t.* 8. *f.* S.
Salix latifolia inferne hirſuta. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 215. 2.
Salix folio ex rotunditate acuminato. *Baub. pin.* 474. *Comm. boll.* 101.
Ronde Ruige Wilg. Belg.
Water-Wilg. Vulgo.
Aan 't eind van 't Kraayeneſt *by* Haarlem, *in de Duinen by* Weſterhout; *en in de* Salker-waart.

viminalis. 813. Salix foliis ſubintegerrimis lanceolato-linearibus longiſſimis acutis ſubtus ſericeis, ramis virgatis. *Sp.* 1448. *n.* 29. *Gelr* 538. *Friſ.* 406.
Salix anguſtis & longiſſimis foliis criſpis, ſubtus albicantibus. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 212. *Comm. boll.* 101.
Salix folio longiſſimo. *Raj. angl.* 3. *p.* 450.
Rieswaart. Vulgo.
Overvloedig langs den Yſel, Rhyn *en* Leck; *ook by de voorige, en in de* Wouden *in* Friesland.

cinerea. 814. Salix foliis ſubſerratis oblongo-ovatis ſubtus ſubvilloſis, ſtipulis dimidiato-cordatis. *Sp.* 1449. *n.* 30. *Friſ.* 407.
Salix foliis integris glabris lanceolato-ovatis. *Linn. lapp.* 358.
Op veele plaatſen in Friesland, *in de* Wouden, *aan wegen, in gruppels en boſſchen.* (Meese)

alba. 815. Salix foliis lanceolatis acuminatis ſerratis utrinque pubeſcentibus: ſerraturis infimis glanduloſis. *Sp.* 1449. *n.* 31. *Gelr.* 537. *Friſ.* 408.
Salix vulgaris alba arboreſcens. *Baub. pin.* 473. *Comm. boll.* 101.
Salix maxima fragilis alba hirſuta. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 212.
Wilge-boom. Belg.
Langs de Wegen aan de Water-kanten.
Pharm. Salicis *cort. fol.*

TRI-

TRIANDRIA.

EMPETRUM.

816. EMPETRUM procumbens. *Sp.* 1450. *n.* 2. *Gelr.* 559. *Friſ.* 409. *nigrum.*
Erica baccifera procumbens nigra. *Baub. pin.* 486. *Comm. boll.* 34.
Erica baccifera matthioli. *Baub. biſt.* 1. *p.* 526.
Beziën draagende Heide. Belg.
Kraay-Heide. Ruſticis Velaviæ.
Op de Heide by Ermello, Elſpeet, *op den* Tryſelberg, *en elders op de* Veluwe; *by* Bergum, Suyderhuyſum, *en elders in* Friesland; *ook in* Zeeland.

TETRANDRIA.

VISCUM.

817. VISCUM foliis lanceolatis obtuſis, caule dichotomo, ſpicis axillaribus. *Sp.* 1451. *n.* 1. *album.*
Viſcum baccis albis. *Baub. pin.* 423. *Comm. boll.* 115.
Viſcum. *Cam. epit.* 555. *Dod. pempt.* 740.
Marentakken. Belg.
Op verſcheide ſoorten van Boomen; te Amſterdam *op de Ulmus; in de* Haarlemmer-hout *op de Betula; by* Dordrecht *op de Prunus; en voorts op de Quercus, en meer ſoorten van Boomen. (volgens* COMMELYN, *dog door den Heer* D. HOUTTUYN, *my, en veele anderen niet gevonden.)*
Pharm. VISCI QUERCINI *lign.*

HIPPOPHAE.

818. HIPPOPHAE foliis lanceolatis. *Sp.* 1452. *n.* 1. *Rhamnoides.*
Rhamnus ſalicis folio anguſtiore, fructu flaveſcente. *Baub. pin.* 755. *Comm. boll.* 98.

Rhamni ſpecies. *Cam. epit.* 81.
Oed. dan. t. 265.
Duin-Doorn. Belg.
Scheit-beziën. Vulgo.
In de Duinen buiten 's Gravenhage, Haarlem, *by* Overveen, Zandvoort, Catwyk, Noordwyk, &c. *buiten* Alkmaar *naar* Egmond op den Hoef, *en op meer plaatſen.*

MYRICA.

Gale. 819. MYRICA foliis lanceolatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo. *Sp.* 1453. *n.* 1. *Gelr.* 543. *Friſ.* 410.
Rhus myrtifolia belgica. *Bauh. pin.* 414. *Comm. holl.* 98.
Chamæleagnus. *Dod. pempt.* 780.
Oed. dan. t. 327.
Gagel. Belg.
Poſt. Zutphanienſibus & Twentinis.
Luis-kruid. Quibusdam.
Overvloedig beneden Nymegen *aan de Waalkant, en in vochtige Hei-kampen by* Zutphen, Harderwyk, Utrecht, Zwol, Enſcheide; *in de Veenen by* Mydrecht; *in de* Wouden *in* Friesland; *agter* Haren *aan den weg naar de* Waterhuizen, *en aan den weg naar* Onnen *en* Noorlaren *by* Groningen; *en elders.*
Mas frequentiſſime, raro Femina occurrit.
Odor reſinoſus e longinquo percipitur.
Dolia, quibus carnes ſalitæ byeme ſervantue, bujus odore prius imbunntur.
Ruſtici ramulos lectis ſupponunt ad fugandos pulices & pediculos.

PENTANDRIA.

HUMULUS.

Lupulus. 820. HUMULUS. *Sp.* 1457. *n.* 1. *Gelr.* 546. *Friſ.* 411.
Lupulus mas. *Baub. pin.* 298. *Comm. holl.* 69.
Lupulus femina. *Baub. pin.* 298. *Cam. epit.* 954.
Hop. Belg.

Veel

Veel langs de Wegen op ſchaduwachtige plaatſen, by Harderwyk, Leerdam, Heemſtede, Utrecht, Wyk by Duurſtede, *te* Glimmen *en op de* Mickelhorſt *by* Groningen; *in 't* Haagſe-Boſch; *in de* Wouden *in* Friesland; *en elders.*

Pharm. LUPULI *herb. coni.*

OCTANDRIA.

POPULUS.

821. POPULUS foliis ſubrotundis dentato-angulatis ſubtus tomentoſis. *Sp.* 1463. *n.* 1. *Gelr.* 547. *alba.*

Populus alba, majoribus foliis. *Baub. pin.* 429. *Comm. holl.* 92.

Populus alba. *Dod. pempt.* 835.

Witte Populier, of *Peppel-boom, Abeel-boom.* Belg. *Beveſt.* Gelris.

β. Populus alba, minoribus foliis. *Baub. pin.* 429. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 211.

Veel in de Duinen by Heemſtede, *ook buiten* Tiel *en* Utrecht *op ruwe plaatſen.*

822. POPULUS foliis ſubrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. *Sp.* 1464. *n.* 2. *Gelr.* 548. *Friſ.* 412. *tremula.*

Populus tremula. *Baub. pin.* 429. *Comm. holl.* 92.

Populus libyca. *Dod. pempt.* 836.

Ratelaar, Eſpen-boom. Belg.

Veel by Tiel, Harderwyk, Wageningen, Zwol, *in 't* Haagſe-Boſch, *en elders.*

823. POPULUS foliis deltoidibus acuminatis ſerratis. *Sp.* 1464. *n.* 3. *Gelr.* 549. *nigra.*

Populus nigra. *Baub. pin.* 429. *Dod. pempt.* 836. *Comm. holl.* 92.

Populier-boom, Peppel-boom. Belg.

Op veele plaatſen langs de Wegen, en in de Duinen.

Pharm. POPULI NIGRÆ *gemmæ ſ. oculi.*

EN-

E N N E A N D R I A.

M E R C U R I A L I S.

annua. 824. MERCURIALIS caule brachiato, foliis glabris, floribus ſpicatis. *Sp.* 1465. *n.* 3. *Gelr.* 550. *Friſ.* 413.

MAS.	FEMINA.
Mercurialis ſpicata ſive femina. *Baub. pin.* 121. *Comm. boll.* 74. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 612. *ſ.* 5. *t.* 34. *f.* 2.	Mercurialis teſticulata ſive mas. *Baub. pin.* 121. *Comm. boll.* 74. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 612. *ſ.* 5. *t.* 34. *f.* 1.

Bingel-kruid. Belg.
Op vochtige ſchaduwachtige plaatſen in de Moes-boven, veel by Harderwyk.
Pharm. MERCURIALIS *herb.*

H Y D R O C H A R I S.

Morſus ranæ. 825. HYDROCHARIS. *Sp.* 1466. *n.* 1. *Gelr.* 551. *Friſ.* 414.
Nymphæa alba minima. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 81.
Ranæ morſus. *Dod. pempt.* 583. *f.* 2.
Vorſche-beet. Belg.
Overvloedig in ſtilſtaande Slooten en Graften.

M O N A D E L P H I A.

J U N I P E R U S.

communus. 826. JUNIPERUS foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. *Sp.* 1470. *n.* 1. *Gelr.* 552.
Juniperus vulgaris fruticoſa. *Baub. pin.* 488. *Comm. boll.* 67.
Juniperus. *Dod. pempt.* 852.

Digitized by Google

Genever - boom. Belg.
Dammeren - bout, *Vrakel - beſſen*. Ruſticis.
Op *de* Veluwe *op verſcheide plaatſen*, *ook tuſſchen* Utrecht *en* Amersfoort, *en omtrent* Zwol.
Pharm. JUNIPERI *lign. bacc. gummi.*
Juniperus ſaluberrima arbor eſt, ſed ſi homo diu verſatur aut dormit ſub ejus umbra, per hanc athmoſphæram mutatur quaſi a nimio vino. (BOERH. *morb. nerv.* 232.)

CLAS-

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA

MONOECIA.

HOLCUS.

mollis. 827. Holcus glumis biſloris nudiuſculis: floſculo hermaphrodito mutico; maſculo ariſta geniculata. *Sp.* 1485. *n.* 6. *Schreb. gram.* 149. *t.* 20. *f.* 2.

Gramen caninum longius radicatum majus. *Bauh. pin.* 1. *Comm. holl.* 46.

Gramen caninum longius radicatum molle. *Raj. hiſt.* 1285. *Scheuch. gram.* 235. *t.* 4. *f.* 25.

β. Gramen caninum longius radicatum minus. *Bauh. pin.* 1. *Comm. holl.* 46.

In de zandige Bouw-landen buiten Haarlem *omtrent* Heemſtede; *aan het* Haagſe-Boſch *by* Zorgvliet; *en elders.*

Variat paniculæ colore viridi, olivaceo, flaveſcente, et amplitudine.

lanatus. 828. Holcus glumis biſloris villoſis: floſculo hermaphrodito mutico; maſculo ariſta recurva. *Sp.* 1485. *n.* 5. *Gelr.* 40. *Friſ.* 415.

Holcus panicula laxa nutante, glumis oblongis, foliis acuminato-ſetaceis. *Schreb. gram.* 145. *t.* 20. *f.* 1.

Gramen pratenſe paniculatum molle. *Bauh. pin.* 2. *prodr.*

Digitized by Google

prodr. 3. *theatr.* 27. *Comm. holl.* 46. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 202. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 34. *Scheuch. gram.* 234. *t.* 4. *f.* 24. A. B.
Gramen paniculatum molle, panicula dilute cærulea. *Loeſ. pruſſ.* 3. *t.* 25.
Gramen lanatum. *Dalech. hiſt.* 425.
Op hooge zandige Velden buiten Harderwyk, Arnhem, Haarlem, Zwol, &c. *in de* Wouden *in* Friesland.
Variat glumarum & antherarum colore albo, dilute purpureo, purpureo et nigro. Variat etiam paniculis ſtrictis et veluti ſpicatis, paniculisque amplioribus diffuſis. Ariſtæ in viva planta fere omnes rectæ. Petala interdum longiſſime excreſcunt.

829. HOLCUS glumis trifloris muticis acuminatis: floſculo hermaphrodito diandro. *Sp.* 1485. *n.* 7. *odoratus.*
Herocloe. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 101.
Gramen paniculatum odoratum. *Bauh. pin.* 7. *prodr.* 7.
Gramen mariæ boruſſorum. *Loeſ. pruſſ.* 111. *t.* 26.
Aan den weg tuſſchen Rotterdam *en* Overſchie; *ook by* Gouda *en* Bodegraven. (D. RAINVILLE.)
Floſculus intermedius minor conſtanter fere femineus eſt, rariſſime hermaphroditus diandrus apud nos conſpicitur.

VALANTIA.

830. VALANTIA floribus maſculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. *Sp.* 1491. *n.* 6. *Gelr.* 73. *app. p.* 244. *Cruciata.*
Cruciata hirſuta. *Bauh. pin.* 335. *ſ.* 9. *t.* 21. *f.* 1.
Cruciata. *Dod. pempt.* 357.
Overvloedig in de Laanen van de Heerlykheid Loenen *en* Hemmen *in de* Betuwe; *by* Zutphen, Ryſſelt, *op 't* Blik, *en elders in 't Graafſchap Zutphen; in de Marsſtraat by de* Latmer, *en by* Brummen *op de* Veluwe; *aan den laage weg tusſchen* Wageningen *en de* Greb; *aan den Dyk tuſſchen* Zoelmond *en* Beuzichem *in 't Graafſchap* Buuren; *by* Amerongen *in 't Sticht van* Utrecht.

PARIETARIA.

831. PARIETARIA foliis lanceolato-ovatis, pedun- *officinalis.*
cu-

Digitized by Google

culis dichotomis, calycibus diphyllis. *Sp.* 1492. *n.* 1. *Gelr.* 554.

Parietaria officinarum et dioſcoridis. *Baub. pin.* 121. *Comm. boll.* 85. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 600. *ſ.* 5. *t.* 30. *f.* 1.

Helxinc. *Cam. epit.* 849.

Oed. dan. t. 521.

Glas-kruid. Belg.

Aan oude muuren te Nymegen, Tiel, Zutphen, Harderwyk, Haarlem, Leerdam, Utrecht, Zwol; *aan de Tolkamer te* Arnhem; *te* Alkmaar *in den Hout; te* Honswyk *aan den Dyk; en elders.*

A T R I P L E X.

Portulacoides. 832. Atriplex caule fructicoſo, foliis obovatis. *Sp.* 1493. *n.* 2. *Friſ.* 416.

Halimus ſ. Portulaca marina. *Baub. pin.* 120. *Comm. boll.* 56.

Portulaca marina. *Dod. pempt.* 771.

Zee-Porcelyn. Belg.

Langs bet Zee-en Maas-ſtrand achter 's Gravezande; *op bet Koegras by* Texel; *aan de Zee-Dyken en Duinen der* Zeeuwſe-Eilanden; *tuſſchen* Roptazyl *en* Dykshoek, *en elders in* Friesland; *aan den* Dollert *by* Delfzyl.

laciniata. 833. Atriplex caule herbaceo, foliis deltoidibus dentatis ſubtus argenteis. *Sp.* 1494. *n.* 8. *Gelr.* 557. *Friſ.* 417.

Atriplex maritima laciniata. *Baub, pin.* 120. *Comm. boll.* 14. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 607. *ſ.* 5. *t.* 32. *f.* 17.

Atriplex marina *Dod. pempt.* 615.

Zee-Melde. Belg.

Aan bet Zeeſtrand by Harderwyk; *langs de* Muider-dyk; *langs 't Maasſtrand achter* 's Gravezande; *aan de Zee-dyk tuſſchen de* Helder *en 't* Nieuwendiep; *en in* Friesland *by de voorige.*

haſtata. 834. Atriplex caule herbaceo, calycis valvulis femineis magnis deltoidibus ſinuatis. *Sp.* 1494. *n.* 9. *Gelr.* 644.

Atripelx ſylveſtris annua, folio deltoide triangulari ſinuato & mucronato, haſtæ cuſpidi ſimili. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 607. *ſ.* 5. *t.* 32. *f.* 14.

Langs de Wegen en op Meſthoopen omtrent Amſterdam

dam *en* Zwol.
Hanc plantam COMMELINUS *indicavit nomine* Atriplicis ſylveſtris alteræ C. B. *Vid. Comm. Cat. pl. Horti Med. Amſt. p.* 45.

835. ATRIPLEX caule herbaceo patulo, foliis ſub-deltoideo-lanceolatis, calycibus ſeminum diſco dentatis. *Sp.* 1494. *n.* 10. *Gelr.* 556. *Friſ.* 418. *patula.*
Atriplex anguſto oblongo folio. *Baub. pin.* 119. *Comm. holl.* 14.
Atriplex ſylveſtris polygoni ſ. helxines foliis. *Lob. ic.* 257.
Laage wilde Melde. Belg.
Smeeltje. Ultrajectinus.
By de Wegen, in Moesboven, Zaai-landen, by Meſt-en Vulnis-hoopen.

836. ATRIPLEX caule herbaceo erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis. *Sp.* 1494. *n.* 11. *Friſ.* 419. *littoralis.*
Atriplex anguſtiſſimo & longiſſimo folio. *Tourn. inſt.* 505. *Herm. lugdb.* 79.
Atriplex maritima anguſtifolia. *Comm. holl.* 14.
Zeer overvloedig aan de Wierdyk naar 't Nieuwe-diep, *en aan die van* Texel; *in de Buitendykſche landen aan het* Y; *langs 't Maasſtrand achter* 's Gravezande; *aan 't Zeeſtrand tuſſchen* Harlingen *en* Dykshoek, &c. *in* Friesland; *en by* Delfzyl.

ACER.

837. ACER foliis quinquelobis inæqualiter ſerratis, floribus racemoſis. *Sp.* 1495. *n.* 2. *Gelr.* 228. *Pſeudo-Platanus.*
Acer montanum candidum. *Baub. pin.* 430. *Comm. holl.* 3.
Acer majus. Dod. *pempt.* 840. *Lob. hiſt.* 614. *Duham. arb.* 1. *t.* 36. *f.* 1.
Eſch-doorn, Aborn-boom, Luiten-boom, Violen-hout of *boom, Schotſche-Linde-boom.* Belg.
In Hierden *by* Greven-hof, *in* Hulshorſt, *en elders buiten* Harderwyk; *in de* Haarlemmer-hout; *in 't Boſch van 't Huis te* Nieuwenburg *buiten* Alkmaar; *zeer veel aan de Gooijer-Wetering achter* Zandenburg *by* Wyk te Duurſtede;

en op meer andere plaatſen.
Forſan olim aliunde allata.

campeſtre. 838. Acer foliis lobatis obtuſis emarginatis. *Sp.* 1497. *n.* 7. *Gelr.* 227.
Acer campeſtre & minus. *Baub. pin.* 431. *Comm. boll.* 4.
Acer minus. *Dod. pempt.* 840.
Kleine Eſcb-doorn, Boog-bout. Belg.
Eſſen-doorn. Ruſticis.
Spaanſche-Aak. Vulgo.
In Eldrik, Wehl, *en elders in 't Graafſchap* Zutphen; *op* Eſſenburg *by* Harderwyk; *in de* Haarlemmer-hout; *in 't* Berger-boſch *buiten* Alkmaar; *ook by* Deventer, Zwol, *en elders.*

DIOECIA.

FRAXINUS.

excelſior. 839. Fraxinus foliolis ſerratis, floribus apetalis. *Sp.* 1509. *n.* 1. *Gelr.* 558. *Friſ.* 420.
Fraxinus excelſior. *Baub. pin.* 416. *Comm. boll.* 38.
Fraxinus. *Dod. pempt.* 833.
Eſſchen-boom. Belg.
Op veele plaatſen aan de Wegen, en in de Boſſchen; ook op oude Muuren.
Pharm. Fraxini *cort. ſem.*

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

EQUISETUM.

840. Equisetum caule ſpicato, frondibus compoſitis. *Sp.* 1516. *n.* 1. *ſylvaticum.*
Equiſetum ſylvaticum. *Tabern. hiſt.* 562.
Equiſetum ſylvaticum, tenuiſſimis ſetis. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 245. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 107.
† *Volgens* Boerhaave.

841. Equisetum ſcapo fructificante nudo; ſterili frondoſo. *Sp.* 1516. *n.* 2. *Gelr.* 560. *Friſ.* 421. *arvenſe.*
Equiſetum arvenſe longioribus ſetis. *Bauh. pin.* 16.
Equiſetum pratenſe, longiſſimis ſetis. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 246. *f.* 8.
Hermoes, Paarde-Staart. Belg.
Roobol, Unjer. Ruſticis.
In laage Wei-landen; ook in de Duinen.

842. Equisetum caule angulato, frondibus ſimplicibus. *Sp.* 1516. *n.* 3. *Gelr.* 561. *Friſ.* 422. *paluſtre.*
Equiſetum paluſtre, brevioribus ſetis. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 242. *Comm. holl.* 33.
Klein Water-Paarde-Staart. Belg.
Hout-pypen- Groninganis.
β. Equiſetum paluſtre minus polyſtachyon. *Bauh.* *pin.*

pin. 16. *prodr.* 24. *Raj. angl.* 3. *p.* 131. *t.* 5. *f.* 3.

In vochtige zandige gronden, en aan de Duin-beekjes; veelvuldig in de Slooten van 't Goreght *buiten* Groningen. β. *Tuſſchen* Oudehorne *en* Oude-Berkoop *dicht aan het Tol-huis in een uitwatering aan de Rivier de* Kuinder.

Fluviatile. 843. EQUISETUM caule ſtriato, frondibus ſubſimplicibus. *Sp.* 1517. *n.* 3.

Equiſetum paluſtre, longioribus ſetis. *Bauh. pin.* 15. *theatr.* 242. *Comm. holl.* 35.

Groot Paarde-Staart, Hermoes. Belg.

Breekebeen. Ultrajectinis.

β. Equiſetum paluſtre, tenuiſſimis & longiſſimis ſetis. *Bauh. pin.* 16. *prodr.* 24. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 729. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 107. *n.* 4.

In vochtige Wei-landen, en aan de kanten der Slooten.

Pharm. CAUDÆ EQUINÆ *herb.*

Hyemale. 844. EQUISETUM caule nudo ſcabro baſi ſubracemoſo. *Sp.* 1517. *n.* 6. *Gelr.* 562.

Equiſetum. *Cam. epit.* 770. *f.* A.

Equiſetum foliis nudum non ramoſum, ſeu junceum. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 248. *f.* 10. *Comm. holl.* 33.

Equiſetum foliis nudum ramoſum. *Bauh. pin.* 16. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 107.

Groot Paarde-Staart. Belg.

Schaafſtroo. Vulgo.

In de Boſſchen by ter Wolde *op de* Veluwe, *en aan de* Land-ſtraat *in 't Graafſchap* Zutphen; *als ook in ſtilſtaande Slooten en Graften by de* Vecht *omtrent den* Berg; *en op meer plaatſen.*

Scriniariis ad lævigandum inſervit, unde Schaafſtroo *appellatur.*

OPHIOGLOSSUM.

vulgatum. 845. OPHIOGLOSSUM fronde ovata. *Sp.* 1518. *n.* 1. *Gelr.* 564.

Ophiogloſſum vulgatum. *Bauh. pin.* 548. *Comm. holl.* 82.

Ophiogloſſum. *Dod. pempt.* 139.

Oed.

Oed. dan. t. 147.
Adders-tong, Speer-kruid, Chriſti Lancet. Belg.
In de Duin-valeyen by 's Hage, *en 't Huis te* Brederode; *en in vochtige landen by* Zutphen *en* Zwol.

OSMUNDA.

846. OSMUNDA ſcapo caulino ſolitario, fronde pinnata ſolitaria. *Sp.* 1519. *n.* 2. *Lunaria.*
Lunaria racemoſa minor & vulgaris. *Baub. pin.* 354. *Comm boll.* 68.
Lunaria minor. *Cam. epit.* 643.
Oed. dan. t. 18.
Maan-kruid. Belg.
In de Duin-valeyen; veel achter 't Jooden Kerkhof by 's Hage.

847. OSMUNDA frondibus bipinnatis apice racemiferis. *Sp.* 1521. *n.* 12. *Gelr.* 563. *Friſ.* 423. *regalis.*
Filix ramoſa, non dentata florida. *Baub. pin.* 357. *Comm. boll.* 38.
Filix paluſtris. *Dod. pempt.* 463.
Oed. dan. t. 217.
Water-Varen, Groote-Varen. Belg.
Aan donkere vochtige kanten der Slooten in Hulshorſt, Hierden, Tonzel, *en elders omtrent* Harderwyk; *by* Naarden, Zwol; *by* Balk *en op meer plaatſen in de* Wouden *in* Friesland; *by de* Mickelhorſt *buiten* Groningen.
Pharm. OSMUNDÆ REGALIS *rad.*

848. OSMUNDA frondibus lanceolatis pinnatifidis: laciniis confluentibus integerrimis parallelis. *Sp.* 1522. *n.* 16. *Gelr.* 566. *Friſ.* 424. *Spicant.*
Lonchitis minor. *Baub. pin.* 359.
Lonchitis aſpera. *Dod. pempt.* 469.
Polypodium folio vario. *Tourn. inſt.* 540.
Struthiopteris. *Hall. hiſt.* 1687.
Oed. dan. t. 99.
Te Hulſen *by* Nymegen; *in 't Boſch van* Clarenbeek *by* Arnhem; *in* Tonzel *aan de Nykerkerweg buiten* Harderwyk; *omtrent den* Tryſelberg *by* Meulekate *buiten* Hattem; *by den* Zwaluwenberg; *tuſſchen de* Bilt *en* Zeiſt *buiten* Utrecht; *op veele plaatſen in de* Wouden *in* Friesland; *op*

de Mickelhorſt, *en aan den weg naar* Onnen; *en op veele andere plaatſen in de Provintie* Groningen; *en elders aan byna uitgedroogde Slooten onder de boomen.*

Ill. HALLERUS (*bibl. bot. tom.* 2. *p.* 309.) *recenſens plantas minus vulgares in Flora Gelro-Zutphanica a me enumeratas, hanc plantam pene incredibilem pronunciat; ſed ſi eximius ille Botanicus hanc provinciam unquam peragraſſet, procul dubio de veritate convictus fuiſſet; eademque etiam hæc planta non minus vulgaris in Dioeceſi Ultrajectina a me, in Friſia ob Hortulano* MEESE, *et in Provincia Groningana a peritis Botanicis* D. RAINVILLE & VAN MARUM *obſervata fuit.*

Legi hanc plantam fronde ſuperne bifida prope Harderovicum.

PTERIS.

aquilina. 849. PTERIS frondibus ſupradecompoſitis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis; ſuperioribus minoribus. *Sp.* 1533. *n.* 13. *Gelr.* 565. *Friſ.* 425.

Filix ramoſa major, pinnulis obtuſis non dentatis. *Bauh. pin.* 357. *Comm. holl.* 38.

Filix fœmina. *Fuchs. hiſt.* 596. *Cam. epit.* 992. *Dod. pempt.* 462.

Varen-Wyfke. Belg.

Overvloedig in de Boſſchen op veele plaatſen; en in de Duinen by Bennebroek, Egmond, *en elders.*

ASPLENIUM.

Scolopendrium. 850. ASPLENIUM frondibus ſimplicibus cordato-lingulatis integerrimis, ſtipulis hirſutis. *Sp.* 1537. *n.* 3.

Phyllitis. *Cam. epit.* 579. *Dod. pempt.* 567.

Lingua cervina officinarum. *Bauh. pin.* 353. *Comm. holl.* 68. *Plum. fil.* 34. *t.* 4. *f.* 4.

Harts-tong. Belg.

In een oude Put in 't Weduwen-huis te Doesburg; *en aan ſommige oude Muuren in de Stad* Utrecht, Zwol, *en elders.*

Pharm. LINGUÆ CERVINÆ *herb.*

851. As-

851. ASPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis ſubrotundis crenatis. *Sp.* 1540. *n.* 19. *Gelr.* 645. *Trichomanes.*
Trichomanes ſive Polytrichum officinarum. *Baub. pin* 356. *Comm. boll.* 111. *Plum. fil.* 26. *t.* V. *f.* 1.
Trichomanes. *Fuchſ. biſt.* 796. *Cam. epit.* 925. *Dod. pempt.* 471.
Oed dan. t. 119.
Wederdood, *Steenbreek.* Belg.
Aan de Noord-zyde van de Groote Kerk te Harderwyk; *aan de muur om 't Huis te* Zwanenburg; *aan de Kerk en Paſtory-muur te* Zoelen *in de* Betuwe; *te* Boven-Karſpel *en te* Barſingerhorn *in* Noord-Holland; *en aan de muur van de oude Brug van 't Huis* Ypenſteyn *by* Alkmaar.
Pharm. POLYTRICHI ſ. TRICHOMANIS *herb.*

852. ASPLENIUM frondibus alternatim decompoſitis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Sp.* 1541. *n.* 22. *Gelr.* 567. *Friſ.* 426. *Ruta muraria.*
Ruta muraria. *Baub. pin.* 356. *Dod. pempt.* 470. *Comm. boll.* 100.
Oed. dan. t. 190.
Steen-Ruite, *Muur-Ruite*, *Venus-Hayr.* Belg.
Aan oude Muuren op veele plaatſen.
Pharm. ADIANTHI ALBI ſ. RUTÆ MURARIÆ *herb.*

POLYPODIUM.

853. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata. *Sp.* 1544. *n.* 13. *Gelr.* 568. *Friſ.* 427. *vulgare.*
Polypodium vulgare. *Baub. pin.* 359. *Comm. boll.* 92. *Plum. fil.* 27. *t.* A. *f.* 2.
Polypodium majus. *Dod. pempt.* 464.
Boom-Varen, *Engelzoet.* Belg.
β. Polypodium minus. *Baub. pin.* 359. *Dod. pempt.* 464. *Hoerb. lugdb.* 1. *p.* 24.
Op veele plaatſen aan Wallen, *Wegen*, *en in de Boſſchen*, *op oude Wilge-boomen*, *en aan de wortels van de Eike-boomen.*
Pharm. POLYPODII *rad. herb.*
Dum florere incipit, *primum ſe flores produnt in foliolis ſuperioribus.*

criſtatum. 854. Polypodium frondibus ſubbipinnatis: foliolis ovato-oblongis; pinnis obtuſiuſculis apice acute ſerratis. *Sp.* 1551. *n.* 42. *Friſ.* 428.
Filix non ramoſa major pinnulis latiuſculis longioribus in profundos denticulos diviſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 579. *ſ.* 14. *t.* 3. *f.* 11.
Omtrent Oude-Berkoop *in een Boſch niet verre van de Ry-weg.* (Meese.)

Filix mas. 855. Polypodium frondibus bipinnatis: pinnis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo. *Sp.* 1551. *n.* 43. *Gelr.* 509. *Friſ.* 429.
Filix non ramoſa dentata. *Baub. pin.* 358. *Comm. holl.* 38.
Filix mas. *Dod. pempt.* 462.
Varen Manneke, Boſch-Varen. Belg.
In de Boſſchen, en op andere donkere vochtige plaatſen.
Pharm. Filicis *rad. herb.*

F. femina. 856. Polypodium frondibus bipinnatis: pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Sp.* 1551. *n.* 44. *Friſ.* 430.
Filix mas non ramoſa, pinnulis anguſtis rarioribus profunde dentatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 579. *ſ.* 14. *t.* 3. *f.* 8.
Filicula petræa fæmina 1. *Tabern. ic.* 793.
In de Boſſchen van Zandhorſt, *en elders op ſchaduachtige plaatſen; op* Leeuwenberg *in 't* Sticht *van* Utrecht *tuſſchen de ſteenen der Pediſtallen; ook by de voorige, dog zeldzaamer.*

PILULARIA.

globulifera. 857. Pilularia. *Sp.* 1563. *n.* 1. *Friſ.* 431.
Pilularia paluſtris juncifolia. *Vaill. par.* 459. *t.* 15. *f.* 6. *Dill. muſc.* 538. *t.* 79. *f.* 1. *Juſſ. act.* 1739. *p.* 240. *t.* 11.
Graminifolia paluſtris repens, vaſculis granorum piperis æmulis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 608. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 49.
Oed. dan. t. 223.
In Friesland *ten Ooſten* Kuik-horne *en* Bergum *aan een Water-poel.*

MUS-

MUSCI.

LYCOPODIUM.

858. LYCOPODIUM foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. *Sp.* 1564. *n.* 4. *Gelr.* 578. *Friſ.* 432. *clavatum.*

Lycopodium vulgare piloſum anfrachioſum & repens. *Dill. muſc.* 441. *t.* 58. *f.* 1.

Muſcus terreſtris clavatus. *Bauh. pin.* 360. *Comm. boll.* 77.

Oed. dan. t. 126.

Wolfs-Klaauw. Belg.

Op de Heide by Uilenpas, Harderwyk, Veldwyk, Lovenich, *aan den* Tryſel-berg, *in 't* Sourſe-Boſch, &c. *in* Gelderland; *by* Naarden *en* Velſen *in* Holland; *by* Amersfoort *en* Doorn *in 't Sticht van* Utrecht; *te* Bergum, Dragten, &c. *in* Friesland.

Pharm. LYCOPODII *ſem.* (*pollen.*)

In Ruſſia, vernali præſertim tempore, ſæpe obſervatur pluvia ſulphurea dicta, quæ eſt pluvia, cui permiſtus eſt pollen hujus Lycopodii, in ſpicis præcedentis autumni reſiduus, & vere per ventum diſperſus.

859. LYCOPODIUM foliis ſparſis integerrimis, ſpicis terminalibus folioſis *Sp.* 1565. *n.* 8. *Gelr.* 654. *Friſ.* 433. *inundatum.*

Lycopodium paluſtre repens, clava ſingulari. *Vaill. par.* 123. *t.* 16. *f.* 11. *Dill. muſc.* 452. *t.* 62. *f.* 7.

Op 't Ermeller-Veld *buiten* Harderwyk *op vochtige plaatſen*; *in* Friesland *by 't voorige.*

860. LYCOPODIUM foliis ſparſis octofariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, floribus ſparſis. *Sp.* 1565. *n.* 9. *Ingr.* 166. *Friſ.* 434. *Selago.*

Selago vulgaris abietis rubræ facie. *Dill. muſc.* 435. *t.* 56. *f.* 1.

Muſcus erectus ramoſus ſaturate viridis. *Bauh. pin.* 360.

Digitized by Google

Oed. dan. t. 104.
In Friesland *op verſcheide plaatſen in de* Wouden *op Hei-velden.*

alpinum. 861. LYCOPODIUM foliis quadifariam imbricatis acutis, caulibus, erectis bifidis, ſpicis ſeſſilibus teretibus. *Sp.* 1567. *n.* 15. *Gelr.* 655.
Lycopodium ſabinæ facie. *Dill. muſc. t.* 58. *f.* 2. (*non ſynonyma.*)
Muscus clavatus, foliis cupreſſi. *Raj. hiſt.* 121.
Oed. dan. t. 79.
Hexen-krans. Zutphanienſibus.
Op Kappenbulte *tuſſchen* Zelhem *en* Halm *in 't Graafſchap* Zutphen, *en op de Heide te* Deelen *en omtrent* Lovenich *op de* Veluwe.

SPHAGNUM.

paluſtre. 862. SPHAGNUM ramis deflexis. *Sp.* 1569. *n.* 1. *Gelr.* 577. *Friſ.* 435.
Sphagnum paluſtre molle deflexum, ſquamis cymbiformibus. *Dill. muſc.* 240. *t.* 32. *f.* 1.
Muscus vulgatiſſimus. *Baub. pin.* 360. *Comm. boll.* 76.
Oed. dan. t. 474.
β. Sphagnum paluſtre molle deflexum, ſquamis capillaccis. *Dill. muſc.* 243. *t.* 32. *f.* 2.
Op vochtige Hei-gronden in Water-kuilen buiten Harderwyk, Utrecht, Zwol, *in de* Wouden *in* Friesland, *en elders.*
Muscus terreſtris & hortenſis. I. B. *quem* COMMELINUS *huc refert, eſt* Hypnum ſericeum.

PHASCUM.

acaulon. 863. PHASCUM acaule, antheria ſeſſili, foliis ovatis acutis. *Sp.* 1570. *n.* 1. *Friſ.* 436.
Phaſcum acaulon bulbiforme minus. *Dill. muſc.* 251. *t.* 32. *f.* 12.
Muscus trichodes acaulos minor latifolius. *Vaill. par.* 128. *t.* 27. *f.* 2.
Oed. dan. t. 249. *f.* 3.
Aan de Graften om 't Huis Staverden *op de* Veluwe; *op de* Bergummer-Heide, *en aan de kanten*

ten van vochtige gruppels by Hitzum *en* Schalſum *in* Friesland.

FONTINALIS.

864. FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. *Sp.* 1571. *n.* 1. *Friſ.* 437. *antipyretica.*
Fontinalis triangularis major complicata, e foliorum alis capſulifera. *Dill. muſc.* 254. *t.* 33. *f.* 1.
Muscus aquaticus, folio expanſo. *Baub. prodr.* 152. *n.* 14.
In donkere Boſſchen, en in Slooten en natte Gruppels onder de Boomen, op veele plaatſen in de Wouden *in* Friesland.

865. FONTINALIS foliis imbricatis ſubulato-lanceolatis, antheris lateralibus. *Sp.* 1571. *n.* 3. *Friſ.* 438. *ſquamoſa.*
Fontinalis ſquamoſa tenuis ſericea atro-virens. *Dill. muſc.* 259. *t.* 33. *f.* 3.
Fontinalis minor lucens. *Baub. biſt.* 3. *p.* 778.
Te Franeker *gevonden in een* Regenbak.

866. FONTINALIS foliis lineari-ſetaceis. *Linn. ſuec.* 2. 962. *Friſ.* 439. *capillacea.*
Fontinalis capillacea, calycibus ſtili inſtar cuſpidatis. *Dill. muſc.* 260. *t.* 23. *f.* 5.
In natte laagtens tuſſchen Franeker *en* Harlingen *op verſcheide plaatſen.*

POLYTRICHUM.

867. POLYTRICHUM caule ſimplici, anthera parallelopipeda. *Sp.* 1573. *n.* 1. *Gelr.* 570. *Friſ.* 440. *commune.*
Mas & Femina.
α. Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccæ foliis ſerratis. *Dill. muſc.* 420. *t.* 54. *f.* 1.
Polytrichum aureum majus. *Baub. pin.* 356.
Adiantum aureum. *Tabern. ic.* 797.
Geel of goud Vrouwen-Hayr, Gulden-Hayr, Gulde Wederdood. Belg.
β. Polytrichum quadrangulare, juniperi foliis brevioribus & rigidioribus. *Dill. muſc.* 424. *t.* 54. *f.* 2.

Po-

Polytrichum aureum medium. *Baub. pin.* 356. *Camm. boll.* 91.

Muſcus coronatus humilis rigidior, capitulis longis acutis ſeſſilibus erectis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 8. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 31.

Muſcus coronatus medius, pileolo villoſo tenuiore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 6. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 30.

Muſcus coronatus humilis tenuifolius, pileolo minore acutiore ruberrimo. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 33.

Muſcus capillaris, floribus in apice coccineis expanſis. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 35. *Buxb. cent.* 1. *p.* 41. *t.* 62. *f.* 2.

γ. Polytrichum quadrangulare minus, juniperi foliis piloſis. *Dill. muſc.* 426. *t.* 54. *f.* 3.

Overvloedig op vochtige Hey-gronden en Moſchachtige plaatſen.

Pharm. ADIANTHI AUREI *herb.*

Diverſitas ſexus, ætatis & ſoli fecit, ut una hæc eademque ſpecies pro tot diverſis Muſcis habita fuerit.

M N I U M.

androgynum. 868. MNIUM caule ramoſo, androgynum. *Sp.* 1574. *n.* 4.

Mnium peranguſtis & brevibus foliis. *Dill. muſc.* 230. *t.* 31. *f.* 1.

Muſcus coronatus humilis minimus, foliolis, pediculis & capitulis minimis erectis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 631. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 20.

Oed. dan. t. 299.

In de Duinen en in den Hout te Haarlem. (MEERBURGH.)

hygrometricum. 869. MNIUM acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona. *Sp.* 1574. *n.* 5. *Friſ.* 441.

Bryum bulbiferum aureum, calyptra quadrangulari, capſulis pyriformibus nutantibus. *Dill. muſc.* 407. *t.* 52. *f.* 75.

Muſcus coronatus minor, foliolis latiuſculis ad caulem convolutis, capitulis cernuis & obtuſis aureis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 631. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 17. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 37.

Mus-

Digitized by Google

Muscus aureus capillaris minor. *Herm. lugdb.* 432. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 41.
Polytrichum aureum minus. *Baub. pin.* 357. *Comm. holl.* 91.
Op oude vochtige muuren en ſteenachtige dorre plaatſen onder 't geboomte; ook in de Duinen by 's Hage *omtrent* Backershagen.

870. MNIUM caule dichotomo: axillis pedunculiferis, anthera erecta, foliis carinatis. *Sp.* 1575. *n.* 6. *purpureum.*
Bryum tenue ſtellatum, ſetis purpureis. *Dill. muſc.* 386. *t.* 49. *f.* 51.
Muscus trichodes parvus, foliis muſci vulgaris, capitulis longis acutis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 17. *t.* 6. *f.* 4. 16.
Aan oude paalen en boomen by 't Huis Endelgeer. (MEERBURGH.)

871. MNIUM antheris erectis, opereulis filiformibus longitudine antherarum. *Sp.* 1575. *n.* 7. *ſetaceum.*
Bryum ſtellare nitidum pallidum, capſulis tenuiſſimis. *Dill. muſc.* 381. *t.* 48. *f.* 44.
Op de Hooybergen en eenige Wilge - boomen by Noordwyk. (MEERBURGH.)

872. MNIUM antheris pendulis, pedunculo curvato, ſurculo ſimplici, foliolis margine ſcabris. *Sp.* 1576. *n.* 10. *Friſ.* 443. *hornum.*
Bryum ſtellare hornum ſylvarum, capſulis magnis nutantibus. *Dill. muſc.* 402. *t.* 51. *f.* 71.
β. Muscus polytrichodes humilior, foliis brevioribus raris, pallide viridantibus & vix pellucidis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 3. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 16.
In 't Haagſche *en andere Boſſchen op de wortels der Eiken.*

873. MNIUM antheris pendulis, foliis ovatis ſetiferis carinatis, pedunculis longiſſimis. *Syſt. edit.* 13. *p.* 796. *n.* 19. *capillare.*
Bryum *capillare. Sp.* 1586. *n.* 30. *fl. belg.* 861.
Bryum foliis latiuſculis congeſtis, capſulis longis nutantibus. *Dill. muſc.* 398. *t.* 59. *f.* 67.
Polytrichum aure um minimum, capitulo oblon-

go,

Digitized by Google

go, ſubflavi coloris. *Comm. holl.* 91.

Muscus aureus capillaris minimus, capitulo longo ſubflavo. *Herm. lugdb.* 432. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 38.

Op zandige gronden by Harderwyk, Haarlem, *en elders.*

crudum. 874. MNIUM antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis. *Sp.* 1576. *n.* 11. *Friſ.* 443.

Bryum pendulum hornum molle, foliis & lanceolatis & gramineis. *Dill. muſc.* 401. *t.* 51. *f.* 70.

Veel in de Boſſchen en aan kanten van gruppels; te Leiden *op de Stads-muuren.*

ſerpyllifolium. 875. MNIUM pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *Sp.* 1577. *n.* 14. *Friſ.* 444.

punctatum. α. Mnium pedunculis aggregatis, foliis obovatis intergerrimis obtuſis punctatis.

Bryum pendulum, ſerpilli folio rotundiore pellucido, capſulis ovatis. *Dill. muſc.* 416. *t.* 53. *f.* 81.

Muscus polytrichoides paluſtris, major ſerpilli latioris folio pellucido. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 627. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 39. 40.

cuſpidatum β. Mnium pedunculis aggregatis, foliis alternis acutis ſerratis.

Bryum pendulum, foliis variis pellucidis, capſulis ovatis. *Dill. muſc.* 413. *t.* 53. *f.* 79.

Muscus paluſtris, foliis ſubrotundis. *Vaill. par.* *t.* 26. *f.* 18.

proliferum. γ. Mnium pedunculis aggregatis, foliis roſaceo-congeſtis lanceolatis acutis. *Gelr.* 646.

Bryum ſtellare roſeum majus, capſulis ovatis pendulis. *Dill. muſc.* 411. *t.* 52. *f.* 77.

Muscus ſtellaris roſeus. *Bauh. pin.* 361. *prodr.* 151.

undulatum. δ. Mnium pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis.

Bryum dendroides polycephalon, phyllitidis folio undulato pellucido, capſulis ovatis pendulis. *Dill. muſc.* 410. *t.* 52. *f.* 76.

Muscus ad polytrichodem accedens ramoſus, foliis longis lucidis & veluti criſpis. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 1. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 14.

Mus-

Muſcus terreſtris ramoſus, foliolis latioribus & longioribus criſpis, capitulis cylindricis nutantibus, major & minor. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 36.

α. *Te* Catwyk *aan 't eind van 't* Malle-gat *tuſſchen het gras.* β. *Aldaar, en veel in 't* Haagſe-Boſch. γ. *Te* Heemſe *in* Overysſel. δ. *Omtrent* Hitzum, *en op verſcheide plaatſen in de* Wouden *in* Friesland.

876. MNIUM foliis diſtichis bifidis. *Sp.* 1579. *n.* 17. *fiſſum.*
Mnium trichomanis facie, foliolis bifidis. *Dill. muſc.* 237. *t.* 31. *f.* 6.
Jungermaunia terreſtris repens, foliolis ex rotunditate acuminatis bifidis, apertura pene viſibili. *Mich. gen.* 8. *t.* 5. *f.* 14.
In den Haarlemmer-hout *en 't* Haagſche-Boſch. (MEERBURGH.)

877. MNIUM foliis diſtichis, pinnis ſubtus auriculatis. *Sp.* 1579. *n.* 18. *Jungermannia.*
Lichenaſtrum alpinum purpureum, foliis auritis & cochleariformibus. *Dill. muſc.* 479. *t.* 69. *f.* 1.
Jungermaunia alpina paluſtris purpurea cambrica, foliis rotundioribus auritis tenuiſſime denticulatis. *Mich. gen.* 6. *t.* 5. *f.* 16.
Te Leiden *op de Stads-muuren.* (MEERBURGH.)

BRYUM.

878. BRYUM antheris ſeſſilibus terminalibus, calyptra minima. *Sp.* 1579. *n.* 1. *Friſ.* 445. *apocarpum.*
Sphagnum ſubhirſutum obſcure virens, capſulis rubellis. *Dill. muſc.* 245. *t.* 32. *f.* 4.
Muſcus apocarpos hirſutus ſaxis adnaſcens, capſulis obſcure rubris. *Vaill. par.* 139. *t.* 21. *f.* 15.
Oed. dan. t. 480.
Op Muuren en oude Boomen.

879. BRYUM antheris ſeſſilibus ſparſis, calyptris ſtriatis ſurſumve piloſis. *Sp.* 1579. *n.* 2. *Friſ.* 446. *ſtriatum.*
Polytrichum bryi ruralis facie, capſulis ſeſſilibus, majus. *Dill. muſc.* 430. *t.* 55. *f.* 2.

Mus-

Muſcus apocarpos arboreus ramoſus. *Vaill. par.* 129. *t.* 25. *f.* 5. 6.
Op veele plaatſen aan de Boomen.

pomiforme. 880. BRYUM antheris erectis ſphæricis. *Sp.* 1580. *n.* 3.
Bryum capillaceum, capſulis ſphæricis. *Dill. muſc.* 339. *t.* 44. *f.* 6.
Muſcus trichodes minimus ſericeus capillaceus, capitulis ſphæricis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 6. *Vaill. par.* 129. *t.* 24. *f.* 9. 12.
In 't Haagſche-Boſch *in eenige groepen.* (MEERBURGH.)

pyriforme. 881 BRYUM antheris erectis obovatis, calyptra ſubulata, ſurculis acaulibus, foliis ovatis muticis. *Sp.* 1580. *n.* 4. *Friſ.* 447.
Bryum ſerpillifolium pellucidum, capſulis pyriformibus. *Dill. muſc.* 345. *t.* 44. *f.* 6.
Muſcus capillaceus minimus capitulis pyriformibus turgidis. *Vaill. par.* 129. *t.* 29. *f.* 3.
Aan ſchaduwachtige wallen, in ſchraale Weiden, en in de Duinen by 's Gravenhage.

extinctorium. 882. BRYUM anthera erecta oblonga minori, calyptris laxis æqualibus. *Sp.* 1581. *n.* 5.
Bryum calyptra extinctorii forma minus. *Dill. muſc.* 349. *t.* 45. *f.* 8.
Muſcus coronatus humilis tenuifolius, pileolo magno acuto infra aperto extinctorium referente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 12. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 32.
In den Enck by Harderwyk.

ſubulatum. 883. BRYUM antheris erectis ſubulatis; ſurculis acaulibus. *Sp.* 1581. *n.* 6. *Gelr.* 647. *Friſ.* 448.
Bryum capſulis longis ſubulatis. *Dill. muſc.* 350. *t.* 45. *f.* 10.
Muſcus terreſtris capillaris, capſula longa. *Comm. holl.* 77.
Muſcus ſubtiliſſimus omnium, ramoſus terreſtris, capitulis falcatis, minimus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 42.
Op vochtige Zand-gronden, en onder aan ſommige ſtammen van Boomen.
Dillenius muſc. 308. *Muſcum Boerhaavii refert ad ſuum*

ſuum Hypnum ſericeum ramoſius & tenuius, capſulis acuminatis.

884. **Bryum** antheris erectiuſculis, foliis piliferis recurvis. *Sp.* 1581. *n* 7. *Gelr.* 571. *Friſ.* 449. *rurale.*
Bryum rurale unguiculatum hirſutum elatius & ramoſius. *Dill muſc.* 352. *t.* 45 *f.* 12.
Muscus erectus hirſutus, capitulis oblongis acutis, unguiculis avicularum ſimilibus, vulgatiſſimus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 1.
Polytrichon apuleji minus quorundam. *baub. hiſt.* 3. *p.* 760. (*quo ad deſcriptionem.*)
Op de daken van Boere-woningen en oude Muuren, en tuſſchen de ſteenen der Straaten; ook in de Duinen by Haarlem.

885. **Bryum** antheris erectis, foliis piliferis rectiuſculis, ſurculis ſimplicibus cæſpitoſis. *Sp.* 1581. *n.* 8. *Friſ.* 450. *murale.*
Bryum tegulare humile piloſum & incanum. *Dill. muſc.* 355. *t.* 45. *f.* 14.
By de voorgaande.

886. **Bryum** antheris erectiuſculis, pedunculis aggregatis, foliis ſecundis recurvatis, caule declinato. *Sp* 1582. *n.* 9. *Friſ.* 451. *ſcoparium.*
Bryum reclinatum, foliis falcatis, ſcoparum effigie. *Dill. muſc.* 357. *t.* 46. *f.* 16.
Muscus coronatus medius, foliis tenuiſſimis pallidis longioribus, capitulis erectis acutis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 11. *boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 34.
In de Boſſchen op de wortels van verrotte Boomen, en op Hei-velden.

887. **Bryum** antheris erectiuſculis, pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ſerratis. *Sp.* 1582. *n.* 10. *undulatum*
Bryum phyllitidis folio rugoſo acuto, capſulis incurvis. *Dill. muſc.* 360. *t.* 46. *f.* 18.
Muscus ſaxatilis viridiſſimus, foliolis longioribus criſpis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 47.
Oed. dan. t. 477.
In 't Haagſche-Boſch *op vochtige plaatſen, en op wortels van Boomen.*

T 888. Bry-

glaucum. 888. Bryum antheris erectiuſculis: operculo arcuato, foliis erectis imbricatis, ſurculis ramoſis. *Sp.* 1582. *n.* 11.
Bryum albidum & glaucum fragile majus, foliis erectis, ſetis brevibus. *Dill. muſc.* 362. *t.* 46. *f.* 20.
Muscus capillaceus albus montanus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 28.
Muscus trichoides montanus albidus fragilis. *Moriſ. hiſt.* 3 *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 22. *Boerh. lugdb.* 1. *p* 20. *n* 8.
Op de Heide by Harderwyk *en elders.*

pellucidum. 889. Bryum antheris erectiuſculis, foliis recurvis acutis, caule hirſuto. *Sp.* 1583. *n.* 13.
Bryum paluſtre pellucidum, capſulis & foliis brevibus recurvis. *Dill muſc.* 364. *t.* 46. *f.* 23.
Muscus polytrichodes elatior, foliis anguſtis pellucidis & fere membranaceis. *Pluk. phyt. t.* 44. *f.* 7. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 15.
In de Moeraſſen.

flexuoſum. 890. Bryum antheris erectis, foliis ſetaceis, pedunculis flexuoſis. *Sp.* 1583. *n* 15 *Friſ.* 442.
Bryum piloſum molle, ſetis intortis. *Dill. muſc.* 373. *t.* 47. *f.* 33.
Omtrent het Heerenveen, *en elders in de* Wouden, *op Hei-velden aan Dykjes en Wegen.*

heteromallum. 891. Bryum antheris erectis, foliis ſetaceis ſecundis. *Sp.* 1583. *n* 16. *Gelr.* 648. *Friſ.* 453.
Bryum heteromallum. *Dill. muſc.* 375. *t.* 47. *f.* 37.
Muscus capillaceus, foliis unam partem ſpectantibus. *Vaill. par.* 132. *t* 27. *f.* 7.
Muscus terreſtris non ramoſus, fili araneæ tenuitate, capitulis falcatis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n* 43.
Oed. dan. t. 479.
Veel op de Heide, ook onder de Heggen, en ook wel op de ſtammen en takken van Boomen.

runcatulum. 892. Bryum antheris erectis ſubrotundis: operculo mucronato. *Sp.* 1584. *n.* 18. *Friſ.* 454.
Bryum exiguum, creberrimis capſulis rufis. *Dill. muſc.* 347. *t.* 45. *f.* 7.

Mus-

Muſcus coronatus minimus, foliolis & capitulis oblongis in pediculis breviſſimis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 631. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 18. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 52. *n.* 44.

In ſchraale Landen en aan kanten van Gruppels &c. op veele plaatſen.

893. BRYUM antheris erectis ovatis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis. *Sp.* 1584. *n.* 19. *Gelr.* 649. *viridulum*

Bryum capillaceum breve, pallide & læte virens, capſulis ovatis *Dill. muſc.* 380. *t.* 48. *f.* 43.

Muſcus capillaceus omnium minimus, foliolis longioribus & anguſtioribus. *Vaill. par.* 130. *t.* 29. *f.* 5.

In de Koorn-landen in Hierden *buiten* Harderwyk.

894 BRYUM antheris erectis, ſurculo rectiuſculo, ramis lateralibus brevibus fertilibus. *Sp.* 1584. *n.* 21. *Friſ.* 455. *hypnoides.*

Bryum hypnoides polycephalon lanuginoſum montanum. *Dill. muſc.* 372. *t.* 47. *f.* 32.

Muſcus terreſtri vulgari ſimilis lanuginoſus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625. *ſ.* 15 *t.* 5. *f.* 7. *Raj. ſyn.* 37. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 17.

Oed. dan. t. 476.

β. Bryum hypnoides, hirſutie caneſcens, vulgare. *Dill. muſc.* 368. *t* 47. *f.* 27.

Muſcus terreſtris tenuioribus foliis, ceſpitoſus, varius. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 18.

Op donkere vochtige ſchaduwachtige plaatſen op de grond, ſteenen, onder aan de ſtammen der Boomen, ook op de Hei-velden, en aan Dykjes.

895. BRYUM antheris pendulis, ſurculis cylindricis imbricatis lævibus. *Sp.* 1586. *n.* 27. *Gelr.* 650. *argenteum.*

Bryum pendulum julaceum argenteum & ſericeum. *Dill. muſc* 392. *t.* 50. *f.* 62.

Muſcus minimus e viridi argenteus, capitulis oblongis cernuis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 627. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 17. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 49.

Muſcus ſaxatilis ſericoides. *Comm. holl.* 77.

β. Bryum pendulum, ſurculis teretibus viridibus. *Dill. muſc.* 394. *t* 50. *f.* 63.

Zy-achtig Steen-Moſch. Belg.

Op vochtige ſteenen en daken der huizen. β. *in eenige boven op de ſteenen.*

pulvinatum 896. Bryum antheris ſubrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. *Sp.* 1586. *n.* 28 *Gelr.* 573.
Bryum orbiculare pulvinatum hirſutie caneſcens, capſulis immerſis. *Dill. muſc.* 359. *t.* 50. *f.* 65.
Muscus capillaceus lanuginoſus minimus. *Vaill. par.* 133 *t.* 29. *f.* 2. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 48.
Muscus aureus capillaris minimus, capitulo oblongo-rotundo ſubviridi *Herm. lugdb.* 432. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 39.
Polytrichum aureum minimum capitulatum, oblongo-rotundum, colore ſubviridi. *Comm. holl.* 91.
Op vochtige zand-gronden en oude muuren, en op allerhande oude daken aan de Noordzyde.

cæſpiticium. 897. Bryum antheris pendulis, foliis lanceolatis acuminato-ſetaceis, pedunculis longiſſimis. *Sp.* 1586. *n.* 29. *Gelr.* 572. *Friſ.* 456.
Bryum pendulum ovatum cæſpiticium & piloſum, ſeta bicolori. *Dill. muſc.* 396. *t.* 50. *f.* 66.
Muscus capillaceus minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo. *Vaill. par.* 134. *t.* 29. *f.* 7.
Op oude Muuren en allerhande Daken, en vochtige Hei-gronden.

898. Bryum parvum ſurculis & ſetis geminatis. *Dill. muſc.* 385. *t.* 49. *f* 50.
Op ſommige Muuren te Voorſchooten. (Meerburgh.)

HYPNUM.

taxifolium. 899. Hypnum fronde ſimpliciſſima pinnata lanceolata baſi pedunculifera. *Sp.* 1587. *n.* 2. *Friſ.* 457.
Hypnum taxiforme minus: baſi capſulifera. *Dill. muſc.* 263. *t.* 34. *f.* 2.
Muscus pennatus, capitulis adianti. *Vaill. par.* 136. *t.* 24. *f.* 11.
Oed. dan. t. 473. *f.* 2.
Op veele plaatſen tuſſchen het Gras, en op andere vochtige plaatſen.

900. HYPNUM fronde pinnata ſimplici: pinnis duplicatis baſi pedunculifera. *Sp.* 1588. *n.* 3. *Friſ.* 258. *denticulatum.*
Hypnum denticulatum pennatum, pinnulis duplicato-recurvis. *Dill. muſc.* 266. *t.* 34. *f.* 5.
Muſcus filicinus minor, capitulis longis gracilibus acutis. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 20. *n.* 21.
By de voorgaande.

901. HYPNUM fronde ſimpliciſſima pinnata lanceolata apice pedunculifera. *Sp.* 1588. *n.* 4. *bryoides.*
Hypnum taxiforme exiguum verſus ſummitatem capſuliferum. *Dill. muſc.* 262. *t.* 34. *f.* 1.
Muſcus polytrichoides exiguis capitulis in ſummis ſurculis ſ. foliis ſubrotundis erectis. *Vaill. par.* 163. *t.* 24. *f.* 13. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 629. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 11.
Oed. dan. t. 473. *f.* 1.
In het Haagſche-Boſch *in vochtige groepen.* (MEERBURGH.)

902. HYPNUM fronde pinnata ramoſa erecta medio pedunculifera *Sp.* 1588. *n.* 6. *adiantoides.*
Hypnum taxiforme paluſtre ramoſum majus et erectum. *Dill. muſc.* 264. *t.* 34. *f.* 3.
Muſcus taxiformis ramoſus. *Vaill. par.* 136. *t.* 28. *f.* 5.
In het Haagſche-Boſch *op de wortels der Boomen.* (MEERBURGH.)

903. HYPNUM fronde pinnata ramoſa: foliolis imbricatis acutis complicatis compreſſis. *Sp.* 1588. *n.* 7. *complanatum.*
Hypnum pennatum compreſſum & ſplendens, capſulis ovatis. *Dill. muſc.* 268. *t.* 34. *f.* 7.
Muſcus trichomanoides filicifolius ſplendens. *Vaill par.* 139. *t.* 23. *f.* 4.
In de Duinen by Hillegom *en* Noordwyk. (MEERBURGH.)

904. HYPNUM ſurculis ramoſis, frondibus ſubpinnatis: foliolis undulatis planis. *Sp.* 1589. *n.* 11. *criſpum.*
Hypnum pennatum undulatum criſpum, ſetis & capſulis brevibus. *Dill. muſc.* 273. *t.* 36. *f.* 12. B.

Muscus ſquamoſus linariæ folio minor, criſpus, capitulis recurvis. *Tourn. inſt.* 554. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 13.
† *Volgens* BOERHAAVE.

triquetrum 905. HYPNUM ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Sp.* 1589. *n.* 12. *Friſ.* 459.
Hypnum vulgare triangulum maximum & pallidum. *Dill. muſc.* 293. *t.* 38 *f.* 28.
Muscus ramoſus major ſpermatophorus. *Vaill. par.* 137 *t.* 29. *f.* 9.
Op veele plaatſen in de Wei-landen en ruige Hoven tusſchen het Gras.

rutabulum. 906. HYPNUM ramis vagis ſubrepentibus, foliolis mucronatis imbricatis. *Sp.* 1590. *n.* 13. *Friſ.* 460.
Hypnum dentatum vulgatiſſimum, operculis obtuſis. *Dill. muſc.* 295. *t.* 38. *f.* 29.
Muscus ſquamoſus ramoſus craſſior, capitulis incurvis. *Tourn. inſt.* 553. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 5.
Muscus denticulatus minor ſericeus noſtras, capitulis adianthi. *Moriſ. hiſt.* 3. *p* 626. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 35. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 44.
By de voorige.

filicinum. 907 HYPNUM ſurculis pennatis: ramulis diſtantibus, foliolis imbricatis incurvis ſecundis. *Sp.* 1590. *n* 14.
Hypnum repens filicinum criſpum. *Dill. muſc.* 282. *t.* 26. *f.* 19.
Muscus repens ramoſus pennatus, ſubtiliſſime diviſus, foliolis criſpis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 25.
In vochtige Wei-landen, op veele plaatſen.

proliferum. 908. HYPNUM ſurculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Sp.* 1590. *n.* 15. *Gelr.* 575.
Hypnum filicinum, tamariſci foliis minoribus non ſplendentibus. *Dill. muſc.* 276. *t.* 35. *f.* 14.
Muscus filicinus major. *Bauh. pin.* 360. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 20. *Tourn. inſt.*

556.

556. *t.* 326. *f.* C. *Vaill. par.* 140. *t.* 25. *f.* 1. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 22.
Veel in de Boſſchen, en in de Salker-waart.
Muscus filicinus minor. *Baub. prodr.* 151. *Boerh.* 151. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 23. *quijnam ſit, dubia res eſt.*

909. HYPNUM ſurculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. *Sp.* 1590. *n.* 17. *Gelr.* 576. *parietinum.*
Hypnum filicinum, tamariſci foliis majoribus ſplendentibus. *Dill. muſc.* 274 *t.* 35. *f.* 13.
Muscus vulgaris pennatus major. *Baub. pin.* 360. *Vaill. par. t.* 28. *f.* 1.
In de Boſſchadie van 't Huis Staverden *op de* Veluwe.

910. HYPNUM ſurculis ſubbipinnatis decumbentibus: ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cernuis. *Sp.* 1591. *n.* 18. *Friſ.* 461. *Jngr.* 171. *prælongum*
Hypnum repens filicinum, triangularibus parvis foliis, prælongum. *Dill. muſc* 278. *t.* 35. *f.* 15.
Muscus repens ramoſus pennatus, ſubtiliſſimâ diviſurâ. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 26.
In veele Boſſchen, onder oude Heggen, en op oud hout.

911. HYPNUM ſurculis pinnatis: ramulis approximatis: apicibus recurvis. *Sp.* 1591. *n.* 19. *Criſta caſtrenſis.*
Hypnum filicinum, criſtam caſtrenſem repræſentans. *Dill. muſc.* 284. *t.* 36. *f.* 20.
Muscus repens ramoſus pennatus, ſubtiliſſime diviſus, foliolis criſpis reflexis. *Boerh. lugdb.* 1. *p* 21. *n.* 27.
† *Volgens* BOERHAAVE.

912. HYPNUM ſurculis pinnatis teretiuſculis remotis inæqualibus. *Sp.* 1591. *n.* 20. *abietinum.*
Hypnum luteſcens, alis ſubulatis tenacibus. *Dill. muſc.* 280. *t.* 35. *f.* 17.
Muscus ſquamoſus ericæ folio ramoſiſſimus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 11.
Muscus abietis facie. *Baub. pin.* 360. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 765. *Comm. holl.* 77. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 52.

Moſch met de gedaante van den Dennen-boom. Belg.
Op 't Hooge veld by de Haarlemmer-hout.
Conjunxi hic duos muſcos, quos Boerhaavius ſeparavit, quum Muſcum abietis facie C. B. ad aliam ſpeciem referre neſciam, atque ea, quæ in loco a Commelino adſignato creſcit, hæc certe planta eſt.

cupreſſiforme. 913. HYPNUM ſurculis ſubbipinnatis, foliis ſecundis recurvis apice ſubulatis. *Sp.* 1592. *n.* 22.
Hypnum criſpum cupreſſiforme, foliis aduncis. *Dill. muſc.* 287. *t.* 37. *f.* 23.
β. Muſcus ſquamoſus ramoſus viridiſſimus. *Boerh. lugdb* 1. *p.* 20. *n.* 7.
γ. Muſcus capillaris humilis, confertiſſime naſcens, capitulo cylindrico, operculo roſtrato. *Boerh. lugdb* 1. *p.* 22. *n.* 45.
In de Boſſchen op de wortels der Boomen, en in de Duinen onder de Hippophae Rhamnoides, *omtrent de plaats* Backershagen.
Varietates β. *&* γ. *Dillenius teſtatur ſeſe ab ipſo Boerhaavio habuiſſe.*

aduncum. 914. HYPNUM ſurculis erectiuſculo-ſubramoſis, foliis ſecundis recurvis ſubulatis, ramis recurvatis. *Sp.* 1592 *n.* 23.
Hypnum paluſtre erectum ſummitatibus aduncis. *Dill. muſc.* 292. *t.* 37. *f.* 26.
In de Duinen by Noordwyk *in eenige Boſchjes.* (MEERBURGH.)

viticuloſum 915. HYPNUM ſurculis repentibus, ramis vagis teretibus, foliis patulis acuminatis. *Sp.* 1592. *n.* 25.
Hypnum ſubhirſutum, viticulis gracilibus erectis, capſulis teretibus. *Dill. muſc.* 307. *t.* 39. *f.* 43.
Muſcus montanus, flagellis longis tenuibus cupreſſinis, utplurimum indiviſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 624. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 7. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 20.
Muſcus denſis foliolis juniperinis in ceſpitem aggeſtis. *Bauh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 9.
In de Duinen by Haarlem.

ſarroſum 916. HYPNUM ramis vagis, foliis lanceolatis complicato-carinatis quinquefariam recurvatis. *Sp.* 1593. *n.* 26.

Hyp-

Digitized by Google

Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, majus. *Dill. muſc.* 303. *t.* 39. *f.* 38.
Muscus terreſtris erectior, foliis reflexis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 624. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 2. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 12.

β. Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, minus. *Dill. muſc.* 304. *t.* 39. *f.* 39.
Muscus erectus, foliis reflexis. *Vaill. par.* 139. *t* 27. *f.* 5.
Veel op vochtige gronden, en in de Duinen by 's Hage.

917. HYPNUM ſurculis repentibus, ramis confertis erectis, foliolis ovatis ſecundis, antheris erectiuſculis *Sp.* 1593. *n.* 27. *paluſtre.*
Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalum repens. *Dill. muſc.* 293. *t.* 37. *f.* 27.
In eenige Hoven op de Steenen. (MEERBURGH.)

918. HYPNUM ſurculis reptantibus, ramis vagis erectis, foliis ſecundis, antheris ſubrotundis. *Sp.* 1593. *n.* 28. *Gelr.* 574. *app. p* 254. *loreum.*
Hypnum loreum montanum, capſulis ſubrotundis. *Dill. muſc.* 305. *t.* 39. *f.* 40.
Muſco denticulato ſimilis. *Baub. pin.* 360.
In de Salker-waart.

919. HYPNUM ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſimpliciuſculis, antheris erectis. *Sp.* 1593. *n.* 29. *Gelr.* 651. *dendroides.*
Hypnum dendroides ſericeum, ſetis & capſulis longioribus erectis. *Dill. muſc.* 313. *t.* 40. *f.* 48.
Muscus terreſtris repens, veluti ſpicatus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 21. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 24.
In 't Boſch van Uilenpas.

920. HYPNUM ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſubdiviſis, antheris ſubnutantibus. *Sp.* 1594. *n.* 30. *alopecurum*
Hypnum dendroides obſcurius, ſetis & capſulis brevioribus ſubnutantibus. *Dill. muſc.* 315. *t.* 41. *f.* 49.
Muscus ſquamoſus alopecuroides, flagellis recurvis. *Vaill. par.* 137. *t.* 23. *f.* 5.

In 't Haagſche Boſch, *en te* Catwyk *in de Duinen.* (MEERBURGH.)

purum. 921. HYPNUM ſurculis pinnato-ſparſis ſubulatis, foliis ovatis obtuſis conniventibus. *Sp.* 1594. *n.* 32. *Gelr.* 652. *Friſ.* 463.
Hypnum cupreſſiforme vulgare, foliis obtuſis. *Dill. muſc.* 309. *t.* 40. *f.* 45.
Muſcus ſquamoſis cupreſſiformis. *Tourn. inſt.* 554. *Vaill. par.* 138. *t.* 28. *f.* 3. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 2.
Veel in natte en ruige Wei-landen en Hoven.

fluitans. 922. HYPNUM foliis lanceolatis alternis remoſis. *Linn. ſuec.* 1034.
Hypnum erectum aut fluitans, foliis oblongis peranguſtis acutis. *Dill. muſc.* 299. *t.* 38. *f.* 33.
Aan verſcheide Beekjes te Waſſenaar. (MEERBURGH.)

cuſpidatum 923. HYPNUM ſurculis vagis: apice foliis convolutis acuminato. *Sp.* 1595. *n.* 35.
Hypnum paluſtre extremitatibus cuſpidatis & pungentibus. *Dill. muſc.* 300. *t.* 39. *f.* 34.
In de Duinen by 's Hage *tuſſchen het lange gras.* (MEERBURGH.)

ſericeum. 924. HYPNUM ſurculo repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, antheris erectis. *Sp.* 1595. *n.* 36. *Gelr.* 653. *Friſ.* 464.
Hypnum vulgare ſericeum recurvum, capſulis erectis cuſpidatis. *Dill. muſc.* 323. *t.* 42. *f.* 59.
Muscus terreſtris & hortenſis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 764.
Muſcus arboreus ſplendens ſericeus. *Vaill. par.* 132. *t.* 27. *f.* 3.
Op veele plaatſen onder aan de ſtammen der Boomen, op Steenen, in vochtige Wei-landen en Hoven.

velutinum. 925. HYPNUM ſurculo repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, antheris ſubnutantibus. *Sp.* 1595. *n.* 37. *Friſ.* 465.
Hypnum velutinum, capſulis ovatis cernuis. *Dill. muſc.* 326. *t.* 42. *f.* 61.

Mus-

Muscus terreſtris vulgaris minor, adianthi aurei capitulis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 3.
Oed. dan. t. 475.
β. Muscus terreſtris vulgaris, præcedenti minor, adianthi aurei capitulis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 4.
Aan de wortels der Boomen op ſchaduwachtige plaatſen.

926. HYPNUM ſurculis repentibus, ramis filiformibus, foliis obliteratis. *Sp.* 1596. *n.* 38. *Friſ.* 466. *ſerpens.*
Hypnum trichodes ſerpens, ſetis & capſulis longis erectis. *Dill. muſc.* 329. *t.* 42. *f.* 64.
Muscus terreſtris omnium minimus, capitulis majuſculis oblongis erectis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 14. 21. *Vaill. par.* 138. *t.* 28. *f.* 2. 6. 7. 8.
Muscus ſquamoſus ramoſus tenuior, capitulis erectis. *Tourn. inſt.* 552. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 6.
In verſcheide Hoven op de Steenen.

927. HYPNUM ſurculis ramoſiſſimis: ramis ſubulatis utrinque attenuatis teretibus. *Sp.* 1596. *n.* 40. *Friſ.* 467. *myoſyroides*
Hypnum myoſyroides tenuius, capſulis nutantibus. *Dill. muſc.* 317. *t.* 41. *f.* 51.
Muscus trichodes humilis ramoſus, capitulis oblongis tumidiuſculis donatum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 3.
Onder aan de ſtammen der Boomen, ook op en tusſchen de Steenen.

ALGÆ.

JUNGERMANNIA.

928. JUNGERMANNIA frondibus ſimpliciter pinnatis: foliolis pinnatis ovatis ſubciliatis. *Sp.* 1597. *n.* 1. *Gelr.* 655. *aſplenioides.*

Li-

Digitized by Google

Lichenaſtrum aſplenii facie, pinnis laxioribus. *Dill. muſc.* 482. *t.* 69. *f.* 5.
Muscus trichomanis facie, foliis utrimque ſplendentibus rotundis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 627. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 41.
Langs den. Hierder-weg *by* Harderwyk.

complanata 929. JUNGERMANNIA ſurculis repentibus: foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus. *Sp.* 1599. *n.* 14. *Friſ.* 468.
Jungermannia foliis circinatis imbricatim diſpoſitis ex viridi flaveſçentibus. *Mich. gen.* 7. *t.* 5. *f.* 21.
Lichenaſtrum imbricatum majus, ſquamis compreſſis & planis. *Dill muſc.* 496. *t.* 72. *f.* 26.
Aan de ſtammen van veelerbande Boomen.

dilatata. 930. JUNGERMANNIA ſurculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Sp.* 1600. *n.* 15. *Friſ.* 469.
Lichenaſtrum imbricatum minus, ſquamis convexo concavis. *Dill. muſc.* 447. *t.* 72. *f.* 27.
Hepaticoides, ſurculis & foliolis thuyæ inſtar compreſſis, minor. *Vaill. par.* 99. *t.* 19. *f.* 10.
By de voorige, dog menigvuldiger.

tamariſci. 931. JUNGERMANNIA foliis imbricatis ſerie duplici: ſuperioribus ſubrotundis convexis obtuſis quadruplo majoribus. *Sp.* 1600. *n.* 16.
Lichenaſtrum imbricatum, tamariſci narbonenſis facie. *Dill. muſc.* 269. *t.* 72. *f.* 31.
Hepaticoides, quæ Muscus trichomanoides terreſtris minor. floridus. *Vaill. par.* 100. *t.* 23. *f.* 10.
Muscoides ſquamoſum ſaxatile nigro-purpureum, ſurculis anguſtioribus, foliis circinatis minoribus. *Mich. gen.* 10. *t.* 6. *f.* 5.
Op verſcheide plaatſen aan de Beuke-Boomen.

ciliaris. 932. JUNGERMANNIA ſurculis repentibus, foliolis duplicato-imbricatis: inferne auriculatis ciliatis. *Sp.* 1601. *n.* 18.
Lichenaſtrum filicinum pulchrum villoſum. *Dill. muſc.* 503. *t.* 73. *f.* 35.
In den Haarlemmer-hout. (MEERBURGH.)

933. JUN-

933. JUNGERMANNIA ſurculis erectiuſculis bifariam imbricatis, foliolis bipartitis. *Sp.* 1601. *n.* 19. *Friſ.* 470. *varia.*
Jungermannia repens, foliis cordatis carinatis. *Mich. gen.* 8. *t.* 5. *f.* 9.
Lichenaſtrum foliis variis. *Dill. muſc.* 505. *t.* 73. *f.* 36.
In de Boſſchen en op de Heide; ook in ſommige Hoven onder 't geboomte.

934. JUNGERMANNIA acaulis, foliolo frondi innato. *Sp.* 1602. *n.* 24. *Gelr.* 658. *epiphylla.*
Lichenaſtrum capitulis rotundis e foliorum medio enaſcentibus. *Dill. muſc.* 508. *t.* 74. *f.* 11.
Lichen petræus, cauliculo calceato. *Baub. pin.* 362. *Comm. boll.* 66.
Oed. dan. t. 359.
Op vochtige ſteenachtige plaatſen.

935. JUNGERMANNIA acaulis, fronde lineari ramoſa: extremitatibus furcatis obtuſiuſculis. *Sp.* 1602. *n.* 27. *furcata.*
Lichenaſtrum tenuifolium furcatum, thecis globoſis piloſis. *Dill. muſc.* 512. *t.* 74. *f.* 45.
Hepatica arborea globulifera. *Vaill. par.* 98. *t.* 23. *f.* 11.
In 't Haagſche-Boſch *in eenige groepen.* (MEERBURGH.)

TARGIONIA.

936. TARGIONIA. *Sp.* 1603. *n.* 1.
Targionia minima & vulgaris. *Mich. gen.* 3. *t.* 3. *hypophylla.*
Lichen petræus minimus, fructu orobi. *Baub. pin.* 362. *Comm. boll.* 68. *Dill. muſc.* 532. *t* 78. *f.* 9.
Op vochtige ſteenachtige plaatſen. (COMMELIN)
Habitat proprie in Italia, Hiſpania, & circa Conſtantinopolin, ſed in Belgio naſcens mihi nondum viſa. Suſpicosr COMMELINUM *Jungermanniæ ſpeciem pro ea habuiſſe, cum iisdem cum* Jungermannia epiphylla 934. *locis creſcere dicat.*

MARCHANTIA.

937. MARCHANTIA calyce communi decemfido. *polymorpha.*
Sp.

Sp. 1603. *n.* 1. *Gelr.* 579. *Friſ.* 471.

α. Marchantia major, capitulo ſtellato: radiis teretibus. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 1.
Lichen fontanus major ſtellatus æque ac umbellatus & cyathophorus. *Dill. muſc.* 523. *t.* 76. *f.* 6.
Lichen petræus latifolius ſive Hepatica fontana. *Baub. pin.* 362. *Comm. boll.* 66.
Lichen petræus. *Lob. ic.* 2. *p.* 246. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 11.
Steen-Lever-kruid. Belg.

β. Marchantia ſtellata. *March. act.* 1713. *p.* 307. *t.* 5.
Marchantia capitulo ſtellato: radiis teretibus. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 2.
Lichen domeſticus minor ſtellatus æque ac umbellatus & cyathophorus. *Dill. muſc.* 527. *t.* 77. *f.* 7.
Lichen petræus ſtellatus. *Baub. pin.* 362. *Comm. boll.* 66.
Lichen ſecundus. *Lob. ic.* 2. *p.* 246. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 12.

γ. Marchantia calyce communi octopartito: laciniis e plano convexis. *Linn. lapp.* 423. *Gelr.* 580.
Marchantia capitulo non diſſecto. *Mich. gen.* 1. *t.* 1. *f.* 5.
Lichen petræus umbellatus. *Baub. pin.* 362. *Comm. boll.* 66.
Lichen tertius. *Lob. ic.* 2. *p.* 246. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 13.
In de Hoven en elders, op ſchaduwachtige plaatſen.
Pharm. *α.* HEPATICÆ FONTANÆ. *herb.*

cruciata. 938. MARCHANTIA calyce communi quadripartito: laciniis tubuloſis. *Sp.* 1604. *n.* 3.
Lichen feminifer lunulatus, florifer pileatus, tandem cruciatus. *Dill. muſc.* 521. *t.* 75. *f.* 5.
Lichen ſeu Hepatica lunulata, epiphyllocarpos. *Raj ſyn.* 41. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 16.
† *Volgens* BOERHAAVE.

tenella. 939. MARCHANTIA calyce communi hæmiſphærico apiculato: margine lamellis radiato. *Sp.* 1604. *n.* 4.
Lichen pileatus parvus carinatus, capitulis fimbriatis. *Dill. muſc.* 521. *t.* 75. *f.* 4.
In de Duinen by Waſſenaar, *in de Elſe-boſchjes.* (MEERBURGH.)
Rariſſima Belgii plantula.

940. MAR-

940. MARCHANTIA calyce communi quinqueloculari ſubovato. *Sp.* 1604. *n.* 6. *conica.*
Lichen vulgaris major pileatus & verrucoſus. *Dill. muſc.* 516. *t.* 75. *f.* 1.
Lichen petræus, cauliculo pileolum ſuſtinente. *Baub. pin.* 362. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 15.
Oed. dan. t. 274.
β. Lichen verrucoſus Dood. *Raj. ſyn.* 41. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 17.
† *Volgens* BOERHAAVE.

RICCIA.

941. RICCIA frondibus dichotomis lineari-filiformibus. *Sp.* 1606 *n.* 4. *Friſ.* 472. *fluitans.*
Lichenaſtrum aquaticum fluitans tenuifolium furcatum. *Dill. muſc.* 213. *t.* 74. *f.* 42.
Hepatica paluſtris dichotoma, ſegmentis anguſtioribus. *Vaill. par.* 98. *t.* 10. *f.* 3.
Oed. dan. t. 275.
In Friesland *in den eerſten opvaart ten Ooſten het Verlaat by de* Bonte bok, *en in de Vaart by de Schans naar 't* Heeren-veen; *en elders.*
DILLENII *icon melius plantam exprimit quam* VAILLANTII.
MEESE *nunquam fructificationes in ea detexit.*
Aquis faſciculatim innatat, aut Lemnæ aliisve plantis aquaticis ſe adfigit; a fine Junii ad finem Julii præſertim obvia.

ANTHOCEROS.

942. ANTHOCEROS frondibus indiviſis ſinuatis lævibus. *Sp.* 1606. *n.* 2. *lævis.*
Anthoceros foliis majoribus minus laciniatis. *Dill. muſc.* 476 *t.* 68. *f.* 2.
Lichen capillaceus, ex plurimis capillamentis nigricantibus conſtans. *Merr. pin.* 72. *Comm. holl.* 66.
Op vochtige plaatſen, en op verrot hout. (COMM.)
Juxta urbem Harlemenſem *in foſſarum aggeribus.* (*Linn. h. Cliff.* 477.)

Digitized by Google

LICHEN.

ſcriptus. 943. Lichen leproſus albicans, lineolis nigris ramoſis characteriformibus. *Sp.* 1606. *n.* 1. *Gelr.* 659. *Friſ.* 473.
Lichenoides cruſta tenuiſſima, peregrinis velut litteris inſcripta. *Dill. muſc.* 125. *t.* 18. *f.* 1.
Op de baſt van jonge Eike en andere Boomen.

geographicus. 944. Lichen leproſus flaveſcens, lineolis nigris mappam referens. *Sp.* 1607. *n.* 2. *Friſ.* 474.
Lichenoides nigro-flavum tabulæ geographicæ inſtar pictum. *Dill. muſc.* 126. *t.* 18. *f.* 5.
Oed. dan. t. 468. *f.* 1.
Zeer fraay op Boomen, wier baſt nog ongeborſten en glad is.

rugoſus. 945. Lichen leproſus albicans, lineolis ſimplicibus punctisque nigris confertis. *Sp.* 1607. *n.* 3. *Friſ.* 475.
Lichenoides punctatum & rugoſum nigrum. *Dill. muſc.* 125. *t.* 18. *f.* 2.
In de Boſſchen aan de ſtammen van Beuke- en Eike-Boomen.

ſanguinarius. 946. Lichen leproſus cinereo-vireſcens, tuberculis atris. *Sp.* 1607. *n.* 4. *Gelr.* 660.
Lichenoides leproſum, cruſta cinereo-vireſcente, tuberculis nigerrimis. *Dill. muſc.* 126. *t.* 18. *f.* 3.
Aan de ſtammen der Boomen op veele plaatſen.

fuſco-ater. 947. Lichen leproſus fuſcus, tuberculis atris. *Sp.* 1607. *n.* 5. *Friſ.* 476.
Buiten Franeker *op ſtammen van doode Eſſchenboomen.*

fagineus. 948. Lichen leproſus albus, tuberculis albis farinaceis. *Sp.* 1608. *n.* 10. *Friſ.* 478.
Op veele plaatſen op de baſt van Beuke-boomen.

ericetorum. 949. Lichen leproſus candidus, tuberculis incarnatis *Sp.* 1608. *n.* 12. *Gelr.* 598. *Friſ.* 479.
Coralloides fungiforme carneum, baſi leproſa. *Dill. muſc.* 76. *t.* 14. *f.* 1.

Fun-

Digitized by Google

Fungilli incarnati coloris minuti muſco inſidentes.
Mentz. pug. t. 6. *Comm. boll.* 40.
Oed. dan. t. 472.
Op de Heide by Lovenich *op de* Veluwe; *op de* Rhenenſe - berg; *in de* Haarlemmer - hout, *en in verſcheide Boſſchen in* Friesland, *en elders.*

950. LICHEN cruſtaceus flavus, ſcutellis luteis. *Sp.* 1608. *n.* 13. *Friſ.* 480. *candelarius*
Lichenoides cruſtoſum orbiculis & ſcutellis flavis. *Dill. muſc.* 136. *t.* 18. *f.* 18.
Aan de ſtammen van veelerbande oude Boomen, en aan oude Muuren.

951. LICHEN cruſtaceus albicans, ſcutellis pallidis. *Sp.* 1608. *n.* 15. *palleſcens.*
Lichenoides cruſtoſum orbiculare incanum. *Dill. muſc.* 130. *t.* 18. *f.* 17.
Op den baſt der Boomen op veele plaatſen.
Ipſos etiam Muscos arboribus adnaſcentes inveſtit.

952. LICHEN cruſtaceus albicans, ſcutellis nigris: junioribus urceolatis cavis. *Sp.* 1609. *n.* 16. *Gelr.* 661. *Friſ.* 481. *ſubfuſcus.*
Lichenoides cruſtaceum & leproſum, ſcutellis ſubfuſcis. *Dill. muſc.* 134. *t.* 18. *f.* 16.
Gelyk de voorgaande.

953. LICHEN imbricatus, foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis badiis. *Sp.* 1609. *n.* 19. *ſaxatilis.*
Lichenoides vulgatiſſimum cinereo - glaucum lacunoſum & cirrhoſum. *Dill. muſc.* 188. *t.* 24. *f.* 83.
Muscus cranio humano innatus. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 764. *Comm. boll.* 78.
Op Doods - hoofden van Menſchen, die in een vochtigen kelder zyn gelegt.
Pharm. USNEA *cranii humani.*
Non ſolum hic Lichen, ſed & varia Hypna craniis innaſcuntur. Vid. Dill. muſc. 190.

954. LICHEN imbricatus, foliolis lobatis nitidis lividis. *Sp.* 1610. *n.* 21. *Friſ.* 482. *olivaceus.*
Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens, olivaceus. *Vaill. par. t.* 20. *f.* 8.
Lichenoides olivaceum, ſcutellis amplioribus

verrucoſis. *Dill. muſc.* 184. *t.* 24. *f.* 78.
Op veele plaatſen, aan de baſten der Boomen, aan Muuren, en andere ſteenen.

parietinus. 955. LICHEN imbricatus, foliis criſpis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Sp.* 1610. *n.* 25. *Friſ.* 483.
Lichen dioſcoridis & plinii ſecundus. *Col. ecpbr.* 1. 331. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 1. 2. 3.
Lichenoides vulgare ſinuoſum, foliis & ſcutellis luteis. *Dill. muſc.* 180. *t.* 24. *f.* 76.
Muscus cruſtæ modo arboribus adnaſcens. *Baub. pin.* 361. *Comm. boll.* 77.
Zeer gemeen aan oude Fruit- en anderen Boomen, ook aan Muuren, planken, paalen, en anderen licbaamen.
Variat colore cinereo, viridante & flaveſcente.

phyſodes. 956. LICHEN imbricatus: laciniis obtuſis ſubinflatis. *Sp.* 1610. *n.* 26. *Gelr.* 662. *Friſ.* 484.
Lichenoides ceratophyllum obtuſius & minus ramoſum. *Dill. muſc.* 154. *t.* 20. *f.* 49.
Aan de ſtammen der Berke-boomen.

ſtellaris. 957. LICHEN imbricatus: foliolis oblongis laciniatis anguſtis cinereis, ſcutellis pullis. *Sp.* 1611. *n.* 27. *Gelr.* 663. *Friſ.* 485.
Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens, tenuiter diviſus. *Tourn. inſt.* 548. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 5.
Lichenoides cinereum, ſegmentis argutis ſtellatis, ſcutellis nigris. *Dill muſc.* 176. *t.* 24. *f.* 70.
Aan de baſten der Boomen op veele plaatſen.

ciliaris. 958. LICHEN foliaceus erectiuſculus: laciniis linearibus ciliatis, ſcutellis pedunculatis crenatis. *Sp.* 1611. *n.* 28.
Lichen latifolius ramoſus minor hirſutus. *Tourn. inſt.* 550. *t.* 325. *f.* C. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 25.
Lichenoides hiſpidum majus & rigidius, ſcutellis nigris. *Dill. muſc.* 150. *t.* 20. *f.* 45.
Muſco-fungus arboreus cinereus ſcutellatus, marginibus piloſis. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 634. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 6. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 21.
Lichen cinereus arboreus, marginibus fimbriatis. *Tourn.*

Tourn. inſt. 550. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 29.
Aan veele Boomen.

959. LICHEN foliaceus adſcendens laciniatus: marginibus elevatis ciliatis. *Sp.* 1611. *n.* 29. *iſlandicus.*
β. Lichenoides eryngii folia referens, tenuioribus & criſpioribus foliis. *Dill. muſc.* 212. *t.* 28. *f.* 112.
Oed. dan. t. 155.
Op den weg van Leiden *naar* Voorſchooten *aan een oude Schutting.* (MEERBURGH.)

960. LICHEN foliaceus adſcendens laciniatus criſpus glaber lacunoſus albus margine elevato. *Sp.* 1612. n. 30. *nivalis.*
Lichenoides lacunoſum candidum glabrum, endiviæ criſpæ facie. *Dill. muſc.* 162. *t.* 21. *f.* 56.
Oed. dan. t. 227.
In de Duinen by Hillegom. (MEERBURGH.)

961. LICHEN foliaceus liciniatus obtuſus glaber: ſupra lacunoſus; ſubtus tomentoſus. *Sp.* 1612. *n.* 31. *Gelr.* 581. *Friſ.* 487. *pulmonarius.*
Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. muſc.* 212. *t.* 29. *f.* 113.
Muscus pulmonarius. *Baub. pin.* 361. *Comm. boll.* 78.
Longe-kruid. Belg.
Aan de ſtammen en takken van oude Boomen, en aan vochtige wallen en dykjes op veele plaatſen.
Pharm. MUSCUS PULMONARIUS.

962. LICHEN foliaceus decumbens furfuraceus: laciniis acutis, ſubtus lacunoſis atris. *Sp.* 1612. *n.* 32. *furfuraceus*
Lichenoides cornutum amarum: deſuper cinereum; inferne nigrum. *Dill. muſc.* 157. *t.* 21. *f.* 52.
Muscus amarus, abſinthii folio. *Baub. biſt.* 3. *p.* 764. *Comm. boll.* 78.
Aan oude planken van ſchuttingen aan de Duinkant.

963. LICHEN foliaceus erectus compreſſus ramoſus: verrucis marginalibus farinoſis. *Sp.* 1613. *n.* 35. *Gelr.* 661. *Friſ.* 488. *farinaceus.*
Lichenoides ſegmentis argutioribus ad margines

verrucoſis & pulverulentis. *Dill. muſc.* 172. *t.* 23. *f.* 63.
Aan oude Beuke- en Eike-boomen, als mede aan ſchuttingen, bekken, en paalen.

calcaris. 964. LICHEN foliaceus erectus linearis ramoſus lacunoſus convexus mucronatus. *Sp.* 1613. *n.* 36. *Friſ.* 489.
Lichen cinereus latifolius ramoſus. *Tourn. inſt.* 550. *Vaill. par.* 115. *t.* 20. *f.* 6. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 28.
Lichenoides coralliforme roſtratum & canaliculatum. *Dill. muſc.* 170. *t.* 23. *f.* 62.
Muscus arboreus ramoſus coralloides. *Bauh. pin.* 361. *Comm. boll.* 77.
Aan de Takken van Appel- en anderen Boomen.

fraxineus. 965. LICHEN foliaceus erectus oblongus lanceolatus ſublaciniatus lacunoſus glaber; ſcutellis ſubpedunculatis. *Sp.* 1614. *n.* 37. *Gelr.* 665. *Friſ.* 490.
Lichen pulmonarius cinereus mollior, in amplas lacinias diviſus. *Tourn. inſt.* 549. *t.* 325. *f.* A. B. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 27.
Lichenoides longifolium rugoſum rigidum. *Dill. muſc.* 165. *t.* 22. *f.* 59.
β. Muſco-fungus arboreus anguſtior ſcutellatus & peltatus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 634. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 5. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 26.
Aan de ſtammen van Eike- en Beuke-boomen.

prunastri. 966. LICHEN foliaceus erectiuſculus lacunoſus: ſubtus tomentoſus albus. *Sp.* 1614. *n.* 39.
Lichen cinereus cornua damæ referens. *Tourn. inſt.* 549. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 24.
Lichen arboreus, varius magnitudine, ramis, foliis, colore, ex variis arboribus lectus hyeme ſæviſſima. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 23.
Lichenoides cornutum bronchiale molle ſubtus incanum. *Dill. muſc.* 160. *t.* 21. *f.* 55.
Aan de Wilge, Eſſche en anderen Boomen, dog voornamelyk aan den Slee-Doorn. 421.

caperatus. 967. LICHEN pallide viridis rugoſus margine undulatus. *Sp.* 1614. *n.* 41. *Gelr.* 584. *Friſ.* 491.
Lichenoides caperatum roſacee expanſum. *Dill. muſc.* 193. *t.* 25. *f.* 97.

α. Li-

α. Lichen cruſtæ modo aſſeribus adnaſcens latior mollior, vix vaſculoſus cinereus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 6.

β. Lichen cruſtæ modo aſſeribus adnaſcens, latior mollior, vix vaſculoſus roſeus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 7.

γ. Lichen cruſtæ modo aſſeribus adnaſcens, latior mollior, vix vaſculoſus, eleganter variegatus ex roſeo, albo, nigreſcente. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 8.

Aan oude boomen, planken, kei-ſteenen, ook aan de dykjes langs den Hierder-weg *by* Harderwyk.

968. LICHEN foliaceus depreſſus lobatus glaber: margine criſpo farinaceo. *Sp.* 1615. *n.* 42. *glaucus.*

Lichenoides endiviæ foliis criſpis ſplendentibus ſubtus nigricantibus. *Dill. muſc.* 192. *t.* 25. *f.* 96.

Muſco-fungus lichenoides arborum criſpus cinereus ſubtus nigricans. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 633. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 4.

Oed. dan. t. 598.

Op de Duinen te Catwyk. (MEERBURGH.)

969. LICHEN coriaceus repens lobatus obtuſus planus: ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali adſcendente. *Sp.* 1616. *n.* 48. *Gelr.* 582. *Friſ.* 493. *caninus.*

Lichen maritimus. C. B. *Comm. boll.* 65. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 10.

Lichen pulmonarius ſaxatilis digitatus. *Vaill. par.* 116. *t.* 21. *f.* 16.

Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis, ſinuoſis. *Dill. muſc.* 200. *t.* 27. *f.* 102.

Muſco-fungus terreſtris latifolius cinereus: hepaticæ facie. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 632. *ſ.* *t.* 7. *f.* 1.

Honds-Moſch. Belg.

Op dorre zandige plaatſen aan de Bronsbergen buiten Zutphen; *in de Duinen, veel te* Catwyk; *op 't hooge veld in den* Haarlemmer-hout; *by* Kranenborgs-erf *in* Tonſel *buiten* Harderwyk; *in* Friesland, *in de* Wouden *op verſcheide plaatſen, onder de Heide-ſtruiken; als ook aan dykjes en wallen in de ſchaduwe.*

Pharm. MUSCUS CANINUS ſ. LICHEN CINEREUS TERRESTRIS.

Hujus plures ratione fimbriarum varietates in maritimis oris detexit Magnus BOERHAAVIUS.

puſtulatus. 970. LICHEN umbilicatus: ſubtus lacunoſus furfure nigro adſperſus. *Sp.* 1617. *n.* 53.
Lichen cruſtæ modo ſaxis adnaſcens verrucoſus cinereus & exuſtus. *Tourn. inſt.* 549. *Vaill. par.* 116. *t.* 20. *f.* 9. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 9.
Lichenoides puſtulatum cinereum & veluti ambuſtum. *Dill. muſc.* 227. *t.* 30. *f.* 131.
Oed. dan. t. 597. *f.* 2.
Op groote Kei-ſteenen, die lang in de open lucht hebben geiegen.

cocciferus. 971. LICHEN ſcyphifer ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Sp.* 1618. *n.* 58. *Gelr.* 666. *Friſ.* 494.
Lichen pyxidatus prolifer, acetabulorum fimbriis tumentibus coccineis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 36.
Coralloides ſcyphiforme tuberculis coccineis. *Dill. muſc.* 82. *t.* 14. *f.* 7.
Veel op dorre Hei-gronden, en in 't Haagſche-Boſch.
Pharm. MUSCUS PYXIDATUS.

cornucopioides. 972. LICHEN ſcyphifer ſimplex folio brevior, tuberculis coccineis. *Sp.* 1619. *n.* 59.
Coralloides ſcyphiforme: marginibus radiatis & foliatis. *Dill. muſc.* 85. *t.* 14. *f.* 9.
In de Duinen by het Huis ten Deyl. (MEERBURGH.)

pyxidatus. 973. LICHEN ſcyphifer ſimplex crenulatus, tuberculis fuſcis. *Sp.* 1619. *n.* 60. *Friſ.* 495. *Gelr.* 587.
Lichen pyxidatus major. *Tourn. inſt.* 549. *t.* 325. *f. D. Vaill. par.* 115. *t.* 21. *f.* 8. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 30.
Coralloides ſcyphiforme, tuberculis fuſcis. *Dill. muſc.* 79. *t.* 14. *f.* 6.
Muſcus pyxoides terreſtris. *Bauh. pin.* 361. *Comm. Holl.* 78.
β. Lichen pyxidatus prolifer. *Tourn. inſt.* 549. *Vaill. par.* 115. *t.* 21. *f.* 5. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 37.
γ. Lichen pyxidatus, acetabulorum oris fuſcis & tumen-

mentibus. *Tourn. inſt.* 549. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 37.

β. Lichen pyxidatus, acetabulorum oris nigerrimis & tumentibus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 38.

By de voorgaande.

974. Lichen ſcyphifer ſimplex denticulatus, ſtipite cylindrico. *Sp.* 1619. *n.* 61. *Friſ.* 496. *fimbriatus.*

Lichen pyxidatus minor. *Tourn. inſt.* 549. *Vaill. par.* 115. *t.* 21. *f.* 6. *Mich. gen.* 83. *t.* 41. *f.* 45. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 31.

Coralloides ſcyphiforme gracile, marginibus ſerratis. *Dill. muſc.* 84. *t.* 14. *f.* 8.

In de Boſſchen op dorre gronden.

975. Lichen ſcyphifer ramoſus denticulatus filiformis. *Sp.* 1619. *n.* 62. *Friſ.* 497. *gracilis.*

Coralloides ſcyphiforme ſerratum elatius, caulibus gracilibus glabris. *Dill. muſc.* 88. *t.* 14. *f.* 13.

Muſco-fungus pyxidatus gracilior ramoſus, calycibus ſerratis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 362. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 6.

By de voorgaande.

976. Lichen ſcyphifer ramoſiſſimus: ramis cylindricis, calycibus integris nodoſis. *Sp.* 1620. *n.* 63. *Friſ.* 498. *digitatus.*

Coralloides ramuloſum, tuberculis coccineis. *Dill. muſc.* 96. *t.* 15. *f.* 19.

Als vooren.

977. Lichen ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus integris. *Sp.* 1620. *n.* 64. *Friſ.* 499. *cornutus.*

Coralloides vix ramoſum, ſcyphis obſcuris. *Dill. muſc.* 90. *t.* 15. *f.* 14.

Als vooren.

978. Lichen pyxidatus non ramoſus, acetabulis fimbriatis. *Tourn. inſt.* 549. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 34.

Lichen cornubus ſimpliciſſimis acutis farinoſis. *Hall. hiſt.* 1902.

Coralloides ſcyphiforme cornutum. *Dill. muſc.* 92. *t.* 15. *f.* 16.

Digitized by Google

β. Lichen pyxidatus, corniculis aduncis. *Tourn. inſt.* 549.
Lichen pyxidatus minimus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 33.
Op de Heide, in de Boſſchen.

deformis. 979. LICHEN ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus dentatis. *Sp.* 1620. *n.* 65.
Lichen pyxidatus teres, acetabulis minoribus repandis. *Tourn. inſt.* 549. *Mich. gen.* 80. *t.* 41. *f.* 1. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 33.
Op de Heide.

rangiferinus. 980. LICHEN fruticuloſus perforatus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus. *Sp.* 1620. *n.* 66. *Gelr.* 588. *Friſ.* 500.
Coralloides montanum fruticuli ſpecie ubique candicans. *Dill. muſc.* 107. *t.* 16. *f.* 29.
Coralloides corniculis candidiſſimis. *Tourn. inſt.* 595. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 19. *n.* 5.
Muſcus corallinus, ſive Corallina montana. *Tabern. ic.* 810.
Muſcus coralloides, ſive cornutus montanus. *Baub. pin.* 391. *Comm. boll.* 78.
Oed. dan. t. 180.
Geboornde Berg-Moſch. Belg.
β. Coralloides candida ramoſiſſima exigua. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 19. *n.* 6.
γ. Coralloides candida ramoſiſſima mollis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 19. *n.* 7.
δ. Coralloides candida ramoſiſſima mollis capillaris. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 19. *n.* 8.
ε. Coralloides candida ramoſiſſima molliſſima, filis pilo tenuioribus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 19. *n.* 9.
Op de Duinen te Catwyk, *en 't hooge veld aan den* Haarlemmer-hout; *ook op dorre Hei-gronden.*
Rangiferi in Lapponia, qui hoc Lichene per integram hyemem vitam ſuſtentant, eum effodiunt, etiamſi ad altitudinem duarum orgyarum nive tecta ſit tellus, uti Ill. LINNÆUS, *cum in Belgio degebat, mihi retulit.*

uncialis. 981. LICHEN fruticuloſus perforatus, ramulis breviſſimis acutis. *Sp.* 1621. n. 67 *Friſ.* 501.
Coralloides perforatum minus molle & tenue. *Dill.*

Digitized by Google

Dill. muſc. 99. *t.* 19. *f.* 22.

β. Coralloides perforatum majus molle & craſſum. *Dill. muſc.* 98. *t.* 16. *f.* 21. B.

Op booge Hei-velden.

982. Lichen fruticuloſus ſubdichotomus, ramis ſimplicibus ſubulatis. *Sp.* 1621. *n.* 68. *Friſ.* 502. *ſubulatus.*

Coralloides corniculis longioribus & rarioribus. *Dill. muſc.* 102. *t.* 16. *f.* 26.

Coralloides cornua cervi referens, corniculis longioribus. *Tourn. inſt.* 565. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 2.

Muscus corniculatus. *Tabern. ic.* 809. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 767.

β. Coralloides ſparſum, caulibus tortuoſis & ſpinoſis. *Dill. muſc.* 101. *t.* 16. *f.* 24.

Coralloides cornua cervi referens, corniculis brevioribus. *Tourn. inſt.* 565. *Boerh lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 1.

Muscus coralloides ſaxatilis cervi cornua referens. *Baub. pin.* 361. *Comm. holl.* 78.

Op den Tryſſelberg *by* Hattem. β. *Op vochtige ſteenachtige plaatſen, en op Hei-velden.*

β. *Pro diſtincta ſpecie habetur a* Dillenio.

983. Lichen fruticuloſus ramoſus articulatus, articulis longis cylindricis, peltis pedunculatis. *Friſ.* 503. *t.* 1. *Meeſii.*

Corallina (*terreſtris*) oppoſite ramoſa, articulis cylindricis, fructificationibus lateralibus pedunculatis transverſim oblongis. *Pallas Zoophyt.* 427.

Op de Bergummer-Heide *in* Friesland.

Cl. I. Ellis (*act. angl. vol.* LVII. *ad ann.* 1767. *p.* 420.) *ad Zoophyta hunc Lichenem refert, ſtatuens non eſſe plantam, ſed & mari, quod Belgium olim obtegit, adventitium eſſe, atque, quod Cl.* Pallas, *ut fructificationes deſcribit, ramos eſſe imperfectos. Ill.* Linnæus (*ſyſt. nat. edit.* 12. *tom.* 1. *p.* 1306.) *quoque ad Vermes Zoophyta refert nomine Corallinæ terreſtris.*

984. Lichen filamentoſus pendulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis. *Sp.* 1662. *n.* 72. *Gelr.* 583. *plicatus.*

Uſnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill. muſc.* 56. *t.* 11. *f.* 1.

Digitized by Google

Muſcus arboreus, uſnea officinarum. *Bauh. pin.* 361. *Comm. holl.* 77.
Boom-Moſch. Belg.
Aan veelerhande ſoorten van Boomen.
Pharm. MUSCUS ARBOREUS.

hirtus. 985. LICHEN filamentoſus ramoſiſſimus erectus, tuberculis farinaceis ſparſis. *Sp.* 1623. *n.* 78. *Gelr.* 667.
Uſnea vulgatiſſima tenuior & brevior ſine orbiculis. *Dill. muſc.* 67. *t.* 13. *f.* 12.
Muſcus ramoſus. *Tabern. ic.* 807.
Veel aan verſcheide Boomen.

articulatus 986. LICHEN filamentoſus articulatus, ramulis tenuiſſimis punctatis. *Sp.* 1623. *n.* 80.
Uſnea capillacea & nodoſa. *Dill. muſc.* 60. *t.* 11. *f.* 4.
Muſcus arboreus nodoſus. *Bauh. pin.* 361.
Muſco-fungus arborum nodoſus ſ. geniculatus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 634. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 11.
In de Duinen te Waſſenaar. (MEERBURGH.)

floridus. 987. LICHEN filamentoſus ramoſus erectus, ſcutellis radiatis. *Sp.* 1624. *n.* 81. *Gelr.* 585.
Uſnea vulgatiſſima tenuior & brevior cum orbiculis. *Dill. muſc.* 69. *t.* 13. *f.* 13.
Muſcus arboreus cum orbiculis. *Bauh. pin.* 361. *Comm. holl.* 77.
Muſcus ramoſus floridus. *Tabern. ic.* 808.
Veel aan Beuke-boomen.

TREMELLA.

Noſtoc. 988. TREMELLA plicata undulata. *Sp.* 1625. *n.* 1. *Gelr.* 668. *Gmel. fuc.* 222.
Tremella terreſtris ſinuoſa pinguis & fugax. *Dill. muſc.* 52. *t.* 10. *f.* 14.
Noſtoc paracelſi. *act. paris.* 1708. *p.* 228.
In de Hoven en Wei-landen in de Na-zomer na langdurigen regen.

verrucoſa. 989. TREMELLA tuberculoſa ſolida rugoſa. *Sp.* 1625. *n.* 5. *Gelr.* 670. *Gmel. fuc.* 227.
Tremella fluviatilis gelatinoſa & uterculoſa. *Dill. muſc.*

muſc. 54. *t.* 10. *f.* 16.
In de Beeken op de Steenen by Eſſenburg, Vaaſſen, Reukum, *en elders op de* Veluwe.

990. TREMELLA ſubgloboſa ſeſſilis ſolitaria glabra. *purpurea.*
Sp. 1626. *n.* 7. *Friſ.* 5 8.
Lichenoides tubercoloſum, amæne purpureum. *Dill. muſc.* 127 *t.* 18. *f.* 6.
Aan kwynende en doode takken van Abricoſe, Aalbezie, en andere ſoorten van Boomen in 't Voor- en Na-jaar.
Colore ſuo pulchre rubro facile dignoſcitur.

FUCUS.

991. FUCUS caule filiformi ramoſo, foliis lanceolatis ſerratis, fructificationibus globoſis pedunculatis. *Sp.* 1628. *n.* 13. *Gmel. fuc.* 92. *natans.*
Fucus folliculaceus, ſerrato folio. *Bauh. pin.* 365.
Lenticula marina, ſerratis foliis. *Dalech. hiſt.* 1397.
Zee-Kroos. Belg.
Op 't Strand tuſſchen Scheveningen *en* Catwyk. (MEERBURGH.)

992. FUCUS fronde plana dichotoma coſtata ſerrato-dentata, fructificationibus terminalibus tuberculoſis. *Sp.* 1626. *n.* 1. *Baſter. opuſc.* 6. *p.* 120. *n.* 3. *f.* 3. *Gmel. fuc.* 57. *ſerratus.*
Fucus ſ. Alga latifolia major dentata. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 648. *ſ.* 15. *t.* 9. *f.* 1. *bona*
Te Catwyk *aan 't Strand.* (MEERBURGH.)

993. FUCUS fronde plana dichotoma coſtata integerrima: veſiculis axillaribus geminis: terminalibus tuberculatis. *Sp.* 1626. *n.* 2. *Friſ.* 509. *Gmel. fuc.* 60. *veſiculoſus.*
Fucus maritimus vel Quercus maritima veſiculas habens. *Bauh. pin.* 365. *Comm. boll.* 39.
Quercus marina. *Lob. ic.* 2. *p.* 255. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 21.
Zee-Eike. Belg.
Overvloedig in de Zuider-Zee *omtrent 't Eyland* Wieringen, *en aan 't Zee-ſtrand van* Friesland.
Potenter reſolvit tumores duros. Vid. Gmel. fuc. p. 67.

994. FU-

divaricatus 994. Fucus fronde plana dichotoma integerrima, axillis divaricatis: veſiculis axillaribus geminis. *Sp.* 1627. *n.* 8. *Friſ.* 511.
Fucus bullatus fruticeſcens, caule nudo, foliis rectis compreſſis bifidis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 647. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 5.
In Friesland *tuſſchen* Harlingen *en* Dykshoek *op verſcheide plaatſen aan 't Strand.*
Cl. Gmelinus (*Fuc. p.* 62.) *pro varietate* Fuci veſiculoſi *habet.*

ceranoides. 995. Fucus fonde plana dichotoma integerrima punctata lanceolata, fructificaionibus tuberculatis bifidis terminalibus. *Sp.* 1626. *n.* 3. *Friſ.* 510. *Gmel. fuc.* 115.
Fucus humilis dichotomus ceranoides, latioribus foliis utplurimum verrucoſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 13.
By de voorige; ook by Wieringen.
Moriſoni icon non ſatis bona. Vid. Meeſe Friſ. 510.

canaliculatus. 996 Fucus fronde plana dichotoma integerrima canaliculata lineari, fructificationibus tuberculatis bipartitis obtuſis. *Syſt. edit.* 13. *p.* 812. *Gmel. fuc.* 73. *t.* 1. A. *f.* 2.
Oed. dan. t. 244.
β. Fucus *exciſus. Sp.* 1627. *n.* 10.
Fucus dichotomus, membranaceus ex viridi flaveſcens ceranoides angulos rotundiuſculos efformans. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 11.
Te Catwyk *aan 't Strand.* (Meerburgh.)

nodoſus. 997. Fucus fronde compreſſa dichotoma, foliis diſtichis integerrimis, veſiculis innatis ſolitariis dilatatis. *Sp.* 1628. *n.* 11. *Friſ.* 512. *Baſter. opuſc.* 6. *p.* 121. *t.* 11. *f.* 5. *Gmel. fuc.* 78. *t.* 1. *B. f.* 1.
Fucus maritimus nodoſus. *Baub. pin.* 365. *Comm. holl.* 39.
Fucus marinus tertius. *Dod. pempt.* 480.
Oed. dan. t. 146.
Knobbelachtig Wierd, Pater noſter Wierd. Belg.
Omtrent het Eyland Wieringen, *en in* Friesland *aan 't Stand.*

998. Fu-

998. Fucus fronde compreſſa ramoſa, foliis diſtichis alternis integerrimis, fructificationibus pedunculatis oblongis mucronatis. *Sp.* 1529. *n.* 17. *Friſ.* 513. *Gmel. fuc.* 81. *t.* 2. B. *ſiliquoſus.*
Fucus marinus quartus. *Dod. pempt.* 480.
Fucus maritimus alter, tuberculis pauciſſimis. *Baub. pin.* 368. *Comm. holl.* 39.
Oed. dan. t. 106.
By de voorige, en ook te Harderwyk *aan 't Zee-Strand.*
Sæpe huic innaſcitur Sertularia *pluma.*

999. Fucus fronde filiformi ramoſiſſima, veſiculis ovatis terminatis foliolis multipartitis obtuſis apice fructificantibus. *Sp.* 1629. *n.* 20. *Gmel. fuc.* 86. *t.* 2. A. *f.* 3. *foeniculaceus.*
Fucus radicibus arborum fibroſis ſimilis. *Raj. ſyn.* 49. *n.* 45. *Meeſ. friſ.* 514.
Fucus folliculaceus, foliis foeniculi brevioribus. *Baub. pin.* 365.
In Friesland *aan de Zee.*
Coloris eſt rufi, ſubſtantiæ corneæ.

1000. Fucus fronde filiformi ſubfragili opaca. *Sp.* 1631. *n.* 31. *Gmel. fuc.* 131. *Filum.*
Fucus ſive Filum maritimum germanicum. *Bocc. muſ.* 1. *p.* 271. *t.* 9. *f.* 9.
Filum maritimum germanicum. *Baub. prodr.* 155.
Alga nigro capillaceo folio. *Baub. pin.* 364. *Comm. holl.* 5.
By 't Eyland Wieringen.

1001. Fucus fronde palmata plana. *Sp.* 1630. *n.* 26. *palmatus.*
Fucus membranaceus ceranoides. *Baub. prodr.* 155.
Fucus foliaceus humilis palmam humanam referens. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 1.
Alga membranacea ceranoides. *Baub. pin.* 364. *Comm. holl.* 5.
Aan de Stranden van de Noord-Zee, omtrent Zandvoort.
Cl. Gmelinus *ſynonyma Baubini ad Suum Fucum dulcem refert (fuc.* 189. 202.)

1002. Fucus fronde filiformi ramoſiſſima hirta. *Sp.* 1631. *n.* 33. *ericoides.*

Fu-

Fucus *Erica marina. Gmel. fuc.* 128.
Fucus foliis ericæ. *Raj. hiſt.* 73. *Reaum. act. gall.* 1712. *p.* 41. *t.* 3. *f.* 5
Tamariſco ſimilis maritima. *Baub. pin.* 365. *Comm. boll.* 109.
Erica marina quibusdam. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 799.
Muſcus marinus plumaceus niger. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 10.
Op Hoorns, Schulpen, en Moſſelen aan de Zee-ſtranden.
In Syſtemate naturæ omiſſus.

ULVA.

pavonia. 1003. ULVA plana reniformis ſeſſilis decuſſatim ſtriata. *Syſt. edit.* 13. *p.* 817.
Fucus *pavonius. Sp.* 1630. *n.* 28.
Corallina pavonia. *Pall. zooph.* 419.
Fucus maritimus gallopavonis pennas referens. *Baub. prodr.* 155. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 645. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 7. *Ellis. cor.* 88. *t.* 33. *f.* C.
Alga marina gallopavonis plumas referens. *Baub. pin.* 364.
Fungus auricularis. *Baub. pin.* 368.
Te Scheveningen *aan 't Strand.* (MEERBURGH.)
Cl. ELLIS *in epiſtola ad* LINNÆUM (*act. angl.* 1767. *Vol.* LVII. *p.* 419.) *probat contra Cl.* PALLAS Corallinam pavoniam *ejusdem non ad Corallinas pertinere, ſed Fucis inſerendam eſſe, uti ab. Ill.* LINNÆO *jam factum eſt, arcusque transverſos in ea deprebendendos, quos Cl.* PALLAS *ſeminiferos dixit, non calcareæ indolis eſſe.*

inteſtinalis. 1004. ULVA tubuloſa ſimplex. *Sp.* 1632. *n.* 1. *Gelr.* 595. *Friſ.* 515.
Tremella marina tubuloſa inteſtinorum figura *Dill. muſc.* 47. *t.* 9. *f.* 7.
Fucus cavus. *Baub. pin.* 364.
In de Zuider *en* Noord-zee, *veel omtrent* Koehool *in* Friesland.

compreſſa. 1005. ULVA tubuloſa ramoſa compreſſa. *Sp.* 1632. *n.* 2. *Friſ.* 516.
Tremella marina tenuiſſima & compreſſa. *Dill.*

muſc.

muſc. 48. *t.* 9. *f.* 8.
By de voorgaande.

1006. ULVA palmata prolifera membranacea: ramentis inferne anguſtatis. *Sp.* 1632. *n.* 5. *Friſ.* 517. *Lactuca.*
Tremella. *Lactuca. Gmel. fuce.* 215.
Tremella marina vulgaris, lactucæ ſimilis. *Dill. muſc.* 42. *t.* 8. *f.* 1.
Fucus lactucæ folio. *Tourn. inſt.* 568. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 9.
Muscus marinus lactucæ folio. *Bauh. pin.* 364. *Comm. boll.* 78.
Zee-Latouw, Zee-Salade. Belg.
Aan Muiderberg *onder 't Zee-water op Kei-ſteenen; ook aan het Zee-ſtrand van* Friesland, *en in de kuilen en water-plaſſen omtrent de Zee.*
Latiſſime ſe ſæpius extendit.

1007. ULVA fronde oblonga bullata. *Sp.* 1638. *n.* 8. *Friſ.* 518. *Linza.*
Tremella marina faſciata. *Dill. muſc.* 46. *t.* 9. *f.* 6.
Fucus Linza dictus, lactucæ marinæ ſimilis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 81.
Muscus lactucæ marinæ ſimilis. *Bauh. pin.* 364.
Aan de Zee-ſtranden van Friesland.

CONFERVA.

1008. CONFERVA filamentis ſimpliciſſimis æqualibus longiſſimis. *Sp.* 1633. *n.* 1. *Gelr.* 596. *Friſ.* 519. *rivularis.*
Conferva fluviatilis ſericea vulgaris & fluitans. *Dill. muſc.* 12. *t.* 2. *f.* 2.
Conferva plinii. *Lob. ic.* 2. *p.* 257.
Alga viridis, capillaceo folio. *Bauh. pin.* 364. *Comm. boll.* 5.
Flap, Deeken-vlag. Belg.
In ſtilſtaande Wateren en Slooten op veele plaatſen.

1009. CONFERVA filamentis æqualibus ramoſis, bullas aëreas includentibus. *Sp.* 1634. *n.* 3. *bulloſa.*
Conferva paluſtris bombycina. *Dill. muſc.* 18. *t.* 3. *f.* 2.
Alga bombycina. *Bauh. pin.* 363.

Mus-

Muſcus aquaticus bombycinus, tenuiſſimis filamentis. *Loeſ. pruſſ.* 173. *t.* 55.
In ſtilſtaande Wateren, en in de Regen-bakken.

canalleularis. 1010. CONFERVA filamentis æqualibus baſin verſus ramoſioribus. *Sp.* 1634. *n.* 3. *Gelr* 671. *Friſ.* 520.
Conferva rivulorum capillacea, denſiſſime congeſtis ramulis. *Dill musc* 21. *t.* 4. *f.* 15.
Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus. *Baub. pin.* 364.
In de Beeken by de Papier-molens.

amphibia. 1011. CONFERVA filamentis æqualibus ramoſis, exſiccatione coëuntibus in aculeos. *Sp.* 1634. *n.* 5. *Friſ.* 521.
Conferva amphibia fibrilloſa & ſpongioſa. *Dill. muſc.* 22. *t.* 4. *f.* 17.
Op veele plaatſen in Vaarten, Graften, Vyvers en Slooten, aan ſtammen van Boomen, en aan anderen licbaamen onder water; ook ſomtyds in vochtige Gruppels en Gooten.

littoralis. 1012. CONFERVA filamentis æqualibus ramoſiſſimis elongatis ſcabriuſculis. *Sp.* 1634. *n.* 6. *Friſ.* 522.
Conferva marina capillacea longa ramoſiſſima. *Dill. muſc.* 23. *t* 4. *f.* 19.
Tuſſchen Harlingen *en* Dykshoek, *by* Enckhuiſen, *en elders aan 't Strand.*

capillaris. 1013. CONFERVA filis geniculatis ſimplicibus: articulis alternatim compreſſis. *Sp.* 1636. *n.* 14. *Friſ.* 523.
Conferva filamentis longis geniculatis ſimplicibus. *Dill. muſc.* 25. *t.* 5. *f.* 25.
Conferva fluitans, filamentis geniculatis. *Pluk. alm.* 113. *t.* 84. *f.* 9. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 644. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 3.
In plaſſen met brak-water, en in Slooten omtrent Dykshoek *in* Friesland.

corallina. 1014. CONFERVA filis geniculatis dichotomis. *Sp.* 1636. *n.* 15. *Friſ.* 524. *t.* 2.
Conſerva marina gelatinoſa, corallinæ inſtar geni-

niculata craſſior. *Dill. muſc.* 33. *t.* 6. *f.* 36.
Zeer veel in Friesland *aan 't Strand, en dikwils op Moſſels.*
Variat colore albo, rubente, & ex albo rubente.
Conf. Dill. muſc. t. 6. *f.* 37, & *t.* 7. *f.* 40.

1015. CONFERVA filis geniculatis: articulis cylindricis. *Sp* 1636. *n.* 16. *Friſ.* 525. *catenata.*
Conferva ramoſa, geniculis longioribus cateniformibus. *Dill. muſc.* 27. *t.* 5. *f.* 27.
In plaſſen met brak water by Dyks-hoek *in* Friesland.

1016. CONFERVA filamentis geniculatis, ramis faſciculatis. *Sp.* 1636. *n.* 17. *Friſ.* 526. *polymorpha*
Conferva marina geniculata nigra palmata. *Dill. muſc.* 32. *t.* 6. *f.* 35.
Oed. dan. t. 395.
Na barden ſtorm, by Koehool *in* Friesland *aan 't ſtrand gevonden door* MEESE.

BYSSUS.

1017. BYSSUS capillaris molliſſima parallela fragiliſſima pallida. *Syſt. edit.* 12. *tom.* 3. *p.* 235. *edit.* 13. *p.* 819. *ſeptica.*
Byſſus latiſſima filtrum ſ. pannum laneum ſimulans, filamentis tenuiſſimis non ramoſis. *Mich. gen.* 211. *n.* 10.
In de huizen onder de houte vloeren; veel te Enckhuiſen.

1018. BYSSUS filamentis plumoſis natantibus. *Sp.* 1637 *n.* 1. *Gelr.* 672. *Friſ.* 527. *Flos aquæ.*
Byſſus latiſſima, papyri inſtar ſupra aquam expanſa. *Dill. muſc.* 2.
Water-bloeizel. Belg.
Veel op 't Water in de voor-zomer.
Cl. F. G. WEIS (*plant. cryptog. floræ Gotting. p.* 19. *non vult ad vivas pertinere plantas, ſed eſſe materiam collectam e particulis putredine deſtructarum plantarum aquaticarum, ob levitatem ſummam aquæ petentibus ſuperficiem.*

1019. BYSSUS lanuginoſa violacea lignis adnaſcens *phoſphorea.*

Dill. muſc. 4. *t.* 1. *f.* 6. *Sp.* 1638. *n.* 2. *Gelr.* 673. *Friſ* 528.
Op oud verrot hout, op vochtige en beſchaduwde plaatſen, en in beſlootene kelders.

velutina. 1020. BYSSUS capillacea viridis: filamentis ramoſis. *Sp.* 1638. *n.* 3. *Friſ.* 529.
Byſſus tenerrima viridis velutum referens. *Dill. muſc.* 7. *t.* 1. *f.* 14.
Byſſus terreſtris viridis herbacea & molliſſima, filamentis ramoſis & non ramoſis. *Mich. gen.* 211. *t.* 89. *f.* 5.
Op den gront in de ſchaduwe op zeer veele plaatſen.

Jolithus. 1021. BYSSUS pulverulenta ſanguinea ſaxis innaſcens. *Sp.* 1638. *n.* 8. *Friſ.* 530.
Byſſus germanica minima ſaxatilis aurea violæ odorem ſpirans. *Mich. gen.* 210. *t.* 89. *f.* 3.
Jolithus ſ. lapis violaceus. *Swenck. foſſ.* 382.
Op ſteenen en tuſſchen de zelven by veranderlyken vochtig weêr, en ook op den gront in donkere vochtige plaatſen, als ook in bloempotten in kaſſen en broei-bakken.

candelaris. 1022. BYSSUS pulverulenta flava lignis adnaſcens. *Dill. muſc.* 3. *t.* 1. *f.* 4. *Sp.* 1639. *n.* 9. *Gelr.* 674. *Friſ.* 531.
Aan oude planken, muuren, en op oude panne-daken.

botryoides. 1023. BYSSUS pulverulenta viridis. *Sp.* 1639. *n.* 10. *Friſ.* 532.
Byſſus botryoides ſaturate viridis. *Raj. angl.* 3. *p.* 5. 6. *Dill. muſc.* 3. *t.* 1. *f.* 5.
Zeer gemeen op donkere vochtige gronden, en op de Tuin-potten.

incana. 1024. BYSSUS pulverulenta incana, farinæ inſtar ſtrata. *Dill. muſc.* 3. *t.* 1. *f.* 3. *Sp.* 1639. *n.* 11.
Aan de kanten der ſlooten, langs zandige wegen.

lactea. 1025. BYSSUS pulverulento-cruſtacea albiſſima. *Sp.* 1639. *n.* 12. *Friſ.* 533.
Byſſus candidiſſima, calcis inſtar muſcos veſtiens. *Dill. muſc.* 2. *t.* 1. *f.* 2.
Op de baſten van oude Boomen, en op de Moſſen.

FUN-

F U N G I.

A G A R I C U S.

1026. AGARICUS ſtipitatus, lamellis ramoſis decurrentibus. *Sp.* 1639. *n.* 1. *Gelr.* 675. *Friſ.* 540. *Chantarellus.*
α. Fungus minimus flaveſcens infundibuliformis. *Baub. pin.* 373. *Comm. holl.* 42. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 13. *Vaill. par.* 60. *t.* 11. *f.* 9. 10.
Elvela pediculata pileata, pileo ſubtus reticulato. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 12.
β. Fungus anguloſus & velut in lacinias ſectus. *Baub. pin.* 371. *Vaill. par. t.* 11. *f.* 14. 15.
Oed. dani t. 264.
Chanterelle of *Geele Champignon.* Vulgo.
γ. Fungus pallidus, Chanterelle dictus, ſe contorquens eſculentus. *Baub. biſt.* 3. *p.* 832.
α. *Op 't bobbelige veld buiten* Haarlem. β. *Veel onder de Boomen en in de Boſſchen by* Putten, Uilenpas, Keppel, *en elders in* Gelderland; *op* Zandenburg, Hardenbroek, &c. *in 't Sticht van* Utrecht; *omtrent het* Orange-woud *in* Friesland. *γ. buiten* Franeker.
Synonymum J. Baub. Fungus intybaceus, & alius interaneorum vituli ſimilis, cinereus, *a Commelino* β. *adpoſitum excludatur.*

1027. AGARICUS ſtipitatus, lamellis omnibus magnitudine æqualibus *Sp.* 1640. *n.* 3. *Friſ.* 541. *integer.*
Agaricus major, pediculo longo modice craſſo, lamellis albis creberrimis ſuperne ad margines apparentibus. *Raj. ſuppl.* 18. *Buxb. cent.* 4. *p.* 12. *t.* 19.
Op Hei-velden, en in ſommige Wei-landen, omtrent Auguſtinisga &c. *in* Friesland.

1028. AGARICUS ſtipitatus, lamellis dimidiatis ſolitariis, ſtipite volvato: apice dilatato, baſi ovata. *Sp.* 1640. *n.* 4. *Gelr.* 676. *muſcarius.*
Agaricus cauleſcens, pileo ſanguineo, verrucis lamellisque albis, ſtipite albo baſi globoſo. *Linn. lapp.* 515.
Fungi muſcas interficientis 111. ſpecies aut vari-

Digitized by Google

rietas. *Baub. pin.* 373. *n.* 19.
Fungorum pernicioſorum genus 12. *n.* 4. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 280.
In de Laan van den Vanenburg *op de* Veluwe.

piperitus. 1029. AGARICUS ſtipitatus, pileo planiuſculo lacteſcente, margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. *Sp.* 1641. *n.* 8. *Gelr.* 677.
Fungus piperatus albus craſſus, lacteo ſucco turgens. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 825. *Mich. gen.* 141. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 11. *n.* 4.
Fungus albus acris. *Baub. pin.* 371.
β. Fungus pileolo lato orbiculato candicante. C. B. *Comm. boll.* 40.
Fungus umbilicoſus lacteſcens. *Sterb. fung.* 116.
In de Boſſchen in Gelderland; β. *in de* Aardenhouts - Laan *buiten* Haarlem.

campeſtris. 1030. AGARICUS ſtipitatus, pileo convexo ſquamato albido, lamellis ruffis. *Sp.* 1641. *n.* 9. *Gelr.* 678. *Friſ.* 542.
Fungus pileolo lato & rotundo. *Baub. pin.* 370. *Comm. boll.* 39.
Fungus campeſtris albus ſuperne, inferne rubens. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 824.
Witte Champignion, eetbaare Campernoelje, ook *Duivels - brood.* Belg.
β. Fungus pileolo lato & rotundo livido. *Baub. pin.* 370. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 11. *n.* 2.
γ. Agaricus ſtipitatus, pileo flavo convexo, lamellis albis. *Sp.* 1642. *n.* 14. *Friſ.* 543.
Fungus orbicularis exalbidus pratenſis. *Baub. pin.* 370. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 11. *n.* 5.
Fungus divi georgii, coloris exalbidi cum pauca flavitie, eſculentus pratenſis 1. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 824.
Fungus croceus magnus. *Sterb. fung.* 63. *t.* 11. *f.* 3.
Op verſcheide plaatſen in den herfſt in de Weiden, en ook op 't hooge Veld by de Haarlemmer - hout.

mammoſus. 1031. AGARICUS ſtipitatus, pileo convexo acuminato griſeo, lamellis convexis griſeis crenatis, ſtipite nudo. *Sp.* 1642. *n.* 15. *Friſ.* 544.
Fungus minor, capitulo pileum nauticum refe- ren-

rente, pediculo longiore. *Buxb. cent.* 4. *p.* 13. *t.* 21. *f.* 1.
By het Strandmeeſters-Huis aan den Zeedyk, omtrent het Bildt *in* Friesland.

1032. Agaricus ſtipitatus, pileo hemiſphærico viſcido acuminato, lamellis albis, ſtipite longo cylindrico albo. *Sp.* 1642. *n.* 16. *Friſ.* 545. *clypeatus.*
Fungus clypeatus in medio protuberans. *Vaill. par.* 68.
Veel in Boſſchadien, en in de Hoven in 't najaar.

1033. Agaricus ſtipitatus, pileo campaniformi albido lacero, lamellis niveis, ſtipite ſubbulboſo ſubulato nudo. *Sp.* 1643. *n.* 17. *extinctorius.*
Fungus pernicioſus ex eodem pediculo multiplex. *Tourn. inſt.* 560. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 10. *fl. Belg.* 1051.
Fungi dumetorum ex uno pede prodeuntes. *Bauh. pin.* 374. *Comm. holl.* 41.
Fungorum pernicioſorum genus XXII. Spec. V. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 285.
Aan oude Boomen; ook by de wegen te Schalkwyk *in 't Sticht van* Utrecht.
Variat colore, magnitudine & numero, pro diverſis, quibus innaſcitur arboribus. (Boerh.)

1034. Agaricus ſtipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuoſis, ſtipite fiſtuloſo. *Sp.* 1643. *n.* 18. *Gelr.* 679. *Friſ.* 546. *fimetarius.*
Fungus oris laceris & in lacinias diviſis. *Bauh. pin.* 373. *Comm. holl.* 41.
Fungus comatus. *Sterb. fung.* 228. *t.* 22. *f.* I. K. L.
Fungorum pernicioſorum genus 16. *n.* 3. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 282.
Padden-ſtoelen. Vulgo.
Op Meſt-hoopen, en op donkere vochtige verrotte gronden.

1035. Agaricus ſtipitatus, pileo campanulato ſtriato pellucido, lamellis adſcendentibus, ſtipite nudo. *Sp.* 1643. *n.* 19. *Friſ.* 547. *campanulatus.*
Fungus multiplex obtuſe conicus, colore griſeo murino. *Vaill. par.* 71. *t.* 12. *f.* 1. 2.

Digitized by Google

In veele Wei-landen op hoopjes oude Koe-meſt in't najaar.

fragilis. 1036. AGARICUS ſtipitatus, pileo convexo viſcido pellucido lamelliſque luteis, ſtipite nudo. *Sp.* 1643. *n.* 21. *Friſ.* 548.
Fungus pileo croceo ſplendoris participe. *Vaill. par. t.* 11. *f.* 16. 17. 18.
In 't najaar op veele plaatſen in de Wei-landen.

umbelliſferus. 1037. AGARICUS ſtipitatus, pileo plicato membranaceo, lamellis baſi latioribus. *Sp.* 1643. *n.* 22. *Gelr.* 680. *Friſ.* 549.
Fungus minimus totus albus, pileo hemiſpærico utrinque ſtriato, lamellis rarioribus. *Mich. gen.* 169. t. 80. *f.* 11.
In de Boſſchen en Hoven tuſſchen de afgevallene bladen.

quercinus. 1038. AGARICUS acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Sp.* 1644. *n.* 26. *Friſ.* 550.
Agaricus villoſus, lamellis ſinuoſis & invicem implexis. *Buxb. cent.* 5. *p.* 3. *t.* 4. *f.* 1.
Aan Eike-paalen te Higtum *en* Auguſtinisga *in* Friesland.

BOLETUS.

igniarius. 1039. BOLETUS acaulis pulvinatus lævis, poris tenuiſſimis. *Sp.* 1645. *n.* 3. *Friſ.* 551.
Agaricus pedis èquini facie. *Tourn. inſt.* 562. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 1.
Fungus in caudicibus naſcens, unguis equini figura. *Baub. pin.* 372.
Fungus durus igniarius. *Park. theatr.* 1323. *Comm. holl.* 42.
Vonk-hout. Vulgo.
β. Agaricus igniarius, tuberis forma, ingens. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 1. *n.* 2.
Aan oude Eike-paalen en Boomen.

verſicolor. 1040. BOLETUS acaulis: faſciis diſcoloribus poris albis. *Sp.* 1645. *n.* 4. *Friſ.* 552.
Agaricus varii coloris ſquamoſus. *Tourn. inſt.* 562. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 1.

Fun-

Fungus ceraſorum imbricatim alter alteri innatus, variegatus. *Baub. pin.* 372. *Comm. boll.* 40.
Gekrulde Spaander Fungus. Belg.

β. Agaricus lichenis facie variegatus. *Tourn. inſt.* 562. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 5.
Fungus ſalignus lichenis forma variegatus. *Baub. pin.* 372. *Comm. boll.* 40.

γ. Agaricus foliaceus variegatus multiplex. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 15.
Aan oude Karſe, Wilge, en andere boomen, als mede aan rottige planken en paalen.

PHALLUS.

1041. PHALLUS pileo ovato celluloſo, ſtipite nudo rugoſo. *Sp.* 1648. *n.* 1. *Gelr.* 598. *eſculentus.*
Phallus petiolo nudo, pileo ſubtus undique annexo. *Linn. h. Cliff.* 379. *Gelr.* 599.
Boletus eſculentus rugoſus. *Mich. gen.* 203. *t.* 85. *f.* 2.
Merulius 1 – 5. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 13.
Fungus poroſus. *Baub. pin.* 370.
Oed. dan. t. 53.
Morillies. Vulgo.
In 't laatſt van April in de Zalker *- en* Herkeloer-waard, *en in andere Boſſchen, onder en aan de kanten van Heggen, voornaamlyk van Ype-boomen: ook wel op den Run, die men in de Hoven ſtrooit.*

1042. PHALLUS volvatus ſtipitatus, pileo celluloſo. *Sp.* 1648. *n.* 2. *Gelr.* 597. *impudicus.*
Phallus vulgaris totus albus, volva rotunda, pileo cellulato ac ſumma parte umbilico pervio ornato. *Mich. gen.* 201. *t.* 83.
Phallus hollandicus ſ. batavicus. *Dalech. hiſt.* 1398.
Fungus foetidus penis imaginem referens. *Baub. pin.* 374. *Comm. boll.* 41.
Oed. dan. t. 175.
In de Riet-landen by Haarlem *door* LINNÆUS; *in de Duinen en Zandige gronden by* Heemſtede *door* COMMELIN; *en in de Laanen by* Uilenpas *door my gevonden.*

CLATHRUS.

cancellatus. 1043. CLATHRUS acaulis ſubrotundus. *Sp.* 1648. *n.* 1.
Clathrus ruber. *Mich. gen.* 214. *t.* 93.
Boletus cancellatus purpureus. *Tourn. inſt.* 561. *t.* 329. *f.* 6.
Fungus rotundus cancellatus. *Baub. pin.* 375.
Aan den weg tuſſchen Amſterdam *en* Haarlem *in 't Riet gevonden* 1735 *door* LINNÆUS.

HELVELLA.

Mitra. 1044. HELVELLA pileo deflexo adnato lobato difformi. *Sp.* 1649. *n.* 1.
Fungus autumnalis velut apex ſtaminis. *Mentz. pug. t.* 6.
Fungoides fungiforme criſpum laciniatum & varie complicatum. *Mich. gen.* 204. *t.* 86. *f.* 7.
Oed. dan. t. 116.
Aan de boomen in 't Boſch te Meersbergen *in 't Sticht van* Utrecht.

PEZIZA.

lentifera. 1045. PEZIZA campanulata lentifera. *Sp.* 1649. *n.* 1. *Gelr.* 600. *Friſ.* 554.
Cyathoides cyathiforme cinereum & veluti ſericeum. *Mich. gen.* 222. *t.* 102. *f.* 1.
Fungoides infundibuli forma, ſemine foetum. *Tourn. inſt.* 560. *Vaill. par.* 56. *t.* 11. *f.* 6. 7. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 13.
Fungus minimus, ligneis tabellis areolarum hortorum adnaſcens. *Baub. pin.* 374.
Oed. dan. t. 105.
In de Boſſchen op takken en andere ſtukken houts; ook in de Hoven aan de kanten van oude broeibakken; en op de bedden met Run overdekt.

punctata. 1046. PEZIZA turbinata truncata, diſco punctato. *Sp.* 1650. *n.* 2. *Friſ.* 555.
Muſcus minimus lignoſus, diſco punctato. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 149. *t.* 107.
Oed. dan. t. 288.
In de Wei-landen op hoopjes oude Paarde- en Koe-meſt, in den Herfſt, dog niet veel.

1047. PE-

1047. PEZIZA cyathiformis: extus angulata venis ramoſis. *Sp.* 1650. *n.* 4. *Acetabulum.*
Fungi pezizæ plinii. *Col. ecphr.* 1. *p.* 385.
Fungoides angulatum, acetabuli forma. *Tourn. inſt.* 561. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 13. *n.* 2.
Fungoides fuſcum acetabuli forma, externe ramificatum, ſeu Fungoides maximum pyxidatum. *Vaill. par.* 57. *t.* 13. *f.* 1.
β. Fungi pezizæ altera ſpecies. *Col. ecphr.* 1. *p.* 337.
Fungoides criſpum, acetabuli forma. *Tourn. inſt.* 561. *Boerh. lugdb.* 1 *p.* 13. *n.* 3.
† *Volgens* BOERHAAVE.
Ab Ill HALLERO *hiſt.* 2223. *conjungitur cum Peziza cochleata.*

1048. PEZIZA plana: margine convexo piloſo. *Sp.* 1651. *n.* 7. *Friſ.* 556. *ſcutellata.*
Fungoides, qui fungus minimus ſcutellatus, coloris aurantii. *Vaill. par.* 57. *t.* 13. *f.* 13. 14.
In de Wei-landen, menigvuldig by een, op hoopjes oude Koe-meſt, in nat weder.

1049. PEZIZA concava rugoſa auriformis. *Syſt. edit.* 13. *p.* 823. *Auricula.*
Tremella *Auricula. Sp.* 1625. *n.* 3. *Gelr.* 669. *Belg.* 936. *Friſ.* 507.
Agaricum auriculæ forma. *Mich. gen.* 124. *t.* 66. *f.* 1.
Fungus membranaceus auriculam referens. *Bauh. pin.* 372. *Comm. holl.* 40.
Judas Ooren. Belg.
Aan de ſtammen van oude Vlier-en andere Boomen, in den voortyd.
Pharm. AURICULÆ JUDÆ.

C L A V A R I A.

1050. CLAVARIA ramoſa lignea nigra. *Sp.* 1652. *n.* 4. *digitata.*
Agaricus digitatus niger. *Tourn. inſt.* 562. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 11.
Hypoxylum, excrementum ligni putridi fungoſum digitatum. *Mentz. pug. t.* 6.
Aan oud verrot hout.
Sæpius eſt ſimpliciſſima. Jacq. vind. 196.

Hypoxylon 1051. CLAVRIA ramoſo - cornuta compreſſa. *Sp.* 1652. *n.* 5. *Friſ.* 557.
Fungus cornu dorcadis facie. *Eph. nat. cur. dec.* 1. *ann.* 4. *p.* 195.
BREYNIUS *Eph. l. c. ſcribit, hunc fungum anno* 1661. Amſtelodami *ex arboris pyri aut pruni trunco originem habuiſſe.* MEESE *in pago* Harkema opeinde *& prope* Franequeram *in arboribus vetuſtis putridis reperit. Ego in Belgio hucusque nullibi offendi.*

coralloides 1052. CLAVARIA ramis confertis ramoſiſſimis inæqualibus. *Sp.* 1652. *n.* 6. *Friſ.* 559.
Corallo - fungus flavus. *Vaill. par.* 41. *t.* 8. *f.* 4.
Coralloides flava & albida. *Tourn. inſt.* 564. *t.* 332. *f.* B.
Barba caprina. *Sterb. fung.* 96. 97. *t.* 11. *f.* D. C. B. A.
In de Wei - landen omtrent Hitzum *&c. in* Friesland *in October en November.*
MEESE *tres vel quatuor hujus varietates recenſet.*

L Y C O P E R D O N.

Tuber. 1053. LYCOPERDON globoſum ſolidum muricatum, radice deſtitutum. *Sp.* 1053. *n.* 1.
α. Lycoperdon ſubterraneum, ovato oblongum, glabrum, baſi & radice carens. *Gleditſch. fung.* 156.
Tubera ſubterranea, teſticulorum forma. *Mentz. pug. t.* 6. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15.
Tartuffels. Belg.
By 't Huis 't Velde *en de* Ehſe *in 't Graafſchap* Zutphen.

Boviſta. 1054. LYCOPERDON ſubrotundum: lacerato - dehiſcens. *Sp.* 1053. *n.* 3. *Gelr.* 601. *Friſ.* 560.
Lycoperdon vulgare. *Tourn. inſt.* 563. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 1.
Fungus rotundus orbicularis. *Bauh. pin.* 374. *Comm. holl.* 42.
Fungus pulverulentus, dictus Crepitus lupi. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 848.
Wolfs feeſt, Boviſt. Belg.
β. Fungus maximus rotundus pulverulentus, dictus ger-

germanis Boſiſt. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 848. *Comm. boll.* 42.

γ. Lycoperdon globoſum ſeſſile parvum & glabrum. *Gleditſch. fung.* 143.
Lycoperdon rotundum album. *Tourn. inſt.* 563.

δ. Lycoperdon ſphæricum, cortice tenaci caſtaneo. *Boerh. ludb.* 1. *p.* 15. *n.* 11.

ε. Lycoperdon minus & multiplex ſphæricum. *Tourn. inſt.* 563. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 2.

ζ. Lycoperdon minus & multiplex ovatum. *Tourn. inſt.* 563. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 3.

η. Lycoperdon ſemiorbiculare. *Tourn. inſt.* 563. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 5.
Fungus niger, culicis figuram referens. *Baub. pin.* 375. *Comm. boll.* 42.
Fungus ſemioribicularis. *Dod. pempt.* 485.

θ. Lycoperdon parvum, mortarii bellici forma. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 9.

ι. Lycoperdon oblongum, utrinque introrſum emarginatum. *Tourn. inſt.* 563. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 7.
Fungus Boletus fuſcus, baſi globoſa. *Bocc. muſ.* 1. *t.* 301. *f.* 4.

κ. Lycoperdon, qui fungus globoſus levis pallidus ducis poli & rom. *Bocc. muſ.* 1. *t.* 303. *f.* 3. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 8.

λ. Lycoperdon ingens conoides pileatum, plerumque gemellum. *Boerh. lugdb. p.* 15. *n.* 10.

α. & η. Op zandige gronden in Moes-boven en Wei-landen β. Aan de dyken van de Beemſter *en* Purmer *op klei-grond. γ. In de Alleën by* Harderwyk. *δ. De overige gelyk ook de voorige Varieteiten vindt men in* Friesland *op de* Kley *en in de* Wouden *in Wei-landen en Boſſchen.*

Pharm. Bovista ſ. Crepitus lupi.

Varietas β. quandoque eximiæ molis occurrit, ita ut quartam dolii zytopeptarum æquet. Cl. Bergius *(act. ſuec. vol.* XXIII. *p.* 324.*) reperit ineunte Septembri, in colle ex fimo putrido nato, ceterum tabaco plantando deſtinato, Lycoperdon, cujus peripheria major erat duarum ulnarum & trium digitorum, pondus* 18 *librarum; ad quam magnitudinem quinque aut ſex ad ſummum diebus creverat*

1055. Lycoperdon volva multifida patente, capitulo glabro: ore acuminato plicato. *Sp.* 1653. *n.* 15. *ſtellatum.*

Ge-

Geaſter major, umbilico fimbriato. *Mich. gen.* 120. *t.* 100. *f.* 1. 2. 3.
Oed. dan. t. 360.
In de Duinen van Holland, *dog zeldzaam.* (LINNÆUS.)

pedunculatum. 1056. LYCOPERDON ſtipite longo, capitulo globoſo glabro, ore cylindrico integerrimo. *Sp.* 1654. *n.* 8.
Lycoperdon pariſienſe minimum pediculo donatum. *Tourn. inſt.* 563. *t.* 331. *f.* E. F. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 6.
Overal in de Duinen. (LINNÆUS.)

varioloſum. 1057. LYCOPERDON paraſiticum ſeſſile ſubrotundum, cortice exteriore fulvo deciduo; farina atra compacta. *Syſt. edit.* 13. *p.* 824.
Sphæria *Lycoperdoides. Weigel. obſ. bot.* 47. *t.* 3. *f.* 2.
Lichenoides tuberculoſum compreſſum nigrum, lignis putridis adnaſcens. *Dill. muſc.* 127. *t.* 16. *f.* 7.
Aan het Paalwerk aan 't Strand tuſſchen Harlingen *en* Roptazyl, *en elders.*

Epidendrum. 1058. LYCOPERDON cortice farinaque purpurea. *Sp.* 1654. *n.* 9.
Lycoperdon ſanguineum ſphæricum. 1. *Buxb. cent.* 5. *p.* 15. *t.* 29. *f.* 2.
Boviſta miniata, piſi majoris magnitudine. *Dill. giſſ.* 197.
Aan houte ſchuttingen, en oude muuren.

MUCOR.

Embolus. 1059. MUCOR ſeta nigra, villo fuſco. *Sp.* 1655. *n.* 3.
Embolus nigerrimus villo albo adſperſus. *Hall. hiſt.* 2137. *t.* 48. *f.* 1.
Op verrot hout aan de lucht bloot geſtelt.

Mucedo. 1060. MUCOR ſtipitatus, capſula globoſa. *Sp.* 1655. *n.* 6. *Gelr.* 681. *Friſ.* 561.
Mucor vulgaris, capitulo lucido per maturitatem nigro, pediculo griſeo. *Mich. gen.* 215. *t.* 95. *f.* 1.

Oed.

Oed. dan. t. 467. *f.* 4.
Schimmel. Belg.
Op oud Brood en andere verrottende lichaamen.

1061. MUCOR ſtipitatus; capitulo ſubrotundo aggregato. *Sp.* 1756. *n.* 8. *Friſ.* 562. *glaucus.*
Aſpergillus capitatus, capitulo glauco, ſeminibus rotundis *Mich. gen.* 212. *t.* 91. *f.* 1.
Meeſt op Vrugten, die aan 't verrotten zyn.

1062. MUCOR ſtipitatus, ſpicis digitatis. *Sp.* 1656. *n.* 9. *Gelr.* 682. *Friſ.* 563. *cruſtaceus.*
Botrytis non ramoſa alba, ſeminibus rotundis. *Mich. gen.* 212. *t.* 91. *f.* 3.
Op bedorven ſpys.

1063. MUCOR albus capitulis fuſcis ſeſſilibus. *Sp.* 1656. *n.* 11. *Eryſiphe.*
Honing-daauw. Quibusdam.
Op de bladen van de Linde, Hop, doove Netelen, Eſch-doorn, &c.

1064. MUCOR unctuoſus flavus. *Sp.* 1656. *n.* 12.
Mucilago flava ramoſiſſima mollis. *Hall. helv.* 5. *Friſ.* 564.
Spongia fugax mollis flava & amoena in pulvere coriareo naſcens. *Marcb. act.* 1727. *p.* 472. *ſepticus.*
Op de Meſt in de broeibakken, en op vochtige planken-vloeren.
In primo exortu ramoſus, ſed ſenſim ramos deponit & ſpongioſam induit formam. (MEESE.)

OMIS-

OMISSÆ.

ciliata. 1065. MELICA flosculi inferioris petalo exteriore ciliato. *Sp.* 97. *n.* 1.
Gramen avenaceum montanum lanuginoſum. *Baub. pin.* 10. *prodr.* 20. *theatr.* 156.
In de Wei-landen by Haarlem. (D. OUKERKE.)
Inſerenda pag. 23. *ſupra n.* 80.

lanceolata. 1066. PLANTAGO foliis lanceolatis, ſpica ſubovata nuda, ſcapo angulato. *Sp.* 164. *n.* 6. *Gelr.* 79. *Friſ.* 67.
Plantago anguſtifolia major. *Baub. pin.* 189. *Comm. holl.* 89. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 259. *ſ.* 8. *t.* 15. *f.* 9.
Oed. dan. t. 437.
Honds-Ribbe, ſmalle of kleine Weegbree. Belg.
β. Plantago trinervia, folio anguſtiſſimo. *Baub. pin.* 189. *prodr.* 98. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 101.
By de voorige ſoorten.
Variat valde ſpicarum magnitudine.
Inſeratur pag. 42. *ſupra n.* 144.

piloſa. 1067. GENISTA foliis lanceolatis obtuſis, caule tuberculato decumbente. *Sp.* 999. *n.* 9.
Geniſta ramoſa, foliis hyperici. *Baub. pin.* 395.
Chamæ-Geniſta prima. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 103.
Op 't Veld by de Pypery *tuſſchen den Huize* 't Velde *en* Geeſſink *buiten* Zutphen.
Floret menſe Majo.
Inſerenda. p. 189. *Supra. n.* 593.

PLAN-

Digitized by Google

PLANTÆ INDIGENÆ

QUÆ

IN LINNÆI SPECIEBUS PLANTARUM & SYSTEMATE NON OCCURRUNT.

1068. GRAMEN paniceum, ſpicis nigris. *Baub. pin.* 8. *Comm boll.* 55. *Dill. giſſ.* 157.
Graminis dentis canini ſpica divulſa tenuior nigra ſpecies. *Baub. biſt.* 2. *p.* 491.
Panik-gras. Belg.
In de Hoven en Moes-boven en andere bebouwde gronden.
Ill. HALLERUS *flor. jen.* 304. *fatetur plantam ſibi ignotam eſſe.*

1069. GRAMEN Alopecuros major, ſpica longiore. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 58. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 158. *n.* 8.
Alopecuros major maritima repens, ſpica longiore. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 191.
† *Volgens* BOERHAAVE.
D. GERARDUS *in Flora Gallo-prov.* 108. *Gramen boc ad Lagurum cylindricum refert.*

1070. GRAMEN loliaceum ſupinum *Baub. pin.* 7. *theatr.* 130. *Comm. boll.* 54. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 157. *n.* 3.
Gramen phalaroides exile ſupinum humi ſparſum danicum lobelii. *Baub. biſt.* 2. *p.* 468.
Gramen loliaceum ſupinum minus locuſtis turgi-

dioribus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 182.
By de afzanding aan het Kraaijeneſt by Heemſtede, *en in de* Haarlemmer - hout.

1071. Gramen loliaceum minus vlielandicum. *Comm. holl.* 53. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 157.
Op Vlieland *in het groene Plein.*

1072. Gramen caninum maritimum, ſpica foliacea. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 15. *Comm. holl.* 46. *Hill. angl.* 64.
Gramen longius radicatum marinum alterum. *Lob.*
Gramen longius radicatum marinum, utriculos pro ſpica gerens. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 1.
Ander klein Duin - lid - gras van Lobel. Belg.
Commelinus *radices hujus Graminis ſaporem & odorem habere aromaticum dicit, ſed locum nativum non addit.*

1073. Cruciata anguſtifolia, floſculo luteo verticillato. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 149.
Rubeola repens lutea, foliis ſpinoſis. *Baub. pin.* 334.
Rubia minima lobelii. *Dalech. hiſt.* 1330.
† *Volgens* Boerhaave.
Rogavi Ill. Linnæum *in litteris* 10 *Martii* 1762. *ad Eum datis, quonam retulerit hanc plantam, & respondit his verbis.* „ *Scias eam plantam a* „ *me nullibi viſam eſſe, & adeo raram eſſe in ip-* „ *ſa Anglia, ubi Lobelius eam reperit, ut dubi-* „ *taſſet Rajus eam dari in rerum natura, niſi* „ *nominata eſſet in H. R. P. ſed nullus Anglo-* „ *rum ab eo tempore, quo Lobelius eam detexit,* „ *hanc vidit; adeoque nec habetur in Raji Sy-* „ *nopſi, nec in Moriſoni hiſtoria, nec in Pluke-* „ *netii Operibus, nec viſa Tournefortio, nec aliis.* „ *Miror ubinam in Belgio habitet tam rara a* „ Boerhavio *lecta † notata indigena planta:* „ *ſi vidiſti & habeas, quaſo millies, des mihi* „ *vel minutiſſimum ramulum; forte ſub alia idea* „ *tanquam nota recentioribus innotuerit? Mihi* „ *certe valde paradoxa eſt Lobelii figura, quam* „ *Dalechampius aſſumſit; nec capio dari folia* „ *cordata inter omnes verticillatas.*

1074 Ana-

Digitized by Google

1074. ANAGALLIS ruthæ foliis diſſectis. *Bruman. Zwoll.* 4.
Omtrent Zwol.

1075. ALSINE maritima, flore rubente. *Baub. pin.* 251. *Comm. holl.* 7.
Alſine maritima neapolitana. *Col. ecphr.*
By Enckhuiſen *aan de kant van de Zuider-Zee. Is eerſt door den Heer* JACOB BRAYNE *aldaar gevonden.* (COMM.)
Achter 's Gravezande *op den* Haack *en 't* Nieuwland. (*Cel.* SCHWENCKE.)
Ego ante triginta circiter annos ſæpius maris littus prope urbem meam patriam Encbuſam plantas legendi cauſa calcavi, ſed banc plantam non offendi, niſi forſan fuerit Arenariæ rubræ varietas.

1076. ALSINE major. *Baub. pin.* 250. *Comm. holl.* 6.
Zee-Muur. Belg.
Veel by Zandvoort, *en aan den* Muiderberg.
Planta etiamnum mibi dubia; retuli eam in Flora Belgica 376. *auctoritate Ill.* LINNÆI *ad* Cerastium aquaticum. *Sed in manuſcripto poſtbumo* D. TIMMER *Chirurgi, dum vivebat, apud Alkmarienſes dexterrimi, ſimulque egregii Botanophili, qui eam Texellis et circa Inſulam de Helder in Dunis copioſe legit, notatum invenio, plantam eſſe ſuper terra ſe diſpergentem, foliis gaudentem craſſiuſculis, & cujus pericarpium eſt capſula bujus magnitudinis* O. *Ipſe quoque Cl* COMMELINUS *monet figuras Dodonæi, Tabernæmontani & Lobelii malas eſſe, easque ſeduxiſſe C. Baubinum, quum bæc ſit planta bumilis, terræ incumbens, quæ pro Alſine majori baberi nequit.*

1077. SALIX latifolia repens. *Baub. pin.* 474. *Comm. holl.* 102.
Salix pumila latifola 2. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 85.
Breede Duin-Wilg. Belg.
In de Duin-Valeyen overvloedig.

1078. MUSCUS denticulatus major. *Baub. pin.* 360. *Comm. holl.* 77. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 50.
Muscus terreſtris denticulatus. *Lob. ic.* 2. *p.* 244.

Kleine Aard-Mos. Belg.
Op vochtige Zand-gronden buiten Haarlem.
Quo ad nomina hic Muſcus eſt Lycopodium helveticum. *Sp.* 1568. *n.* 18. *quod habitat in Alpibus Helvetiæ & Carniolæ, nec extra eas hucusque lectum; adeoque* COMMELINUS & BOERHAAVIUS *aliam Muſci ſpeciem, forſan Hypni, hoc nomine intellexerunt.*

1079. MUSCUS denticulatus minor. *Bauh. pin.* 360. *Comm. boll.* 77. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 51.
Muſcus terreſtris denticulatus alter. *Lob. ic.* 2. *p.* 244.
By de voorgaande, en buiten Utrecht.
Quo ad nomina hic Muſcus eſt Lycopodium denticulatum. *Sp.* 1569. *n.* 24. *quod autem extra Luſitaniam, Hiſpaniam & Iberiam hucusque non lectum.*

1080. MUSCUS ſaxatilis ſquamoſus dentatus, capitulis adianthi. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 46.
DILLENIUS *ſuſpicatur ſuum eſſe* Hypnum flagellare ſaxatile, capſulis gracilibus. *Dill. muſc.* 306. *t.* 39. *f.* 42.

1081. LICHEN-AGARICUS ceſpitoſus acaulis nigricans, ſub cute anagyridis non foetidæ erumpens. *Mich. gen.* 105. *t.* 54. *f.* 5. *Meeſe. friſ.* 477.
Op de ſtammen van zwaare Eſſen-boomen in Friesland.

1082. LICHEN pulmonarius membraceus gelatinoſus pullus, in ſegmenta latiora diviſus, receptaculis florum exiguis obſcure rubris numeroſiſſimis. *Mich. gen.* 87. *Hall. helv.* 80. *Meeſ. friſ.* 492.
Lichen gelatinoſus membranaceus exaſperatus convolutus atroviridis, ſcutellis rubris. *Hall. hiſt.* 2037.
Lichenoides gelatinoſum membranaceum tenue nigricans. *Dill. muſc.* 138. *t.* 19. *f.* 20.
Op de baſt van Ypen-boomen te Hytzum *in* Friesland.
Pertinet ad Lichenes membranaceos.

1083. FUN-

Digitized by Google

1083. Fungus aureus, cruſtæ inſtar cortici quercino raſo innaſcens. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 26.

1084. Agaricus, qui Fungulus hyemalis, pileolo albo, lamellis flavis. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 15.

1085. Agaricus, qui fungus parvus, pediculo oblongo firmo lento, pileolo in medio faſtigiato, ſtriis exterius apparentibus. *Raj. ſyn.* 13. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 21.
In de Weiden in September.

1086 Agaricus, qui Fungorum eſculentorum genus VI. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 266. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 23.

1087. Fungus perniciosſus 44 ex uno pede producens. *Comm. boll.* 42. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 24.
Aan de voet van oude Appel-boomen in October.

1088. Fungus parvus, pediculo oblongo, pileolo hemiſphærico, ex albido ſubluteus. *Raj. ſyn.* 13. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 18.
In de Weiden op Koe- en Paarde-Meſt.

1089. Agaricus pileo papillari ampliſſimo, in margine fornicato lacero & filamentoſo, petiolo annulato procero, inferius tumido, pilei acetabulo inſerto. *Gleditſcb. fung.* 114.
Agaricus pediculo annulato, pileo & pediculo variegatis. *Guettard. ſtamp.* 23. *Dalib. par.* 378.
Fungus pileolo lato longiſſimo, pediculo variegato. *Baub. pin.* 371. *Comm. boll.* 40. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 11. *n.* 6.
Fungus coronatus aut marmoreus. *Sterb. fung.* 77. *t.* 7. A.
Fungi longiſſimo pediculo candicantes, ſed maculati, eſculenti. *Baub. biſt.* 3. *p.* 826.
Op zandige gronden in de Haarlemmer-hout.

1090. Amanita tener conicus lacer cervinus, lamellis nigris. *Hall. biſt.* 2485.
Fungus clypeiformis major. *Baub. pin.* 373. *Comm. boll.* 41. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 11.

Fungi multi ex uno pede, clypeiformes lutei & rubri. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 835.
Aan nat verrot hout.

1091. Fungus albus pileolo inverſo. *Tourn. inſt.* 559. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 12.
Fungus albus pileolo inverſo ſimilis. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 847. *Comm. boll.* 42.
Op 't bobbelige veld buiten Haarlem *in October.*

1092. Fungus arboreus clypeum referens ingens foetidiſſimus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 20.

1093. Fungi buxei faſciculoſi. *Sterb. fung. t.* 25. E. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 19.

1094. Fungus pallidus marmoreus. *Sterb. fung. t.* 8. F. F. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 17.

1095. Fungus, qui ſemi-fungus pallidus. *Sterb. fung. t.* 8. E. E. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 16.

1096. Fungus ſemicircularis durus meretti. *Comm. boll.* 42.
Aan oude Peer- en andere Boomen.

1097. Fungus lapis bufonis dictus. *Sterb. fung. t.* 23. F. F. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 22.

1098. Agarico-Fungus ſuperne villoſus longus & anguſtus. *Hall. helv.* 57. *Meeſ. friſ.* 550.
Op verſcheide plaatſen in de Boomgaarden uit ſtammen van boomen, die aan 't verguan zyn.

1099. Agaricus ingens aureus, odore vinoſo, ſapore acido. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 8.

1100. Agaricus, qui fungus flammeus, variæ figuræ. *Sterb. fung. t.* 13. A. B. C. D. & *t.* 14. E. F. G. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 10.

1101. Agaricus flammeus ſemiorbicularis hypocrateriformis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 7.

1102. Polyporus ſeſſilis carnoſus flavus digitatus ma-

Digitized by Google

maximus. *Hall. hiſt.* 2277.
Fungus caſearius ex campenhout. *Sterb. fung.* 170. *t.* 12. A. *Comm. boll.* 40.
Aan oude Ypen-boomen, buiten Hoorn, *te* Amſterdam, *en elders.*

1103. Agaricus niger parvus, cornua damæ referens. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 14.

1104. Agaricus falſus. *Sterb. fung. t.* 27. D. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 9.

1105. Agaricus fraxineus niger durus orbiculatus. *Tourn. inſt.* 562. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 12. *Hall. jen.* 373.
Fungus fraxineus niger durus orbiculatus. *Raj. ſyn.* 18. *hiſt.* 109.
Aan de Eſſen-boomen.

1106. Fungoidaster minimus diſcoides albus, ſemine ovato donatus, foliis vel lignis ſemiputridis innaſcens. *Mich. gen.* 201. *t.* 82. *f.* 3. *Meeſ. friſ.* 553.
Op de baſt van een boomachtige Aloë-plant gevonden.

1107. Fungus pezicæ minoris ſanguin. breynii. *Comm. boll.* 41.
Buiten Naarden *in vochtige zandige gronden.*

1108. Peziza cava albida, intus coccinea. *Hall. hiſt.* 2222.
Elvela orbicularis ſeſſilis excavata, intus coccinea, tota glabra. *Gleditſch. fung.* 49.
Fungus putridis arborum ramis inhærens, plurimis ſimul cohærentibus. *Baub. pin.* 372. *Comm. boll.* 41.
Fungi pernicioſi generis XXIV. *ſpec.* 2. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 28.
Parva concha marina, colore coccineo. *Sterb. fung.* 242. *t.* 26. D.
Aan verrotte afgekapte boomen, en op natte gronden.

1109. Peziza menbranacea tubæ ſimilis, marginibus erectis laceris. *Hall. hiſt.* 2217.

Elvela petiolata tubuloſa, margine inæquali lacero & multifido. *Gleditſch. fung.* 40.
Agaricus tubæ fallopianæ inſtar laciniatus. *Tourn. inſt.* 562. *Buxb. cent.* 5. *p.* 3. *t.* 3. *f.* 2. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 13.
Aan oude verrotte ſtammen van Boomen in de Boſſchen.

1110. Agaricum nigrum reticulatum compreſſum, emortuis arboribus inter corticem & lignum, interdum in ipſo ligno innaſcens, ac late ſe diffundens. *Mich. gen.* 125. *t.* 66. *f.* 3. *Meeſ. friſ.* 558.
Menigvuldig in verrot hout tuſſchen de baſt en 't hout.

1111. Lycogala griſeum majus. *Mich. gen.* 216. *t.* 95. *f.* 1. *Meeſ. friſ.* 565.
Somtyds aan oude Eike-en andere paalen, onder bruggen, en aan ſcheeyingen.

PLAN-

PLANTÆ CULINARES, OFFICINALES, ALIÆQUE CULTÆ, IN FLORA BELGICA RECENSITÆ, IN HAC OMISSÆ.

*Numeri præpoſiti indicant numeros Floræ Belgicæ.

---

25. Rosmarinus officinalis.
26. Salvia officinalis.
32. Valeriana Phu.
49. Phalaris canarienſis.
87. Avena ſativa.
98. Secale cereale.
99. Hordeum vulgare.
101. Triticum æſtivum.
102. ——— hybernum.
118. Rubia tinctorum.
127. Cornus mas.
184. Nicotiana Tabacum.
186. Solanum tuberoſum.
195. Vitis vinifera.
211. Beta vulgaris.
241. Sium Siſarum.
247. Coriandrum ſativum.
255. Anethum graveolens.
256. ——— Foeniculum.
259. Pimpinella Aniſum.
260. Apium Petroſelinum.
277. Allium Porrum.
278. ——— ſativum.
282. ——— Cepa.
284. ——— Schoenopraſum.
285. ——— aſcalonicum.
339. Polygonum Fagopyrum.
342. Ruta graveolens.
380. Aſarum europæum.
381. Portulaca oleracea.
399. Prunus Ceraſus.
405. Mespilus germanica.
408. Pyrus Cydonia.
414. Roſa centifolia.
415. —— gallica.
462. Teucrium Chamæpitys.
466. Satureja hortenſis.
482. Betonica officinalis.
492. Thymus vulgaris.
494. Meliſſa officinalis.
520. Lepidium ſativum.
552. Braſſica Napus.
554. ——— oleracea.
557. Sinapis alba.
558. ——— nigra.
559. Raphanus ſativus.
581. Phaſeolus vulgaris.
582. Piſum ſativum.
589. Vicia Faba.
592. Trifolium Melilotus cærulea.
613. Scorzonera hiſpanica.
617. Lactuca ſativia.
633. Cichorium Endivia.
647. Cynara Scolymus.
657. Artemiſia Dracunculus.
674. Inula Helenium.
697. Calendula officinalis.
750. Morus nigra.
751. ——— alba.
760. Juglans regia.
761. Fagus Caſtanea.
765. Pinus Abies.
766. Momordica Elaterium.
767. Cucumis ſativus.
786. Spinacia oleracea.
787. Cannabis ſativa.
795. Juniperus Sabina.
798. Taxus baccata.
802. Atriplex hortenſis.
807. Acer Pſeudo - Platanus.

ZOO-

Digitized by Google

ZOOPHYTA INDIGENA.

A. SPONGIA panicea. *Pall. zooph.* 235.
Spongia medullam panis referens. *Elliſ. cor.* 80. *n.* 2. *t.* 16. *f. d.* D. *Meeſ. friſ.* 538.
Aan 't Zee-ſtrand van Friesland.

B. SPONGIA capillaris tubuloſa ſimplex miro modo implicata criſpa ferruginea. *Meeſ. friſ.* 539.
By de voorige.

C. SPONGIA lacuſtris. *Linn. Syſt. edit. XII. p.* 1299. *n.* 15.
Te Catwyk *in 't malle gat.* (MEERBURCH.)

D. SPONGIA fluviatilis. *Linn. Syſt.* 1299. *n.* 16. *Pall zooph.* 231.
Badiaga minor. *Buxb. act. petrop.* 2. *p.* 344. *Cent.* 5. *p.* 12. *t.* 23. *f.* 2.
Veel aan de oude paalen van de Niewſtads-brug te Zutphen, *en in den* Ouden-Yſſel *by* Doesborg. (NOS.) *Aan de paalen in een Vyver van een Tuin buiten* Rotterdam (*Rev.* D. NOZEMAN.)
Spongia hæc, quam mihi miſit amiciſſimus D. NOZEMAN, *non erat ramoſa: videtur fluxu perpetuo fluenti, in quo creſcit, ramos ſive cornua acquirere, quæ in aqua ſtagnante non generantur. Semina, quæ Spongiæ fluviatili tribuunt* RUPPIUS & BUXBAUMIUS, *etiam in noſtra recenti reperta ſuut a* D^no^ NOZEMAN, *qui in litteris ad me* 4. *Octob.* 1771. *datis, contra Lib. Bar.* MUNCKHAUSEN (*Linn. amæn. acad. vol. VII. p.* 398.) *ſcribit, illa ſemina nequaquam animalcula produxiſſe; atque etiam Auctor Commentariorum de reb. in ſcient. nat. & med. geſtis, ſtatuit Spongiam fluviatilem ad vegetabilem adhuc naturam accedere. Conf. Epiſt. erud. ad Hall. Vol.* 1. *p.* 52. *ubi male* Badaja *legitur. De ejus uſu apud Ruſſos vide Flor. Ingr. p.* 178.

E. FLUSTRA foliacea. *Linn. Syſt.* 1300. *n.* 1.
Eſchara foliacea. *Pall. zooph.* 16.
Porus cervinus imperati. *Bauh. pin.* 367. *Comm. holl.* 92.
Alga marina platyceros poroſa. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 809.
Op Vlieland *aan de Zeekant.*

F. FLUS-

F. FLUSTRA piloſa. *Linn. Syſt.* 1301. *n.* 3.
Eſchara piloſa. *Pall. zooph.* 15.
Zee-Mos. Belg.
Veel in de Noord-Zee *omtrent* Scheveningen.

G. ESCHARA cruſtulenta. *Pall. zooph.* 8.
Eſchara lapideſcens. *Baſter. opuſc.* I. *l.* 2. *p.* 83. *t.* 7. *f.* 4. 5.
Menigvuldig in 't Eyland Schouwen *in Slooten van brak- of zout-water.*

H. TUBULARIA indiviſa. *Linn. Syſt.* 1301. *n.* 1.
Tubularia calamaris. *Pall. zooph.* 38.
Te Scheveningen *aan 't ſtrand.*

I. TUBULARIA ramoſa. *Linn. Syſt.* 1302. *n.* 2.
Tubularia trichoides. *Pall. zooph.* 41.
By Noordwyk *op 't ſtrand.*

K. TUBULARIA fiſtuloſa. *Linn. Syſt.* 1302. *n.* 3.
Cellularia Salicornia. *Pall. zooph.* 21.
Corallina fiſtuloſa fragilis prima. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 811. *Comm. holl.* 29.
By Zandvoort *op 't ſtrand, alwaar door de Zee word opgeworpen.*

L. TUBULARIA muſcoides. *Linn. Syſt.* 1302. *n.* 5. *Pall. zooph.* 39.
Aan 't Zee-ſtrand van 't Eyland Walcheren.
(L. BOMME *Verband. van 't Zeeuwſch Genootſchap.* 2de *deel. p.* 281.)

M. SERTULARIA pumila. *Linn. Syſt.* 1306. *n.* 2. *Pall. zooph.* 79.
Aan de Noord-Zee *omtrent* Zandvoort *op de* Fucus ericoides.

N. SERTULARIA operculata. *Linn. Syſt.* 1307. *n.* 3.
Sertularia uſneoides. *Pall. zooph.* 80.
Zee-Hair. Belg.
Te Catwyk *en* Scheveningen.

O. SERTULARIA abietina. *Linn. Syſt.* 1307. *n.* 5. *Pall. zooph.* 81.
Abies marina belgica. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 35. *Comm. hol.* 3.
Abieti ſimilis maritima. *Baub. pin.* 305.

Digitized by Google

Zee-Denne-boom. Belg.
Aan 't Zee-Strand van 't Eyland Wieringen, *de* Helder, Texel, *op Hoorns en Moſſel-ſchulpen.*

P. Sertularia cupreſſina. *Linn. Syſt.* 1308. *n.* 6. *Pall, zooph.* 89. *Meeſ. friſ.* 535.
Cupreſſus marina belgica Cluſii & I. Bauh. *Comm. holl.* 30.
Zee-Cypres. Belg.
β. Sertularia argentea. *Linn. Syſt. edit. X. p.* 809. *n.* 7.
Op Hoorntjes en Schulpen omtrent 't Eyland Wieringen; *ook aan de* Frieſche *kuſten.* β. *Te* Catwyk *aan 't Strand.*

Q. Sertularia Thuja. *Linn. Syſt.* 1308. *n.* 9. *Pall. zooph.* 88.
In Zeeland. (Pallas.)

R. Sertularia Myriophyllum. *Linn. Syſt.* 1309. *n.* 10. *Pall. zooph.* 96.
Te Zandvoort *aan een ſtuk Kryt.*

S. Sertularia falcata. *Linn. Syſt.* 1309. *n.* 11. *Pall. zooph.* 90. *Meeſ. friſ.* 536.
Aan de Frieſche *kuſten.*

T. Sertularia Pluma. *Linn. Syſt.* 1309. *n.* 12. *Pall. zooph.* 93.
Te Harderwyk *aan 't Strand op de* Fucus ſiliquoſus.

V. Sertularia antennina. *Linn. Syſt.* 1310. *n.* 14. *Pall. zooph.* 91.
Zee-baard. Belg.
Te Catwyk *aan Schulpen en ſtukken Kryt.*

W. Sertularia dichotoma. *Linn. Syſt.* 1312. *n.* 22. *Meeſ. friſ.* 537.
Sertularia longiſſima. *Pall. zooph.* 69.
Zee-draad. Belg.
Aan de Zee-ſtranden van Frieſland.

X. Sertularia ſpinoſa. *Linn. Syſt.* 1312. *n.* 23.
Sertularia ſericea. *Pall. zooph.* 65.
Te Catwyk *aan 't Strand.*

Y. Sertularia Lichenaſtrum. *Linn. Syſt.* 1313. *n.* 27. *Pall. zooph.* 85.

Digitized by Google

Te Catwyk *aan de* Fucus nodoſus.

Z. SERTULARIA eburnea. *Linn. Syſt.* 1316. *n.* 39.
Cellularia eburnea. *Pall. zoopb.* 33.
Aan de Nood-Zee *omtrent* Zandvoort *op een ſtuk Kryt.*
Omnia bæc Zoopbyta ad littora Oceani Hollandiam alluentis obvia mecum communicavit induſtrius Hortulanus MEERBURGH, *qui eadem primo vere et ſero autumno, præcipue poſt tempeſtatem duorum triumve dierum, non ſine magni frigoris tolerantia, ex magnis acervis Fucorum in littora rejectis extricavit.*

* * * * *

A. a. OSTEOCOLLA officinarum. *Comm. boll.* 84.
Been-breuk. Belg.
In de Dunen van Heemſtede; *en veel te* Rakagne.
Non eſt planta lapidoſa, ut Cl. COMMELINUS *ſcribit, ſed Topbus calcareus cylindricus perforatus. Linn. amæn.* 3. *p.* 151.

B. b. PILA marina velut ex ampullis conſtans ad ſpumæ ſimilitudinem. *Baub. pin.* 368. *Comm. boll.* 87.
Zee-Ballen. Belg.
Word aan de Zee-ſtranden van Holland *opgeworpen.*
Non eſt Vegetabile, ſed concrementum perpetuo fluxu maris ex tuberibus radicum Zoſteræ (744. 745.) *in fibroſas & ſtuppoſas pilas maceratione reſolutas, aliisque rebus cum ſpuma maris ita compactum. Vid. Raj. biſt.* 83. *Scbrock. Epb. N. C. Dec.* 11. *ann.* 1. *obſ. XIV. Pbarm. Wirtemb.* 17. *Pall. Zoopb.* 342.

. USTILAGO Secales. *Baub. pin.* 24. *Comm. boll.* 117.
Uſtilago. *Dod. pempt.* 542.
Brand-koorn. Belg.
. Uſtilago Hordei. *Baub. pin.* 24. *Comm. boll.* 117.
γ. Uſtilago Avenacea omniumque Avenæ ſpecierum. *Baub. pin.*

Digitized by Google

pin. 24. *Comm. holl.* 117.

δ. Uſtilago Tritici, omniumque hujus ſpecierum.

ε. Uſtilago Poæ aquaticæ. 81.

ζ. Uſtilago Feſtucæ fluitantis. 100.

η. Uſtilago Lolii perennis. 120.

θ. Uſtilago Airæ ceſpitoſæ. 75.

ι. Uſtilago Holci lanati. 828.

κ. Uſtilago Caricis arenariæ. 760.

Aan de Koorn- en Gras-gewaſſen.

Uſtilago morbus eſt Plantarum, cujus tres occurrunt Species. 1 *Spica ſive Panicula convertitur in pulverem nigrum ſubtiliſſimum, cui malo obnoxia ſunt* Triticum, Hordeum, Avena, Holcus, Carex. 2° *Granum ſeu ſemen in longum excreſcit, inſtar calcaris galli, hinc Cornutum ſive Clavus dictum, uti in* Secali, Feſtuca, Lolio, Aira. 3° *Fructificatio eſt ſana, ſed ceterum tota planta tegitur pulvere nigro, inſtar fuliginis ſubtiliſſimæ, uti in* Poa aquatica. *Interdum quoque tota planta Uſtilagine inficitur, ita ut ne unicam proferat fructificationem, ſicuti in* Tritico junceo *prope Scheveningam ſæpius videre eſt. Aquâ tepidâ hic pulvis aliquot dies maceratus, oculo armato conſpicienda præbet corpuſcula vermiformia, hyalina, anguillularum inſtar natantia, ſimili fere modo, ut in liquoribus aquoſis mixtis Pipere, inque aliis infuſis videmus; quæ an vera ſint animalcula animata, diſputant recentiores Obſervatores. Vide Cl.* Houttuyn *Natuurl. Hiſtorie. I. Deels 18de ſtuk. bladz.* 201. *ſqq.*

ADDENDA & EMENDANDA.

p. 3. *ſub* l. 24. *inſere. Stevens-kruid.* Belg.
p. 7. l. 34. *adde.* in 't *Leeſtenſche broeck.*
p. 8. l. 3. *adde. Neeten-kruid.*
p. 11. l. 3. *in margine lege. Pſeudacorus.*
ib. l. 20. *in margine lege. foetidiſſima.*
ib. l. *ult. in margine lege. nigricans.*
p. 13. l. 24. *lege.* Chamæſchoenus.
p. 15. l. 34. *in margine lege. polyſtachion.*
ib. l. 37. *lege.* 562.
p. 16. l. 1. *adde. Catoen-bloem.*
p. 23. *ſub* l. 6. *inſere. Bund-gras.* Ruſticis.
p. 30. l. 22. *in margine lege. loeflingiana*
p. 31. *ſub* l. 16. *inſere. Gebaarde Evene.* Belg.
p. 33. l. 32. *lege.* duplici verſu denſe diſpoſitis conſtante. *Scheuch. gram. t.* 2.
p. 35. l. 6. *adde. Obſtant etiam icones Auctorum. Cl.* GERARD (*fl. Gallopr.* 91.) & GOUAN (*fl. Monſpel.* 470.) *pro ſpecie Airæ habent.*
p. 37. l. 11. *in margine adde. fontana.*
ib. ſub l. 36. *inſere. Wilde Cornoellie.* Belg.
p. 45. l. 27. *lege. Te* Nede, Roderloo, *en elders in 't Graafſchap* Zutphen, *ook op verſcheide enz.*
p. 49. l. 13. *adde. Vergeet my niet.*
p. 55. l. 4. *lege. Hierden.*
p. 56. l. 6. *lege.* SCHWENCKE.
p. 62. l. 9 *lege.* Nonnullis
p. 63. l. 18. *Doorn-beziën. lege. Duin-beziën.*
p. 78. l. 26. *lege. pabulum.*
ib. l. 37. *lege.* Cuilenburg.
p. 80. l. 26. *lege. boll.* 25.
p. 89. l. 12. *adde. ook in den* Aardenhout *by* Haarlem. (D. OUKERKE.)
p. 107. l. 13. *adde. Honds-beziën, Beeren-bezien. Perperam hæc planta habetur pro* Uva Urſi *officinarum.*
p. 121. l. 16. *lege. Woud-kruid.*
p. 124. *ſub* l. 9. *inſere Jenettekens, wilde Chriſtus-Oogen.* Belg.
p. 131. l. 5. *adde. In de Weiden tuſſchen de* Bronsbergen *en den* Ysſel *by* Zutphen.
p. 136. l. 11. *lege. by* Zutphen *en* Harderwyk;

p. 145.

p. 145. l. 17. *lege. epit.* 392.
ib. l. 19. *adde. Keukenſchelle*,
p. 146. l. 20. *lege.* Bronkhorſt *en* Gorſſel.
p. 155 l. 2. *lege.* Aardenhout.
p. 156. l. 28. *lege. Glid-kruid, Jooden-kruid.* Belg.
p. 164. l. 26. *lege. Bruinelle.*
p. 166. l. 22. *lege. Hengel.*
p. 174. l. 22. *lege. bet* Y; *ook buiten*
p. 190. l. 29. *adde. by* Rualten *en* Boxbergen *in* Overysſel.
p. 207. *ſub* l. 31. *inſere. Zwynen-Sala.* Belg.
p. 217. l. 9. *lege. inungunt.*
p. 221. l. 23. *lege. Innekley.*
p. 225. l. 13. *adde. Indig.*
p. 234. l. 17. *adde. Zots-kullekens* of *Zots-kapjes-wyfje.*
ib. ſub l. 39. *inſere. Zots-kullekens-manneke.*
p. 239. l. 36. *lege. Sarraſyns-kruid.*
p. 244. l. *penult. adde. Water-knodſen.*
p. 246. l. 37. *lege. Sp.* 1381. *n.* 6.
p. 258. *ſub* l. 19. *inſere.* Gallæ *Dwerg-appels* Gelris.
ib. l. 28. *lege.* CORYLUS.
p. 263. *l.* 27. *adde. in 't* Leeſtenſche-broek *by* Zutphen.
p. 269. l. *penult. lege. vino.*
p. 277. l. 2. *adde. Natertongen*,
p. 278. l. 38. *adde. in de Put by de Provooſt militair te* Zutphen.
p. 281. l. 6. *lege.* anfractuoſum.
ib. l. 22. *lege. ventum*
p. 295. l. 4. &. 5. *dele. Boerh.* 151.
p. 298. l. 12. *lege.* remotis.
p. 301. l. 34. *lege Suſpicor*
p. 303. l. 24. *lege. detexit.*
p. 311. l. 5. *lege. Veel op dorre Hei-gronden.*
p. 313. l. 39. *in margine lege. plicatus.*
p. 316. l. 14. *adde. Martinet Katech. der Natuur. III. deel. pl.* 5.
p. 320. l. 1. *lege.* CLAVARIA.
p. 331. l. 40. *lege. tabaco*
p. 333. l. 22. *in margine. ſepticus. pone poſt* l. 19. *in margine.*

I N-

Digitized by Google

INDEX
GENERUM
&
SYNONYMORUM.

A.

Abrotanum 668.
Abſinthium. 669. 670. 672.
Acanthium. 661. 662.
Acer. 837. 838.
Acetoſa. 327. 328.
Acetoſella. 328. 391.
Achillæa. 707.
Achillea. 706. 707.
Acinos. 508.
Acorum. 306.
Acorus. 306.
Acorus. 32.
Adianthum. 852. 867.
Adonis. 462.
Ægopodium. 276.
Æſculus. 333.
Æthuſa. 264.
Agarico-Fungus. 1098.
Agaricum. 1049. 1110.
Agaricus. 1026-1038. 1103-1105.
Agaricus. 1050. 1084-1086. 1089. 1099-1101. 1103-1109.
Agrimonia. 404.
Agroſtemma. 393.
Agroſtis. 67-72.
Aira. 73-79.
Aira. 91.
Ajuga. 478.
Alchemilla. 151.
Alchimilla. 151.
Alga. 745. 992. 1000. 1003. 1008-1010.
Algoides. 746.
Aliſma. 331. 332.
Alliaria. 560.
Allium. 293-295.
Alnus. 210. 786.
Aloe. 454.
Aloides. 454.
Alopecuros. 45. 1069.
Alopecurus. 62-65.
Alſine. 281.
Alſine. 3. 4. 16-19. 146. 149. 166. 167. 200. 217. 286. 319. 371. 377. 380-385. 396-401. 529. 1075. 1076.
Althæa. 583.
Alyſſon. 534.
Amanita. 1090.
Amaranthus. 791.
Ambroſia. 544.
Amellus. 679.
Anacampſeros. 386.
Anagallis. 188. 189.
Anagallis. 11-13. 146. 186. 200. 1074.
Anchuſa. 171.
Andromeda. 360.
Androſæmum. 626.
Anemone. 455-457.
Angelica. 257.
Angelica. 276.
Anonis. 596.
Anſerina. 435.

An-

Digitized by Google

Anthemis. 702 - 705.
Anthericum. 300.
Anthoceros. 942.
Anthoxanthum. 28.
Antbriſcus. 246. 267.
Anthyllis. 597.
Antbyllis. 234. 381.
Antirrhinum. 521 - 525.
Aparine. 141.
Aphaca. 598.
Aphanes. 152.
Apium. 275.
Apium. 251. 258.
Aquifolium. 154.
Aquilegia. 453.
Aquileja. 453.
Arabis. 563.
Arctium. 650.
Arenaria. 381 - 385.
Arenaria. 401.
Argemone. 445.
Argentina. 435.
Ariſtolochia. 741.
Armeria. 283. 369.
Armerius flos. 370.
Armoracia. 545.
Arnica. 695.
Arteſi. 629.
Artemiſia. 668 - 672.
Arum 742.
Arundo. 116 - 119.
Aſcyron. 623. 626.
Aſparagus. 301.
Aſpergillus. 1061.
Aſperugo. 176.
Aſperula. 136.
Aſphodelus. 300.
Aſplenium. 850 - 852.
Aſter. 689.
Athanaſia. 667.
Atriplex. 832 - 836.
Atriplex. 221 - 224. 227. 228.
Avellana. 798.
Avena. 109 - 114.
Avicularia. 199.
Auricula Judæ. 1049.
Auricula muris. 385. 396. 399.

B.

Ballota. 502. 503.
Ballote. 502. 503.
Balſamina. 724.
Barba capræ. 427.
——— *caprina.* 1052.
——— *jovis.* 417.
Barbarea. 559.
Bardana. 650.
Beccabunga. 11.
Bedeguar. 430.
Behen. 284.
Bellis. 696.
Bellis. 130. 697. 698.
Berberis. 318.
Beta. 231.
Betonica. 527.
Betula. 785. 786.
Bidens. 664. 665.
Bidens. 708.
Bifolium. 734 - 736.
Biſtorta. 352.
Blattaria. 185. 204.
Blattariæ affinis. 185.
Blitum. 229. 791.
Boletus. 1039. 1040.
Boletus. 1041. 1043.
Bonus Henricus. 220.
Borago. 175.
Borrago. 175.
Botrytis. 1062.
Boviſta. 1054. 1058.
Braſſica. 566 - 569.
Braſſica. 564. 565.
Briza. 92.
Bromus. 101 - 108.
Brunella. 511. 512.
Bryonia. 801.
Bryum. 878 - 898.
Bryum. 869 - 875.
Buccaferrea. 165.
Bugloſſa. 177.

Bu

Digitized by Google

Bugloſſum. 171. 175-177.
Bugula. 478.
Bulbocaſtanum. 249.
Bulbus. 296. 298.
Bunias. 574.
Bunias. 567.
Bunium. 249.
Buphthalmum. 704. 705.
Bupleurum. 245.
Burſa paſtoris. 534. 540. 546.
Burſæ paſtoris ſimilis. 563.
Butomon. 755.
Butomus. 358.
Buxus. 787.
Byſſus. 1017-1025.

C.

Cakile. 574.
Calamagroſtis. 54. 118.
Calamintha. 488. 509.
Calamus. 306.
Calcatrippa. 452.
Calcifraga. 254.
Calcitrapa. 713.
Calla. 743.
Callitriche. 3. 4.
Caltha. 477.
Camelina. 533. 561.
Campanula. 193-199.
Cannabina. 497. 664. 665.
Cannabis. 497.
Caprifolium. 201.
Cardamine. 547-551.
Cardamine. 535.
Cardiaca. 505.
Carduus. 652-659.
Carduus. 651. 660-662. 713.
Carex. 756-783.
Carlina. 663.
Carlina. 659.
Carota. 248.
Carui. 272.
Carum. 272.
Caryophyllata. 441. 442.
Caryophyllus. 79. 283. 369. 370. 378. 379. 394. 399.
Caſſida. 510.
Caſſutha. 153.
Caſtanea. 333.
Cataria. 483.
Caucalis. 246. 247.
Cauda equina. 843.
——— *murina*. 290.
Centaurea. 709-713.
Centaurium. 341. 711.
Centinodia. 238. 256.
Centunculus. 146.
Ceonanthos. 651.
Cepæa. 387.
Ceraſtium. 396-399.
Ceraſus. 418. 419.
Ceratophyllum. 792.
Cerefolium. 267.
Cervicaria. 197.
Chærefolium. 266.
Chærophyllo ſimilis. 152.
Chærophyllum. 268. 269.
Chærophyllum. 266.
Chamædrys. 14. 15. 480.
Chamæ-Geniſta. 1067.
Chamæleagnus. 819.
Chamæleon. 659.
Chamæmelum. 700. 702. 703.
Chamænerion. 335-340.
Chamæorchis. 736.
Chamæ-Schoenus. 42.
Chamæſyce. 407.
Chanterellus. 1026.
Chara. 747. 748.
Cheiranthus. 562.
Cheiri. 562.
Chelidonia. 465.
Chelidonium. 444.
Chelidonium. 465.
Chenopodium. 220-230.
Chlora. 341.
Chryſanthemum. 697. 698.
Chryſanthemum. 705-708.
Cichorium. 649.

Digitized by Google

Cichorium. 644.
Cicuta. 263.
Cicuta. 250. 260.
Cicutaria. 262-264.
Cineraria. 691.
Circæa. 6.
Cirſium. 653. 658.
Ciſtus. 451.
Clathrus. 1043.
Clavaria. 1050-1052.
Clematis. 458.
Clematis. 218.
Clematitis. 741.
Clinopodium. 508.
Cnicus. 660.
Cnicus. 663.
Cochlearia. 541-545.
Collum gruis. 580.
Comarum. 443.
Concha. 1108.
Conferva. 1008-1016.
Conium. 250.
Conſolida. 174. 452. 478.
Convallaria. 302-304.
Convolvulum. 357.
Convolvulus. 190-192.
Convolvulus. 357.
Conyza. 677.
Conyza. 678. 679. 687. 691-694.
Conyzella. 678.
Corallina. 980. 1003.
Corallo-Fungus. 1052.
Coralloides. 949. 971-978. 980. 1052.
Coreopſis. 708.
Cornu Cervi. 145. 544.
Cornus. 148.
Coronopus. 144. 145. 544.
Corrigiola. 280.
Corylus. 799.
Cotula. 703
Cotyledon. 243.
Cracca. 603. 608.
Craſſula. 386.
Cratægus. 422.
Crepis. 644.
Crepitus lupi. 1054.
Criſta galli. 513.
Crithmum. 254.
Cruciata. 240. 830. 1073.
Cucubalus. 371-373.
Cuminum. 272.
Cuscuta. 153.
Cyanus. 710.
Cyathoides. 1045.
Cymbalaria. 521.
Cynapium. 264.
Cynogloſſum. 172.
Cynosbatos. 430.
Cynoſorchis. 726. 729.
Cynoſurus. 94.
Cyperoides. 756. 766. 770-772. 776. 777. 781.
Cyperus. 38. 39.
Cyperus. 34. 49. 767.

D.

Dactylis. 93.
Damaſonium. 738-740.
Daphne. 351.
Datura. 205.
Daucus. 248.
Delphinium. 452.
Dens leonis. 636. 644.
Dianthus. 369. 370.
Diapenſia. 244.
Digitalis. 528.
Dipſacus. 131. 132.
Doronicum. 695.
Dortmanna. 720.
Draba. 534.
Draco. 706.
Dracunculus. 706. 743.
Droſera. 288. 289.
Droſion. 289.
Dulcamara. 207.

E.

Ebulus. 278.
Echium. 178.
Echium. 168.
Elatine. 522.
Elichryſum. 673.
Elleborine. 740.
Elvela. 1026. 1108. 1109.
Elymus. 123.
Elymus. 128.
Embolus. 1059.
Empetrum. 816.
Empetrum. 254.
Epilobium. 335-340.
Epipactis. 734. 735. 738-740.
Equiſetum. 840-844.
Equiſetum. 2. 747. 748. 792.
Erica. 346-350.
Erica. 360. 816. 1002.
Ericoila. 237.
Erigeron. 678-679.
Erigerum. 683. 684.
Eriopherum. 51. 52.
Eruca. 553. 555. 559. 569 574.
Erucaſtrum. 569.
Ervum. 507. 608.
Eryngium. 241. 242.
Eryſimo ſimilis. 565.
Eryſimum. 558-561.
Eryſimum. 557.
Eryſiphe. 1063.
Eſula. 408. 409. 414. 416.
Euonymus. 211.
Eupatorium. 666.
Eupatorium. 404. 665.
Euphorbia. 407-416.
Euphraſia. 514. 515.

F.

Faba craſſa. 386.
Fagus. 798.
Farfara. 680.
Feſtuca. 95-100.
Feſtuca. 81. 103-105. 107. 113.
Ficaria. 465.
Filago. 714-718.
Filicula. 856.
Filipendula. 426.
Filix. 847. 849. 854-856.
Filum. 1000.
Fiſtularia. 520.
Flammula. 463.
Flos ambervalis. 590.
—— *Cuculi*. 550.
—— *regius*. 452.
Foeniculum. 254.
Fontilapathum. 159.
Fontinalis. 864-866.
Fontinalis. 158. 159.
Fragaria. 431.
Frangula. 210.
Fraxinus. 839.
Fucus. 991-1002.
Fucus. 744. 1003. 1004. 1006.
Fuga dæmonum. 624.
Fumaria. 586-589.
Fungilli. 949.
Fungoidaſter. 1106.
Fungoides. 1044. 1045. 1047. 1048.
Fungulus. 1084.
Fungus. 1003. 1026. 1028-1045. 1047. 1049. 1051. 1054. 1083. 1085-1097. 1102. 1105. 1107. 1108.

G.

Galanthus. 291.
Gale. 819.
Galeopſis. 496-498.
Galeopſis. 491. 492.
Galium. 137-141.
Gallium. 136-139.
Geaſter. 1055.
Geniſta. 592-594.

Digitized by Google

Geniſta. 591. 595. 1067.
Geniſtella. 593. 594.
Gentiana. 236 - 240.
Gentiana. 341.
Gentianella. 237. 239.
Geranium. 575 - 582.
Geum. 441. 442.
Gitbago. 393.
Gladiolus. 33. 358. 720.
Glaux. 217.
Glaux. 319.
Glecoma. 490.
Globularia. 130.
Gnaphalium. 673 - 676.
Gnapbalium. 714 - 718.
Gramen alopecurinum. 65.
——— *alopecuroides*. 115.
——— *alopecurus*. 1069.
——— *alpinum*. 775.
——— *anguſtifolium*. 126.
——— *aquaticum*. 54. 64. 100.
——— *arvenſe*. 89.
——— *arundinaceum*. 54. 80. 118.
——— *avenaceum*. 74. 77. 97. 98. 102. 114. 1065.
——— *caninum*. 68. 73. 123. 127. 128. 827. 1072.
——— *Caryopbyllatum*. 769.
——— *criſtatum*. 95.
——— *Cyperoides*. 38. 39. 49. 50. 756 - 758. 760. 761. 763. 767. 773. 776. 778. 783.
——— *dactylon*. 58.
——— *dentis canini* 1068.
——— *eriopborum*. 52.
——— *floridum*. 379.
——— *birſutum*. 315 - 317.
——— *bordeaceum*. 124.
——— *junceum*. 41. 43. 46. 311 - 313. 329. 759. 784.
——— *lanatum*. 828.
——— *latifolium*. 127.
——— *loliaceum*. 72. 99. 120. 122. 128. 1070. 1071.
Gramen longius. 1072.
——— *mariæ*. 829.
——— *miliaceum*. 70. 71.
——— *montanum*. 69. 117.
——— *murorum*. 86.
——— *myurum*. 62.
——— *nemoroſum*. 76. 314. 315. 762. 764.
——— *nigro - luteum*. 781.
——— *nodoſum*. 60. 109.
——— *paluſtre*. 55. 81. 768.
——— *paniceum*. 56. 57. 65. 1068.
——— *paniculatum*. 86. 88. 828. 829.
——— *parnaſſi*. 282.
——— *pbalaroides*. 1070.
——— *polyantbemum*. 283.
——— *pratenſe*. 52. 82 - 85. 94. 112. 828.
——— *ſecalinum*. 121.
——— *ſegetum*. 67. 75.
——— *ſorgbi*. 57.
——— *ſparteum*. 53. 78. 119.
——— *ſpicatum*. 28. 93. 124. 330. 781. 783.
——— *ſylvaticum*. 66. 106.
——— *tomentoſum*. 51.
——— *tremulum*. 92.
——— *triticeum*. 123. 197.
——— *typbinum*. 61.
——— *typboides*. 59. 60. 62. 63.
Graminifolia. 857.
Gratiola. 21.
Gratiola. 403.
Groſſularia. 212 - 214.
Gypſophila. 367.

H.

Halimus. 832.
Hedera. 215.
Hedera. 490.
Hederula. 749.

He-

Digitized by Google

Helianthemum. 451.
Helix. 215.
Helleborine. 738-740.
Helvella. 1044.
Helxine. 831.
Hepatica. 935. 937. 938. 941.
Hepaticoides. 930. 931.
Hepatorium. 664. 666.
Heptaphyllum. 443.
Heracleum. 255.
Herba britannica. 325.
—— *divi ſtephani*. 6.
—— *gerardi*. 276.
—— *judaica*. 484.
—— *ſtella*. 145.
Herminium. 736.
Herniaria. 219.
Herocloe. 829.
Hieracium. 639-643.
Hieracium. 630. 632. 637. 638. 641-647.
Hippocaſtanum. 333.
Hippolapathum. 325.
Hippophae. 818.
Hippoſelinum. 271.
Hippuris. 2.
Hippuris. 748.
Holcus. 827-829.
Holoſteo affinis. 290.
Holoſteum. 314. 378.
Homolocenchrus. 55.
Horminum. 26. 27.
Hottonia. 182.
Humulus. 820.
Hyacinthus. 305.
Hydroceratophyllum. 792.
Hydrocharis. 825.
Hydrocotyle. 243.
Hydrophace. 749-752.
Hydropiper. 354.
Hyoſcyamus. 266.
Hyoſcyamus. 334.
Hyoſeris. 645.
Hypericum. 623-627.
Hypnum. 899-927.
Hypochæris. 646. 647.
Hypopitys. 359.
Hypoxylum. 1050.
Hyſſopifolia. 403.
Hyſſopus. 482.

I.

Jacea. 709. 712.
Jacobæa. 686. 687.
Jaſione. 719.
Iberis. 546.
Ibiscus. 583.
Ilex. 154.
Illecebra. 390.
Illecebrum. 216.
Impatiens. 724.
Impia. 715.
Intybus. 649.
Inula. 692-694.
Jolithus. 1021.
Irio. 557.
Iris. 32. 33.
Iſnardia. 149.
Judaica herba. 484.
Juncellus. 40. 43.
Juncus. 307-317.
Juncus. 35. 40. 42. 44. 45. 47. 48. 51. 261. 358.
Jungermannia. 928-935.
Jungermannia. 876. 877.
Juniperus. 826.

K.

Kali. 1. 230. 232-234.
Knawel. 365. 366.

L.

Lactuca. 634.
Ladanum. 496.
Lagopodium. 597.
Lagopus. 613.
Lagurus. 115.

Digitized by Google

Lamium. 491-495.
Lamium. 498. 499. 501.
Lampſana. 648.
Lapathum. 160. 220. 320-325.
Lapis bufonis. 1097.
——— *violaceus.* 1021.
Lappa. 650. 790.
Lapſana. 648.
Lathræa. 518.
Lathyrus. 598-602.
Laureala. 351.
Lemna. 749-752.
Lens. 750.
Lentibularia. 23.
Lenticula. 14. 749-752. 991.
Lenticularia. 749. 750. 752.
Leontodon. 636-638.
Leonurus. 505.
Lepidium. 535-537.
Leucathemum. 700.
Leucojum. 291. 562. 720.
Leuconymphæa. 449.
Leviſticum. 256.
Lichen. 943-987.
Lichen. 934. 936-940. 942. 1082.
Lichenaſtrum. 877. 928-935. 941.
Lichen-Agaricus. 1081.
Lichenoides. 943-946. 950-970. 990. 1057. 1082.
Liguſticum. 256.
Lilium convallium. 302-304.
Limodoron. 530.
Limonium. 284.
Limoſella. 529.
Linaria. 524.
Lingua. 464.
——— *cervina.* 850.
Linifolia. 280.
Linum. 285-287.
Linza. 1007.
Lithoſpermum. 169. 170.
Littorella. 784.
Lobelia. 720.
Lolium. 120-122.
Loncbitis. 848.
Lonicera. 201.
Loto-affinis. 597.
Lotus. 617. 618.
Lunaria. 846.
Lupulus. 820.
Luteola. 405.
Lychnanthus. 371.
Lychnis. 394. 395.
Lychnis. 367. 368. 372-376. 393.
Lycogala. 1111.
Lycoperdon. 1053-1058.
Lycopodium. 858-861.
Lycopſis. 177.
Lycopſis. 178.
Lycopus. 25.
Lymnanthemum. 180.
Lyſimachia. 183-187.
Lyſimachia. 189. 334-339. 402. 510.
Lyſimachium. 183.
Lythrum. 402. 403.

M.

Malva. 584. 585.
Malus. 525.
Marchantia. 937-940.
Marrubium. 504.
Marrubium. 25. 502. 505.
Matricaria. 699-701.
Medica. 620. 622.
Medicago. 620-622.
Melampyrum. 516. 517.
Melica. 80. 1065.
Melilotus. 610. 619.
Meliſſa. 509.
Mentha. 485-489.
Mentha. 483.
Menthaſtrum. 486.
Menyanthes. 180. 181.
Mercurialis. 824.
Merulius. 1041.

Meſpilus. 422.
Mezæreum. 351.
Milium. 66.
Milium ſolis. 169.
Millefolium. 23. 182. 260. 476. 707. 792-794.
Millegrana. 219. 287.
Mnium. 868-877.
Mollugo. 140.
Monorchis. 757.
Monotropa. 359.
Montia. 129
Morſus diaboli. 133.
——— *gallinæ*. 281. 495.
——— *ranæ*. 825.
Mucilago. 1064.
Mucor. 1059.
Musco-fungus. 965. 968. 969. 975. 986.
Muscoides. 931.
Muscus abietis facie. 912.
——— *amarus*. 962.
——— *apocarpos*. 878. 879.
——— *aquaticus*. 864. 1009.
——— *arboreus*. 924. 964. 984. 986. 987.
——— *aureus*. 869. 873. 896.
——— *caninus*. 969.
——— *capillaceus*. 881. 888. 891. 893. 896. 897.
——— *capillaris*. 867. 914.
——— *clavatus*. 858. 861.
——— *coralloides*. 980. 982.
——— *corniculatus*. 982.
——— *coronatus*. 867. 868. 869. 882. 886. 892.
——— *cranii humani*. 953.
——— *cruſtæ modo*. 955.
——— *denſis foliolis*. 915.
——— *denticulatus*. 906. 1078 1079.
——— *denticulato ſimilis*. 918.
——— *erectus*. 860. 884. 916.
——— *filicinus*. 900. 908.
Muscus lactucæ ſimilis. 1006.
——— *marinus*. 1002. 1906.
——— *minimus*. 895. 1046.
——— *montanus*. 915.
——— *paluſtris*. 875.
——— *pennatus*. 899.
——— *polytrichodes*. 872. 875. 889. 901.
——— *pulmararius*. 961.
——— *pyxidatus*. 971.
——— *pyxoides*. 973.
——— *ramoſus*. 905. 985. 987.
——— *repens*. 907. 910. 911. 916.
——— *ſaxatilis*. 887. 895. 1080.
——— *ſquamoſus*. 904. 906. 912. 913. 920. 921. 926.
——— *ſtellaris*. 875.
——— *ſubtiliſſimus*. 883.
——— *taxiformis*. 902.
——— *terreſtris*. 858. 862. 875. 883. 891. 894. 916. 919. 924. 925. 1078. 1079.
——— *trichoides*. 863. 870. 880. 888. 927. 931.
——— *trichomanoid*. 903. 928. 931.
——— *vulgaris*. 909.
——— *vulgatiſſimus*. 862.
Myagrion. 533.
Myagrum. 532. 533.
Myagrum. 561.
Myoſotis. 168.
Myoſotis. 398.
Myoſurus. 290.
Myrica. 819.
Myriophyllum. 793. 794.
Myriophyllum. 182.
Myrrhis. 267-269.
Myrtillus. 342.

Na-

N.

Napus. 567.
Narciſſus. 292.
Nardus 53.
Narthecium. 300.
Naſturtium. 535. 537. 547. 550. 552. 556.
Nepeta. 483.
Nigellaſtrum. 393.
Noli me tangere. 724.
Noſtoc. 988.
Nucula. 249.
Nummularia. 187. 189.
Nymphæa. 448. 449.
Nymphæa. 180. 825.

O.

Oculus Chriſti. 692.
Ocymoides. 374. 395.
Odontites. 515.
Oenanthe. 261.
Oenothera. 334.
Olus album. 31.
—— *atrum*. 271.
Onobrychis. 194.
Ononis. 596.
Onopordum. 661. 662.
Ophiogloſſum. 845.
Ophris. 734. 735.
Ophrys. 734-737.
Opulus. 277.
Orchis. 725-732.
Orchis. 733. 736. 737.
Origanum. 506.
Ornithogalum. 296-299.
Ornithopus. 609.
Orobanche. 530. 531.
Orobanche. 359. 518.
Orontium. 525.
Orvala. 26.
Osmunda. 846-848.
Oſyris. 524.
Othonna. 691.
Oxalis. 391. 392.
Oxalis. 327. 328.
Oxyacantha. 318. 420.
Oxycaccus. 315.
Oxylapathum. 323.
Oxys. 392.

P.

Padus. 418.
Palmata. 728. 730. 731.
Panicum. 56-58.
Panicum. 65.
Papaver. 445-447.
Papaver. 372.
Parietaria. 831.
Parnaſſia. 282.
Paronychia. 216. 363. 534.
Parthenium. 699.
Paſtinaca. 270.
Paſtinaca. 248.
Pecten veneris. 265.
Pedicularis. 519. 520.
Pedicularis. 513.
Pentaphyllum. 436-438. 443.
Peplis. 319.
Peplis. 408.
Perchepier. 152.
Perfoliata. 245.
Perforata. 624.
Periclymenum. 201.
Perſicaria. 353-355.
Pes anſerinus. 221.
—— *columbinus*. 582.
Petaſites. 681. 682.
Peucedanum. 253.
Peziza. 1045-1049.
Peziza. 1108. 1109.
Phalaris. 54. 55.
Phallus. 1041. 1042.
Phaſcum. 863.
Phellandrium. 262.
Phleum. 59-61.
Phœnix. 121.
Phyllitis. 850.

Digitized by Google

Phyteuma. 525.
Picris. 630.
Picris. 638.
Piloſella. 563. 639. 640. 674.
Pilularia. 857.
Pimpinella. 273. 274.
Pimpinella. 147. 796.
Pinaſtella. 792.
Pinguicula. 22.
Pinus. 800.
Pityuſa. 410.
Plantaginella. 529.
Plantago. 142-145. 1066.
Plantago. 321. 332. 529. 784.
Platanaria. 755.
Pneumonanthe. 236.
Poa. 81-91.
Podagraria. 276.
Polifolia. 360.
Polyacantha. 654.
Polygala. 590.
Polygonatum. 303.
Polygonifolia. 280.
Polygonum. 352-357.
Polygonum. 2. 216. 219. 280. 287. 365. 366. 384. 401.
Polypodium. 853-856.
Polypodium. 848.
Polyporus. 1102.
Polytrichum. 867.
Polytrichum. 851. 869. 873. 879. 884. 896.
Populus. 821-823.
Portulaca. 129. 832.
Potamogeton. 155-164.
Potamogeton. 953. 746.
Potentilla. 435-439.
Poterium. 796.
Prenanthes. 635.
Primula. 179.
Prunella. 511-512.
Prunus. 418-421.
Pſeudo-Aſphodelus. 300.
——— *Cyperus.* 778.
Pſeudo Liguſticum. 418.
——— *Lyſimachium.* 337. 402.
Pſeudo-Orchis. 734.
Ptarmica. 706.
Pteris. 849.
Pulegium. 489. 509.
Pulicaria. 694.
Pulmonaria. 173.
Pulmonaria. 641.
Pulſatilla. 455.
Pyrola. 361. 362.
Pyrus. 424. 425.

Q.

Quercus. 797.
Quercus. 993.
Quinquefolium. 436-439. 443.

R.

Radiola. 287.
Radix cava. 586.
Ranæ morſus. 825.
Ranunculus. 463-476.
Ranunculus. 243. 457.
Rapa. 564.
Raphaniſtrum. 573.
Raphanus. 573.
Raphanus. 545. 554.
Rapiſtrum. 532. 570.
Rapunculum. 194.
Rapunculus. 194. 195. 198. 719.
Regina prati. 427.
Reſeda. 405. 406.
Rhamnus. 209. 210.
Rhamnus. 818.
Rhinanthus. 513.
Rhus. 819.
Ribes. 212-214.
Riccia. 941.
Robur. 797.
Rorida. 288. 289.
Roſa. 428-430.
Ros ſolis. 288. 289.
Rubeola. 1073.

 Ru-

Digitized by Google

Rubia. 140. 1073.
Rubus. 431-433.
Rumex. 320-328.
Ruppia. 165.
Ruta muraria. 852.

S.

Sagina. 166. 167.
Sagitta. 795.
Sagittaria. 795.
Salicaria. 402. 403.
Salicornia. 1.
Salix. 803-815.
Salix. 1077.
Salſola. 232-234.
Salvia. 26. 27.
Salvia. 479.
Sambucus. 278. 279.
Sambucus. 277.
Samolus. 200.
Sanguiſorba. 147.
Sanguiſorba. 796.
Sanicula. 244.
Sanicula. 22.
Saponaria. 368.
Satyrium. 733.
Satyrium. 727. 728. 730.
Saxifraga. 363. 364.
Saxifraga. 273. 274.
Scabioſa. 133-135.
Scabioſa. 130. 711. 719.
Scandix. 265-267.
Scariola. 634.
Schoenolagurus. 51.
Schoenus. 34-37.
Scirpus. 40-50.
Scleranthus. 365. 366.
Scolopendrium. 850.
Scordium. 480.
Scorodonia. 479.
Scorpiurus. 168.
Scrophularia. 526. 527.
Scutellaria. 510.
Sedum. 386-390.
Sedum. 363. 364. 417. 454.
Selago. 860.
Selinum. 251. 252.
Sempervivum. 417.
Sepervivum. 390.
Senecio. 683-688.
Serapias. 738-740.
Serpyllun. 507.
Serratula. 651.
Seſamoides. 373.
Seſeli. 252.
Sideritis. 484.
Sideritis. 496. 501.
Sigillum ſalomonis. 303.
Silene. 374-376.
Silybum. 657.
Sinapi. 555. 571. 572.
Sinapis. 570-572.
Siſon. 260.
Siſymbria. 552.
Siſymbrium. 552-557.
Siſymbrium. 547. 549.
Sium. 258. 259.
Sium. 260. 263. 547.
Smilax. 190. 191.
Smyrnium. 271.
Soda. 233.
Solanifolia. 6.
Solanum. 207. 208.
Solanum. 205.
Soldanella. 192.
Solidago. 690.
Solidago. 688.
Solis Ros. 289.
Soncba affinis. 648.
Sonchus. 631-633.
Soncbus. 635.
Sopbia. 556.
Sorbus. 423.
Sparganium. 755.
Spartium. 591.
Spatula. 33.
Speculum. 199.
Spergula. 400. 401.
Spergula. 286. 384. 529.

Spba-

Sphacelus. 479.
Sphæria. 1057.
Sphagnum. 862.
Sphagnum. 878.
Sphondylium. 255.
Spina acida. 318.
——— *acuta.* 422.
——— *alba.* 661.
——— *cervina.* 209.
——— *tomentoſa.* 661. 662.
Spiræa. 426. 427.
Spongia. 1064.
Squamaria. 518.
Stachys. 499-501.
Statice. 283. 284.
Stellaria. 377-380.
Stellaria. 3.
Stramonium. 205.
Stratiotes. 454.
Struthiopteris. 848.
Succiſa. 133.
Symphytum. 174.
Symphytum. 173.

T.

Tamariſco ſimilis. 1002.
Tanacetum. 667.
Taraxacum. 636.
Targionia. 936.
Tatula. 205.
Telephium. 386.
Terræ glandes. 598.
Tetragonia. 211.
Tetrahit. 497.
Teucrium. 479-481.
Teucrium. 15.
Thalictrum. 459-461.
Thapſus. 202.
Thlaſpi. 538-540.
Thlaſpi. 543.
Thymus. 507. 508.
Thyſſelinum. 251.
Tilia. 450.
Tithymalus. 409-416.
Tordylium. 246. 247.
Tormentilla. 440.
Tragopogon. 628. 629.
Tragoſelinum. 273. 274.
Trapa. 150.
Tremella. 988-990.
Tremella. 1005. 1007. 1049.
Tribulus. 150. 157.
Trichomanes. 851.
Trifolium. 610-616.
Trifolium. 181. 391. 392. 618-621.
Triglochin. 329. 330.
Trigonella. 619.
Tripolium. 689.
Triticum. 125-128.
Triticum. 123. 516.
Tubera. 1053.
Tunica. 367.
Turritis. 564. 565.
Tuſſilago. 680-682.
Typha. 753. 754.

U.

Ulex. 595.
Ulmaria. 427.
Ulmus. 235.
Ulva. 1003-1007.
Unifolium. 304.
Urtica. 788. 789.
Urtica. 493. 494. 497-499.
Uſnea. 953. 984-989.
Utricularia. 23.
Uva criſpa. 214.

V.

Vaccinia. 342. 344. 345.
Vaccinium. 342-345.
Valantia. 832.
Valeriana. 29-31.
Valerianæ rubræ ſimilis. 284.
Vallisneria. 802.
Verbaſculum. 179.

Digitized by Google

Verbaſcum. 202-204.
Verbena. 24.
Vermicularis. 234.
Veronica. 7-20.
Veronica. 522.
Viburnum. 277.
Vicia. 603-606.
Vicia. 598. 607. 608.
Vinca. 218.
Viola. 721-723.
Viola. 182.
Violaria. 721.
Virga aurea. 688. 690.
—— *paſtoris.* 131. 132.
—— *ſanguinea.* 148.
Viſcago. 376.
Viſcum. 817.
Vitalba. 458.
Vitis idæa. 342-345.
Vulneraria. 597.
Vulvaria. 228.

X.

Xanthium. 790.

Z.

Zannichellia. 746.
Zoſtera. 744. 745.

maritimus. *321. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus. *Sp.* 478. *n.* 9.

Lapathum aquaticum, luteolæ folio. *Tourn. inſt.* 564.

Lapathum aquaticum, anguſtiſſimo acuminato folio. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 142. *t.* 164.

Te Catwyk *by het* Malle gat. (MEERBURGH.)

Inſeratur pag. 99. *Supra. n.* 322.

RE-

REGISTER

DER

NEDERDUITSCHE NAAMEN.

A.

Aak. (ſpaanſche) 838.
Aal-bezien. 212. 213.
Aard-Aker. 599.
——— Bezien. 431.
——— Klaver. 615.
——— Mos. 1078.
——— Nooten. 249.
——— Rook. 587.
——— Veil. 490.
Aarons-baard. 742.
Abeel-boom. 821.
Adders-tong. 845.
Adder-wortel. 352.
Adonis-bloem. 462.
Agrimony. 404.
Ahorn-boom. 837.
Ajuin (Veld-) 296.
Akkely. 453.
Akker-Brem. 592.
——— Haanevoet. 472.
——— Klitzen. 246.
Alfrank. 207.
Algoede. 220.
Alſem. 669. 670.
Amelands-gras. 95.
Andoorn. 502-504.
Angelica. (wilde) 257.
Appel-boom. 425.
Aquiley. 453.
Asfodillen. 300.
Aſpergie. 301.
Aſter. (zee-) 689.
Averone. (wilde) 668.
Averuit. (wilde) 668.

B.

Bak-kruid. 179.
Bal-Roozen. 277.
Ballerjes-kruid. 725.
Baſtard-Garſt. 124.
——— Muur. 188.
Bathengel. 481.
Beeke-boom. 11.
Beek-punge. 11.
——— ſchuim. 527.
Beemdt-Diſtel. 660.
——— Gras. 84.
——— Klaver. 612.
Been (wit) 372.
Beere-bezien. 344.
——— klaauw. 255.
Beete. 231.
Bentveld-kruid. 512.
Berberiſſen. 318.
Berg-Knop. 390.
——— Mos. 980.
——— Nies-kruid. 738.
——— Sanikel. 22.
Berke-boom. 785.

Digitized by Google

Bernaſie. 175.
Bertram. 706.
Betonie. 527.
Bevernaart. 273-274.
Bevernel. 273. 274.
Beveſt. 821.
Beuke-boom. 798.
Beursjes-kruid. 540.
Bezem-kruid. 537.
Biezen. 44. 261. 309. 310.
Bilſen-kruid. 206.
Bingel-kruid. 824.
Bitter-zoet. 207.
Blauwe-beſſen. 342.
——— Lelytjes. 236.
Blik. 435.
Bloed-kruid. 320.
Boekweit. (wilde) 357.
Boelkens-kruid. 664. 666.
Boeren-Kers. 538. 539.
——— Rottingen. 656.
——— Worm-kruid. 667.
Boks-baard. 628.
——— boonen. 181.
Bol. 393.
Bolderik. 393.
Boog-hout. 838.
Boom-Mos. 984.
——— Palm. 787.
——— Varen. 853.
——— Veil. 215.
Boonen. (Donder-) 386.
——— (Wolfs-) 386.
Boontjes-Holwortel. 586.
Boſch-beſſen. 342.
——— boom. 787.
——— gras. 315.
——— Haanevoet. 456.
——— Muur. 377.
——— Varen. 855.
Boter-bloem. 476. 477.
Boviſt. 1054.
Bouquet-Lathyrus. 602.
Braam-bezien. 433.
——— boizen. 431.
Brand-Netelen. 788. 789.
Breekebeen. 1043.
Brem 591-593.
——— Kappers. 591.
——— Raap. 530.
Breuk-kruid. 240. 386.
Bruinelle. 511.
Bruin-Heilig. 487.
Bruinetjes. 462.
Brummelen. 430. 431.
Bulpeſerikken. 753.
Busboom. 787.
Butter wortel. 22.
Byvoet. 671.

C.

Calketrip. 452.
Calmus. 306.
Camille. 700-703.
Campernoelie. 1030.
Caperfoely. 201.
Caruwy. 282.
Carwy. 282.
Caſtanie-boom. (wilde) 333.
——— (paarde-) 333.
Catoen-bloem. 52.
Celdery. 275.
Champignion. 1026. 1030.
Chantarelle. 1026.
Chriſti Lancet. 845.
Chriſtus-oogen. (wilde) 896.
Cicorey. 644. 649.
Comyn. 272.
Coraal-kruid. 301.
Cornoellie. (wilde) 148.
Crock. 608.

D.

Dammeren-hout. 826.
Das-Look. 295.
Deeken-vlag. 1008.
Deurwas. 245.
Diſtel. (Beemdt) 660.

Dis-

Diſtel. (Daauw-) 633.
——— (Drie-) 633.
——— (Ganzen-) 633.
——— (Haazen-) 633.
——— (Haver-) 651.
——— (Kruis-) 241. 242.
——— (Marien-) 657.
——— (Melk-) 657.
——— (Meyr-) 241.
——— (onze Vrouwe-) 657.
——— (Sogge-) 633.
——— (Sterre-) 713.
——— (Tuimel-) 242.
——— (Veld-) 660.
——— (Vrouwe-) 657.
——— (Wallen-) 242.
——— (Weg-) 661.
Dodden. (Liſch-) 753.
Doetebolten. 753.
Dokke-bladen. 681. 682.
Dol-Appel. 205.
——— Beſſen. 207. 208.
——— Kruid. 206. 208.
Dolle-Kervel. 250. 263. 264.
Dolyk. 122.
Donder baard. 417.
——— boonen. 386.
——— kruid. 677. 679. 693.
Donzen. 753.
Doorn-Appel. 205.
——— Beſſen. 214.
——— (Effen-) 838.
——— (Heukel-) 593.
——— (Katten-) 593.
——— (Kruis-) 214.
——— (Muize-) 154.
——— (Slee-) 421.
——— (Wege-) 209.
——— (Wipe-) 430.
Doorwas. 245.
Doove-Netelen. 493. 495. 497.
Dotter-bloem. 477.
——— gras. 52.
——— (Vlas) 533.
Dragon. (wilde) 706.
Draken-bloed. 320.
Dravik. 101.
Drieblad. 181.
Drie-Diſtel. 663.
Drop-Wortel. 426.
Druiven-kruid. 226.
Duikers. 755.
Duin-bezien. 219.
——— Doorn. 818.
——— Roos. 429.
——— Wilg. 803. 1077.
Duive Kervel. 587.
——— poot. 582.
Duivels-beet. 133.
——— brood. 1030.
——— koppen. 753.
——— melk. 408. 416.
——— naaigaarn. 196.
Duizend-blad. 23. 793.
——— graan. 219. 287.
——— guldens-kruid. 238.
——— knoop. 2. 356.
——— koorn. 219.
——— ſchoon. 370.
Dwerg-appels. 797.

E.

Een-blad. 304.
Eenden-groen. 750.
——— kroos. 750.
Eerenprys. 9. 10.
Effen-doorn. 838.
Egel-gras. 463.
——— koolen. 463. 464.
Eglantier-Roos. 428.
Eiken-boom. 797.
Eike. (zee-) 993.
Elfrank. 207.
Elgjes-hout. 207.
Elze-boom. 786.
Engel-zoet. 853.
Eppe. 252. 258. 264. 271. 275.

Digitized by Google

Erf. 281.
Eſch-doorn. 837. 838.
Eſpen-boom. 822.
Eſſchen-boom. 839.
Evene. 113.
Ever-wortel. 659.
Eyloof. 215.

F.

Felje. 174.
Fenne-bloemen. 696.
Fie-kruid. 556.
Filt-kruid. 153.
Flap. 1008.
Flierfin-kruid. 276.
Fontein-kruid 155. 303. 353.
Framboizen. 431.

G.

Gagel. 810.
Gal. (water-) 400.
Galigaan. 31. 49. 50. 76.
Gamander. 481.
Gamanderlyn. 15.
Ganzerik. 435.
Ganze-bloemen. 697. 698.
——— Diſtel. 633.
——— Voet. 221.
Garſt. (baſtard-) 124.
Gaſpel-doorn. 594.
Geiten-baard. 427.
——— blad. 201.
Gelderſche-Roos. 277.
Geneyer-boom. 826.
Gentiaan. 236.
Gerards-kruid. 276.
Geruwe. 707.
Gezegend-kruid. 441.
Gierſt. (zonne-) 169.
Ginoffelen. 399.
Glas-kruid. 831.
Glid-kruid. 484. 510.
Gods-genade. 21.
Goeden-Hendrik. 220.
Gouwe. (kleine-) 465.
——— (ſtinkende-) 444.
Grappe. (Zee) 1.
Gras. Amelands-) 93.
——— (beemdt-)
——— (bloeiend-Zee) 283.
——— (bund-) 78.
——— (dotter-) 52.
——— (Egel-) 463.
——— (Galigaan-) 763.
——— (hairig-) 315. 317.
——— (hirs-) 66.
——— (Honds-) 127.
——— (Koe-) 587.
——— (Kreupel-) 356.
——— (Leed-) 127.
——— (Lidt-) 127. 1072.
——— (Nier-) 329.
——— (Oogentrooſt-) 399.
——— (Padde-) 314.
——— (Panik-) 1068.
——— van Parnas. 282.
——— (Peen-) 127.
——— (Pluim-riet-) 118.
——— (Puin-) 127.
——— (Riet-) 38. 54. 755. 782.
——— (ruig-boſch-) 315.
——— (Sorg-zaad-) 57.
——— (trillend-) 92.
——— (Varkens-) 356.
——— (Vlot-) 100.
——— (Water-) 768. 782.
——— (Weg-) 356.
——— (Wolle-) 52.
——— (Zaad-) 66.
——— (Zee-) 283.
Graveel-zaad. 567.
Gravinne-kruid. 145.
Grind-kruid. 683.
Grond-heel. 686.
Gryſecom. 587.
Guichelheil. 188.
Gulden-hair. 867.

Gal-

Gulden - roede. 690.
——— wederdood. 867.

H.

Haag - appels. 422.
Haage - doorn. 422.
Haane - bolten. 753. 754.
——— kammen, 513.
——— klootjes. 465.
——— poot of voet. 456. 466. 470. 472.
Haaze - Diſtel. 633.
——— Geruwe. 707.
——— Latouw. 633.
——— Nooten - boom. 799.
——— pootjes. 613.
Haddig. 378.
Hals - kruid. 197.
Hamels. (veen-) 52.
Handekens - kruid. 730.
Harderstasjes. 540.
Harts - geſpan. 505.
——— Hoorn. 145. 544.
——— Hooy. 623. 626.
——— Tong. 352. 850.
Haſelaar. 799.
Haver. 111.
——— Diſtel. 651.
Haviks - kruid. 642. 643.
Heel - blaadjes. 693.
——— wortel. 174.
Heems - wortel. 583.
Heide. 346. 348.
——— (Kraay-) 816.
——— (Steekel-) 593.
Heidens - wond - kruid. 688.
Heil - blad. 461.
Helm. 119.
——— draad. 760.
——— kruid. 526.
Hengel. 517.
Herik. 570.
Hermoes. 841. 843.
Herſeleer. 235.
Heuckel - doorn. 593.
Heul. 445 - 447.
Hexe - krans. 861.
——— melk. 448.
Hinne - bezien. 431.
Hirs - gras 66.
Hoef - blad. 680.
Hoe - langer hoe - liever. 207.
Hoender - beet. 281. 495.
Hol - wortel. 741.
——— (boontjes-) 586.
Honds - bezien. 344.
——— bloem. 636.
——— boom. 210.
——— draf. 490.
——— gras. 127.
——— Kars. 418.
——— kullekens. 729.
——— Look. 294.
——— Mos. 969.
——— Netelen. 493.
——— Peterſely. 264.
——— ribbe. 1066.
——— Roos. 430. 446.
——— Tonge. 172.
Hondtjes - hout. 210.
Honing - daauw. 1063.
Hop. 820.
Horde. 513.
Hout - pypen. 842.
Huis - look. 389. 417.
Hulſt. 154.
Hyacinth. 305.
Hyſop. 482.

I.

Jaagt den duivel. 624.
Jenettekens. 395.
Jeuk - kruid. 466.
Jeupjes. 210.
Indig. 696.
Ingroen. 478.

Innekley. 688.
Jooden-kruid. 484.
Joſephs-bloemen. 628.
Judas-ooren. 1049.
Juffers-ſchoenen. 618.
Juffrouw-merk. 275.

K.

Kaale-jonker. 656.
Kaarden. 131.
Kaarten. 454.
Kaasjes-kruid. 584. 585.
Kalfs-ſnuit. 525.
—— voet 742.
Kali 230. 232.
Kalmus. 306.
Kanker-bloem. 446. 636.
Kanne-waſſers. 131.
Kardinaals-hoed. 211.
———— muts. 211.
Kars-(honds-) 418.
——(vogel-) 418.
Karſe-boom. 419.
Katten-doorn 593.
——— hout. 806.
——— klaauwen. 141.
——— kruid. 483.
——— ſtaarten. 402.
——— voet. 674.
Keel-kruid. 5.
Keik. 573.
Kers (boere-) 538. 539.
——(varkens-) 544.
——(water-) 550. 552.
——(wilde-) 561.
——(winter-) 559.
——(zwynen-) 544.
Kervel. 266.
———(duive-) 587.
———(dulle-) 250. 263. 264.
———(naalde-) 265.
———(wilde-) 268. 269.
Keukenſchelle. 455.
Kievits-bloem. 550.
Kievits vet. 22.
Kladde-wortel. 650.
Klap-Roozen. 446.
Klaſſen. 650. 790.
Klaver. 610-612. 615. 616. 618. 621.
——— Zuuring. 391.
Klaveren (water-) 181.
Kleef-kruid. 141.
Klet. 141.
Klim-op 215.
Klitzen. 650. 790.
———— (Akker-) 246.
Klokskens. 236.
———— Winde. 190.
Knappers. 525.
Knodſen (water-) 753.
Knollen. 568.
Knoop-kruid. 712.
Koedille. 703.
Koe-gras. 587.
—— ooge. 705.
Koekoeks-bloem. 394. 550. 731.
———— brood. 391. 392.
Koeſen. 323.
Koesjes-bladen. 323.
Kolle-bloemen. 446.
Koninginne-kruid. 666.
Konings-Kaarſen. 202.
Kool (wilde-) 566.
—— (zee-) 192.
Koorn-bloemen. 710.
—— Heul. 446.
—— (kruip-) 127.
—— (Panik-) 57.
—— Roozen. 393. 446.
—— Sala. 31.
Kraal-kruid. 1.
Kraane-bek. 265.
——— hals. 575.
Kraaye-bloem. 394.
——— heide. 816.
Krabbe-klaauw. 454.
——— klootjes. 671.

Digitized by Google

Krabbe-kwaad. 1.
Krakel-bezien. 342.
Kransjes. 696.
Kriſſen. 214.
Krodde. 570.
Krokkeling. 144.
Kroontjes-kruid. 248. 408. 412.
Kroos. 750. 991.
Kroofen. 345.
Kroote. 231.
Kruidje roerd my niet. 724.
Kruiken (water-) 448.
Kruip door den tuin. 490.
——— koorn. 127.
Kruis-bezien. 214.
——— bloem. 590.
——— diſtel. 241. 242.
——— doorn. 214.
——— en Munt. 488.
——— kruid. 683.
——— wortel. 683. 684.
Kulletjes (honds-) 729.
——— kruid 727.
——— (voſſe-) 725.

L.

Lammertjes-ooren. 220.
Lathyrus (bouquet-) 602.
——— (tros-) 602.
Latouw (Haaze) 633.
——— (wilde-) 634.
——— (Zee-) 1006.
Lavas. 256.
Leeken. 323.
Leeuwen-bek. 497. 525.
——— klaauw. 151.
——— voet 151.
Lely convaly. 302.
Lelie van den dalen. 302.
Lelytjes (blauwe-) 263.
Lepelblad. 332. 541. 542.
——— kruid. 541.
Leverkruid. 404. 937.
Liend. 190.
Lieven-Heers-teentjes. 188.
Liguſter. 5.
Limoen-kruid. 284.
Linde-boom. 450.
——— (ſchotſche) 837.
Linzen. 600
——— (water-) 750.
Liſch of Lieſch. 358. 755.
——— dodden. 753.
Longe-kruid. 173. 641. 961.
Look. 293-295.
——— zonder Look. 560.
——— (water-) 480.
Lubbeſtok. 256.
Luciaan-kruid. 695.
Luiten-hout. 837.
Luize-boom. 211.
——— kruid. 819.
Lynen. 458.
Lyſter-beziën-boom. 423.

M.

Maagdelieven. 696. 697.
Maagden-palm. 218.
Maan-kruid. 846.
Majolein (wilde-) 506.
Maldegeer- 240.
Mallote. 610.
Malrove. 25. 502. 504.
Maluwe. 584. 585.
Mammetjes-kruid. 201.
Mans-kracht. 256.
Marentakken. 817.
Margarieten. 696.
Marien-Diſtel. 657.
Mater. 699.
Matte-Vlas. 52.
May-bloemen. 302.
——— Zoetjes. 696.
Mayer. 791.
Meer-Edik. 545.
——— Radys. 545.
——— Wortel. 440.
Meir-bladeren. 449.

Meir-Diſtel. 241.
Melde. 833. 835.
Melk-bloem. 493.
——— Diſtel. 657.
——— kruid. 217
——— wortel. 456.
Melote. 610.
Memmekens-kruid. 201.
Mink-yzers. 150.
Moeder-kruid. 699.
Moeders-tasjes. 540.
Moeren. 52.
Mol-Salade. 636.
Mond-hout. 3.
Morgen-ſterren. 298. 628.
Morilles. 1041.
Mos (aard-) 1078.
——— (berg-) 980.
——— (boom-) 984.
——— (Honds-) 969.
——— (ſteen-) 895.
Moſtaart. 571. 572.
——— (wilde-) 555.
Motten-kruid. 204. 226.
Motte met biggen. 303.
Muizen-doorn. 154.
——— koorn. 120.
——— oor. 168. 639.
——— ſtaart. 290.
Munt. 485. 487.
Muur. 281. 383.
——— (baſtard-) 188.
——— bloemen. 562.
——— Peper. 390.
——— (ruig-) 397.
——— Ruite. 852.
——— (water-) 281.
——— (zee-) 1076.

N.

Naakte Mannetjes 291.
——— Naarsjes. 291.
Naalde-Kervel. 265.
Nagel-bloemen. 393.
Nagel kruid. 441. 442. 639.
Nagt-ſchade. 208.
Nater-wortel. 353.
Navel-kruid. 243.
Neete-kruid. 23.
Neglantier. 428.
Neſtelen (zee-) 744.
Netelen (brand-) 788. 789.
——— (doove-) 493. 494. 497.
——— (honds-) 493.
——— (zuiker-) 493.
Nies-kruid. 738.
Nipt. 483.
Nooten (aard-) 249.
——— (Haaze-) 799.
——— (water-) 150.

O.

Olm-boom. 235.
Onderhave. 490.
Onze vrouwe-Diſtel. 657.
——— Mantel. 151.
——— Melk-kruid. 173.
Oogen-klaar. 444.
——— trooſt. 514. 515.
——— gras. 399.
Orant. 523. 525.
Orego (wilde-) 506.
Oſſe-tonge. 171. 177.
Oyevaars-bek. 575. 578.
——— neb. 265.

P.

Paapen-hoed. 211.
——— hout. 211.
——— kruid. 636.
——— muts. 211.
——— ſtoelen. 636.
Paarde-bloem. 516. 517. 636.
——— Caſtanie-boom. 333.
——— klaauw. 680.

Digitized by Google

Paarde-ſtaart. 747. 840-844.
Paarl-kruid. 169. 170.
Padde-bloem. 703.
—— gras. 314.
—— ſtoelen. 1034.
Palm (boom-) 787.
——(Maagden-) 218.
Panik-gras. 1068.
—— koorn. 57.
Parnas (Gras van) 282.
Partyke. 400.
Paſtinaken. 270.
Pater noſter-Wierd. 997.
Patigh. 323. 325.
Peen. 248.
Peerdick 323.
Peere-boom. 424.
Penning-kruid. 187.
Penſeen. 722.
Peper-boompje. 351.
——kruid. 536.
——(muur-) 390.
——(water-) 354.
—— wortel. 545.
Peppel-boom. 821-823.
Perſik-kruid. 355.
Peſtilentie-wortel. 681. 682.
Peterſelie (wilde) 251. 264.
——(zee-) 254.
Pimpernel. 796.
Pinxter-bloem. 32. 394. 550.
—— nakels. 270.
Pis in 't bed. 636.
Plompen. 180. 448. 449.
Pluim-riet-gras. 118.
Podde-bladen. 681. 682.
Poel-Ruit. 461.
Poley. 489. 509.
Pompe-bloemen. 448. 477.
Populier-boom. 821-823.
Porcelyn (wilde-) 387.
——(zee) 381. 382.
Poſt. 819.
Poſtel-bezien. 342.
Prang-wortel. 596.
Pruim-boom. 420.
——(ſlee-) 421.
Punge (beek-) 11.
——(water-) 11.
Purgeer-Vlas. 286.
Pyl-hout. 210.
Pyn-boom. 800.
Pyp-kruid. 268. 520.

Q.

Qualſter. 207.
—— boom. 423.
Queek. 127.
Quendel. 507.
Quetze-beyen-boom. 423.

R.

Raapen. 567. 568.
Raboorden. 753.
Radys (meer-) 545.
——(water-) 554.
Raket (ſteen-) 558.
——(water-) 553.
——(wilde-) 569.
——(zee-) 574.
Raponcen. 193. 194.
Ratelaar. 822.
Ratelen. 513. 520.
Reinette. 427.
Reur-kruid. 676. 715. 716.
Rhabarber (valſch-) 461.
Rhyn-bezien. 209.
Ridder-ſpooren. 452.
Ridders. 323. 325.
Ries-waart. 813.
Riet. 116.
—— gras. 38. 54. 755.
——(pluim-) 118.
Rinkel-Wikken. 606.
Rits. 355.
Robberts-kruid. 578.
Roer-kruid 676. 715. 716.
Rogge-bloemen. 710.
Roobol. 841.

Digitized by Google

Rooze-boom. 428-430.
——— (bal-) 277.
——— (duin-) 429.
——— (Eglentier-) 428.
——— (Gelderſche-) 277.
——— (Honds-) 430.
——— (klap-) 416.
——— (koorn-) 393. 446.
——— kransjes. 674.
——— (water-) 449.
——— (wilde-) 428.
Roowillig. 353.
Rottingen (boere-) 656.
Ruben. 568.
Ruite (muur-) 852.
——— (poel-) 461.
——— (ſteen-) 852.
——— (water-) 461.
Ruiters-kruid. 454.
——— (water-) 454.
Ruſſchen. 309.
Ryn-vaar. 667.

S.

Saffraan (veld-) 663.
Salade (mol-) 636.
——— (veld-) 31.
——— (wilde-) 634.
——— (zee-) 1006.
——— (zwyne-) 645.
Salie (wilde-) 479.
——— (veld-) 26.
Salomons-Zegel. 303.
Salſafi. 628.
Sanikel. 22. 244.
Sarraſyns-kruid. 741.
Schaaf-ſtroo. 844.
Scabieuſe. 135. 719.
Schaaps-teentjes. 683.
——— Zuuring. 328.
——— Scabieuſe. 719.
Scheele-oogen. 309.
Scheeren. 454.
Scheerling. 250. 263.
Scheit-bezien. 818.
Schel-kruid. 444.
Scheur-wortel. 174.
Schimmel. 1060.
Schorfte. 153.
Schot-kruid. 389.
Schurft-kruid. 134.
Scorpioen-kruid. 168.
Schotſche-Linde-boom. 837
Selderie (wilde-) 275.
Senegroen. 478.
Serpents-tongen. 795.
St. Anthonis-kruid. 527.
——— Raapje. 467.
St. Jacobs-kruid. 686.
St. Jans-kruid. 386. 624. 625.
St. Lamberts-nooten. 799.
St. Teunis-bloem. 334.
Slaap-bol. 447.
Slakken-kruid. 622.
Slange-kruid. 743.
——— wortel. 352.
Slee-doorn. 421.
——— pruim 421.
Sleutel-bloem. 179.
Slyen. 421.
Smeelje. 835.
Smeer-kruid. 530.
——— wortel. 174. 386.
Sneeuw-ballen. 277.
Sogge-Diſtel. 633.
Sophie-kruid. 556.
Sorbe-boom. 423.
Sorg-zaad-gras. 57.
Spaander-fungus. 1040.
Spaanſche Aak. 838.
Sparre-boom, 800,
Speen-kruid, 465, 526, 527.
Speer-kruid. 845.
Spinne-koorns. 422.
Sporckenhout. 210.
Sporckelle. 292.
Spring-kruid. 724.
Spurge. 408. 414. 416.
Spurrie. 384. 400.

tal-kruid. 596.
Standel-kruid. 725.
Startoffen. 650.
Steekel-bezien. 214.
——— Heide. 593.
Steen-breek. 169. 273. 274. 365. 426. 851.
——— doorſnydend-kruid. 152.
——— Klaveren. 616.
——— Lever-kruid. 937.
——— Mos. 895.
——— Raket. 558.
——— Ruite 852.
——— Violieren. 562.
——— zaad 169. 170.
Sterre-Diſtel 713.
——— kruid. 689.
Stevens-kruid. 6.
Stick-beſſen. 214.
Stikel-kreuſen. 454.
Stinck-bloem. 673.
Stincke-boom. 210.
Stinckende-Camille. 703.
——— Gouw. 444.
——— Kruis-kruid. 684.
——— Melde. 228.
——— Paarde-ſtaart. 747.
Stronk-bezien. 343.
Styfmoertjes. 721.
Suikerey. 619.
Suiker-Netel. 493.
Syringe (wilde-) 418.

T.

Tandpyn-wortel. 21.
Tartuffels. 1053.
Tasjes-kruid. 540. 546.
Thym (wilde-) 507.
Ton-beyen. 433.
Toortſen. 202.
Tormentille. 440.
Trillend-gras. 92.
Tripmadam. 388.
Tros-Lathyrus. 602.
Tuimel-Diſtel. 242.
Turren-kruid. 565.
Tydeloozen. 292.
Twee-blad. 734.

U.

Uit en tuis. 533.

V.

Valeriane. 29. 30.
Val-kruid. 695.
Varen. 847. 849. 853. 855.
Varkens-gras. 356.
——— Kers. 544.
——— Klaver. 612.
——— Venkel. 253.
Vaſten avond Zotjes. 291.
Veen-beſſen. 345.
——— hamels. 52.
Veld-Ajuin. 296.
——— Diſtel. 660.
——— Haanevoet. 470.
——— Klaver. 611. 621.
——— Munte. 488.
——— Orant. 523.
——— Saffraan. 663.
——— Salade. 31.
——— Salie. 26.
——— Zuuring. 327.
Veil (Aard-) 490.
——— (boom-) 215.
——— (water-) 749.
Venkel (varkens-) 253.
——— (zee-) 254.
Venus-Hair. 852.
Vergeet my niet, 168.
Vet. 31.
——— (Kievits-) 22.
Vettekoes. 31.
Vettik. 31.
Vincoorde. 218.
Vingerhoed-kruid. 528.

Violen. 721-723.
——— hout of boom. 837.
——— (water-) 182. 550.
Violieren (ſteen-) 562.
——— (water-) 182.
Viſſel-kruid. 538.
Vitzen. 603. 606.
Vlas-dotter. 533.
—— kruid. 524.
—— (Matte-) 52.
—— (purgeer-) 286.
—— (wild-) 285. 524.
—— (wolle-) 52.
Vlier-boom. 279.
——— (water-) 277.
——— (wilde-) 278.
Vlot-gras. 100.
Vogel-Kars. 418.
——— kruid. 281.
——— Melk. 296.
——— Neſt. 248.
——— Voet. 609.
Vogeltjes. 586.
Vokelaar. 698.
Volg my na. 727.
Vonk-hout. 1039.
Vorſche-beet. 825.
Voſſe-beſſen. 341.
——— kulletjes. 725.
Vrakel-beſſen. 826.
Vroegeling. 534.
Vrouwen-Diſtel. 657.
——— Hair. 867.
——— Mantel. 151.
——— Spiegel. 199.
Vuil-boom. 210.
Vuur-kruid. 556.
Vyf-vinger-kruid. 439.

W.

Waal-wortel. 174.
Wald-beſſen. 342.
Wallen-Diſtel. 242.
Walſtroo. 136. 137. 139.
Wambuis-knoopen. 697.
Wand-luis-kruid. 33.
Water Andoorn. 25.
——— Aſphodillen. 300.
——— Betonie. 527.
——— Biezen. 261.
——— Bloeizel. 1018.
——— Boelkens-kruid. 664.
——— Duizend-blad. 23. 793.
——— Drie-blad. 181.
——— Eppe. 258.
——— Gal. 400.
——— Galigaan. 761.
——— Gras. 768.
——— Haanevoet. 466.
——— Handekens-kruid. 730.
——— Kers. 550. 552.
——— Kervel. 262.
——— Klaveren. 181.
——— Knodſen. 753.
——— Kruiken. 449.
——— Linzen. 750.
——— Liſch. 358.
——— Look. 480.
——— Malrove. 25.
——— Muizen-oor. 168.
——— Munt. 487.
——— Muur. 281.
——— Navel-kruid. 243.
——— Nooten. 150.
——— Paarde-ſtaart. 842.
——— Paarl-kruid. 170.
——— Patigh. 325.
——— Peper. 354.
——— Plompen. 449.
——— Punge. 11. 200.
——— Radys. 554.
——— Raket. 553.
——— Ridders. 325.
——— Riet-gras. 782.
——— Roozen. 449.
——— Ruit. 461.
——— Ruiters. 454.
——— Scheerling. 263.
——— Slange-kruid. 743.

Scor-

Digitized by Google

Water Scorpioen-kruid. 168.
——— Speen-kruid. 527.
——— Varen. 847.
——— Veil. 749.
——— Violen. 182. 550.
——— Vlier. 277.
——— Vyfvinger-kruid. 443.
——— Wederik. 184.
——— Weegbree. 331. 332.
——— Wilg. 812.
Wederdood. 851. 867.
Wederik. 183. 184. 334.
Weegbree. 142. 143. 1066.
——— (Water-) 331. 332
Weerhout. 207.
Weeuwtjes. 201.
Weg-Diſtel. 661.
——— doorn. 209.
——— gras. 356.
Wervelen-hout. 805.
Wier of Wiert. 744. 997.
Wikken. 600. 603. 604. 606.
Wilde Angelica. 257.
——— Appelboom. 425.
——— Averuit. 668.
——— Bertram. 706.
——— Boekweit. 357.
——— Camille. 702.
——— Chriſtus-oogen. 295.
——— Cicorey. 644.
——— Cornoellie. 148.
——— Dragon. 706.
——— Eppe. 252 271.
——— Handekens-kruid. 730.
——— Hyacinthen. 305.
——— Karſſen-Boom. 419.
——— Kers. 561.
——— Kervel. 268.
——— Knollen. 568.
——— Kool. 566.
——— Latouw. 634.
——— Look. 291.
——— Majolyn. 506.
——— Moſtaart. 555.
——— Munt. 485.
Wilde Orego. 506
——— Oſſe-tonge. 177.
——— Paſtinaken. 270.
——— Peen. 248.
——— Peere boom. 424.
——— Penſeen. 723.
——— Peterſelie. 251. 264.
——— Pinxternakels. 270.
——— Poley. 509.
——— Porcelyn. 387.
——— Pruim. 420.
——— Pynboom. 800.
——— Raapen. 568.
——— Raket. 569.
——— Ridderſpooren. 452.
——— Rooze-boom. 428.
——— Salade. 634.
——— Salie. 479.
——— Selderie. 275.
——— Steen-zaad. 170.
——— Syringe. 418.
——— Thym. 507.
——— Veld-Saffraan. 663.
——— Violen. 722.
——— Vlas. 285. 524.
——— Vlier. 278.
——— Wikken. 606.
——— Wilge. 355.
——— Wyngaard. 801.
Wildemans-kruid. 455.
Wilg. 803. 804. 807-809. 812. 815. 1077.
——— wilde. 355.
Wind-bloem. 456.
Winde of Windom. 190-192.
——— (zwarte-) 357.
Winter-groen. 361.
——— Kers. 559.
Wipe-doorn. 430.
Wirf. 809.
Woert-haak. 596.
Wolfs-boonen. 386.
——— Klaauw. 858.
——— Melk. 411 412 414 416
——— veeſt. 1054.

Wol-

Wolle-gras. 52.
——— kruid. 202.
——— Vlas. 52.
Wolvenlaa. 173.
Wolverley. 695.
Wonder-boom. 205.
Wond-kruid. 597.
Worm-kruid. 667.
Woud-kruid. 386. 695.
Wouw. 405.
Wrange. 153.
——— kruid. 173.
Wyngaard (wilde). 801.

Y.

Ypen-boom. 235.
Yzer-Biezen. 310.
——— hard. 24.
——— kruid. 24.
Yzoop. 482.

Z.

Zaad-gras. 66.
Zand-kruid. 401.
Zee-Alſem. 669.
—— Aſter. 689.
—— Eike. 993.
—— grappe. 1.
—— gras. 283. 329.
—— —— (bloeiend-) 283.
—— Kraal. 1.
—— Kool. 192.
—— Kroos. 991.
—— Latouw. 1006.
Zee-Melde. 833.
—— Muur. 1076.
—— Neſtelen. 744.
—— Peterſelie. 254.
—— Porcelyn. 381-832.
—— Raket. 574.
—— Salade. 1006.
—— Spurrie. 384.
—— Sterre-kruid. 689.
—— Venkel. 254.
—— Wiert. 744.
—— Winde. 192.
—— Wolfs-Melk. 411.
Zeep-kruid. 368.
Zegeltjes. 303.
Zegge. 782.
Zenegroen. 478.
Zeven-blad. 276. 440.
——— jaars-bloem. 673. 674.
Zilver-kruid. 435.
——— ſchoon. 435.
Zinauw. 151.
Zonne-daauw. 288. 289.
——— Gierſt. 169.
——— wendend-Wolfsmelk. 412.
Zots-kapjes. 727.
——— kullekens 727, 728.
Zurkel. 327. 328.
Zuuring. 326-328.
——— (Klaver-) 391.
Zwaane-bloem. 358.
Zweſeriken 753.
Zwynen-Kers. 544.
——— Salade. 645.

Digitized by Google

By de UITGEVERS dezes zyn gedrukt, en, behalven verſcheiden anderen, van welken nog eenige voorraad is, te bekomen.

Röſel, (*J. A.*) Natuurlyke Hiſtorie der Inſecten, waarin de Dag- en Nacht-Vlinders in hunne Claſſen verdeeld, zo als ook de Kevers, Torren, Water-Inſecten, Springkhaanen, Krekels, Hommelen, Wespen, Muggen, Vloon, Vliegen enz. *Nauwkeurig beſchreeven en naar het leeven Gekoleurd en Afgebeeld zyn.* In groot 4°. op beſt Hollandſch Mediaan Schryfſpapier, zynde tans gevorderd tot het 4de Deel, beſtaande in 283 *Plaaten*, waaronder eenige *Dubbelde*, benevens drie *Titel Plaaten*, waarop eerlang het overige ten beſluite van het 4de Deel ſtaat te volgen.

Van het VERVOLG, door den Heer *Kleemann*, beſtaande tans in 44 keurige *Plaaten*, met derzelver juiſte beſchryving, gaande zo over IN - als - UITLANDSCHE KAPELLEN, welke tot het bovenſtaande Werk volſtrekt behoort, zal men den Liefhebberen zo dra doenlyk eenige Plaaten met de daartoe behoorende Letterdruk afleveren, *om dus doende den Bezitteren van dit fraaie Werk, dat tot dus ver nog geen weerga heeft, waarin de Inſecten van 't Ey tot den Vlinder, op het nauwkeurigſt onderzogt, naar het leven afgebeeld, en, volgens derzelver byzondere kenmerken, in eene geregelde Claſſenordening gebragt, beſchreeven zyn, volledig te bezorgen.*

Tyd-wyzer der Rupſen, vervattende, van maand tot maand, den tyd der verſchyning van de, door *Röſel* en *Kleemann*, beſchreeven en afgebeelde Rupſen, benevens haar voedzel. Ten nutte en dienſt der Liefhebbers opgeſteld, door den Heer *J. Mader*, en in 't licht gegeven door *Kleemann*, vermeerderd met een Lyſt der Planten volgens het ſamenſtel van Linnæus: groot 8. *f* 1:10:-
Het zelfde Werk beſt pap. *f* 2:-:-

Klee-

Kleemann, (*N. E.*) Dagverhaal der Reize, gedaan in de jaaren 1768, 1769 en 1770, van Weenen door Belgrado, Kilianova, Butſchiak-Tartarye, naar de Krim, en van daar over Kaffa naar Konſtantinopel en Smirna, en door den Archipel over Trieſt, naar Weenen te rug. Benevens eene Beſchryving der Merkwaardigheden van Krimſch Tartarye, de aangrenzende Landen, en derzelver Inwooneren. Naar den tweeden en Vermeerderden Hoogduitſchen druk in 't Nederduitſch Vertaalt, met Elf naar het Leven afgebeelde plaaten verſierd. groot 8. *f* 3:6:-

Luyken, (*J.*) Overvloeijend Herte, of nagelatene verzen, beſtaande in ſtichtelyke beſchouwingen en Geeſtelyke Overdenkingen, verrykt met Goddelyke Spreuken, over veelerleie ſoorten van onderwerpen, by verſchillende gelegenheden opgeſteld, vercierd met 86 plaaten 8 *f* 2:10:-
Het zelfde Werk groot pap. *f* 4:-:-

Weſterhoven, (*J van*) Den Schepper verheerlykt in de Schepzelen, of Verhandeling van alle geſchapene Dingen, voorgeſteld in zeven Zaamenſpraaken, onder Zomerſche Wandelingen, dienende wyders tot Lof van Haarlems vermaakelyke Landsdouwen, met naar 't Leeven afgebeelde konſtplaaten, vierde druk. groot 8. *f* 2:10:-

De Vriend der Kinderen, naar den tweeden Hoogduitſchen Druk vertaald, 4 deelen 8. *f* 2:16:-
Door 't herdrukken eeniger bladen zyn weder alle de Deelen apart te bekomen, except het 2de Deel. *Men leeze de onpartydige en oordeelkundige Recenſie in de* Alg. Vaderl. Letteroeffeningen, *eerſte deel N.* 8. *pag.* 329. *enz. als mede in de* Boekzaal der Geleerden *van October* 1779.

* * *

't Welgelykend Pourtrait des Heeren Profeſſor *D. de Gorter*, geſneden door den beroemden *Houbraken*, is mede apart à 12 ſtuivers te bekomen, om in 's Mans andere Werken geplaatſt te kunnen worden. —— Eenige, dog zeer weinige, eerſte Proefdrukken zyn mede op rojaal 4° gedrukt te bekomen.

Digitized by Google

PLANTARUM
BELGII CONFOEDERATI
INDIGENARUM
SPICILEGIUM.

Digitized by Google

Digitized by Google

PLANTARUM
BELGII CONFOEDERATI
INDIGENARUM
SPICILEGIUM,

Quo DAV. GORTERI viri cl. Flora VII. Provinciarum locupletatur,

A U C T O R E

STEPHANO JOANNE VAN GEUNS,

MED. ET PHILOS. CAND.

Nemo reprehenſus qui e ſegete ad ſpicilegium reliquit ſtipulam.

CATO de re ruſt. L. I.

HARDERVICI

APUD JOANNEM VAN KASTEEL, 1788.

Digitized by Google

Digitized by Google

PATRI

AMANTISSIMO

MATTHIAE VAN GEUNS,

MEDICINÆ DOCTORI, EJUSQUE IN ACADEMIA GELRO-ZUTPHANICA PROFESSORI PRIMARIO, PRAXEOS AUTEM ATQUE OBSTETRICIÆ, NEC NON BOTANICES AC CHEMIÆ ORDINARIO, REIPUBLICÆ GELRO-ZUTPHANICÆ ARCHIATRO, PLURIBUS DENIQUE ERUDITORUM SOCIETATIBUS VARIO NOMINE ADSCRIPTO,

VITÆ SUÆ AC STUDIORUM DUCI FIDELISSIMO,

PRÆCEPTORI OPTIMO,

HOC OPUSCULUM,
ANIMO PIO AC GRATO

AUCTOR
DICAT.

Digitized by Google

PRÆFATIO.

Septem fere anni effluxere, e quo plantarum patriæ noſtræ indigenarum indicem illum in lucem emiſit David de Gorter, vir cl., quem *Floram* VII *Provinciarum Belgii foederati indigenam* vocavit. Qui liber, natus ex alio quatuordecim annis ante hunc edito, titulo *Floræ Belgicæ*, ejusque *Appendice* & *Supplementis*, curâ ultima cl. Gorteri, accedente etiam ope plurium in patria Botanophilorum, perfectior ſic & caſtigatior prodiit.

Utraque autem hæc Flora vel ideo plenior eſſe credenda eſt in recenſione ſtirpium Gelricarum, maxime vero earum, quæ circa Hardervicum vegetant; tum quod Gorterus ipſe in hac regione

Digitized by Google

& urbe præcipue vixerit, rei herbariæ operam dederit, eamque, ipſo etiam Linnæo duce, excurſionibus botanicis perfecerit, maxime quando docendi etiam munus dein acceſſiſſet; cujus quidem diligentiæ teſtis eſt particularis hujus regionis plantarum notitia, quam A. 1745., titulo *Floræ Gelro-Zutphanicæ*, edidit, & *Appendice* A. 1757. auxit: tum quoque quod revera Hardervicenus ager Floræ indigenæ divitiis adeo ſpectabilis ſit, ut magis locupletem harum naturæ opum theſaurum in alio hujus regionis, & vel Belgicæ univerſæ, loco vix reperiri poſſe, cenſeamus.

Itaque quum ultimum edita illa, de qua dicere incepi, Gorteri Flora eo fere tempore prodierit, quo ipſe inter Medicinæ tirocinia, fideli Patris mei ductu atque inſtigatione, ad botanica quoque ſtudia animum appuli, eademque, uſu horti noſtri Academici, egregie inſtructi, lubens excolui, his naturæ deliciis captus, non alio duce magis idoneo, quam

Digitized by Google

Gorteri hoc libro, uti me poſſe credidi, ad inveſtigandas, etiam ipſo natali in ſolo, plantas ſponte apud nos creſcentes.

Eo autem tempore ſuſpicari vix poteram, vel in agro noſtro Harderviceno deprehenſurum me eſſe ſtirpes, quæ acutos illos Gorteri, ne dicam Linnæi, oculos fugiſſent; quamvis viri diligentiſſimi modeſtia ſpem talem, maxime quo ad cryptogamicas plantas, ſemel iterumque aluerit (*). Contigit tamen brevi, ut in unam alteramque plantam incurrerem, in Flora illa VII Provinciarum non notatam; qua quidem obſervatione excitato, plurium detegendi deſiderium continuo augebatur.

Neque juvenilem hunc impetum ſucceſſus retudit. Creſcebat enim indies repertarum ſtirpium, quibus Gorteri catalogus ſuppleri poſſet, numerus, ita ut, quum ad centenarium jam hic acceſſiſſet, animum facile ſubierit cogitatio,

(*) Vid. *Flor. Geld. Zutph. præf.* pag. penult., item *Flor. Belg. præſ.* pag. XIV., & *Flor. VII. Prov. præſ.* pag. II.

ſtirpium harum novarum notitiam, aliquam in lucem aliquando edendi, & Floram imprimis Gelro-Zutphanicam amplificandi plena ſtirpium omnium, quibus agrum Hardervicenum natura inſtruxit, recenſione. Solus enim hic ager auctarium illud Floræ mihi hactenus ſuggeſſerat, ipſiusque divitias, modo laudatas, tantas porro deprehendi, ut plantarum circa hanc urbem creſcentium numerus mihi pedetentim ultra 800 auctus fuerit, atque inter has vel 250 occurrerint, quarum nullam in Flora Gelro-Zutphanica, ejusve Appendice, (quibus tantum ſtirpes 580 vere Indigenæ continentur), mentionem fecerat cel. Gorterus.

Tam eximiam ergo Floræ fœcunditatem, quæ dulcis noſtra muſarum ſedes, Hardervicum, ad ſuum imprimis agrum botanophilos allicit, ecquis plena dignam non putaverit enarratione!

Hanc autem dum deinceps forte paraturi ſumus, nunc id prius agendum duximus, ut ſpicilegio hoc illas tantum of-

ferremus plantas, quæ a Gortero, inter plantas ſeptem patriæ univerſæ regionum indigenas, non fuere commemoratæ. Quo titulo igitur nunc 150 recenſemus plantarum ſpecies, quibus Gorteri illa ultima Flora ditetur & ſuppleatur.

Scilicet, poſt primas illas meas in agro Harderviceno excurſiones botanicas, in aliis quoque pluribus, & Gelriæ & aliarum provinciarum, locis, plantas indigenas dein inveſtigandi, ultraque etiam a Gortero omiſſas reperiundi, occaſio non defuit.

Neque defuere aliena ad hanc meſſem alteram ſubſidia; quo loco mihi inprimis laudandus eſt cl. Frid. Ehrhart, Botanicus regius Hannoveranus, oculatiſſimus plantarum, præcipue minorum & obſcurarum, ſcrutator (*), idemque indo-

(*) Teſtari hoc poſſunt tum bene multæ, quas detexit, novæ plantarum ſpecies, a Linnæo fil. & Hedwigio [illegible], tum varia ipſius viri cl. opuſcula, inter quæ *Phytopinacem Luneburgenſem*, & *Collectanea ad Hiſtoriam naturalem* (*Beiträge zur naturkunde*); quorum jam tria volumina prodierunt, ſufficiat nominaſſe.

lis ingenuæ candore, ac morum vitæque ſimplicitate venerabilis. Hic enim vir eximius, quando, aliquot abhinc annis, iter ſuum botanicum pedeſtre ad quasdam etiam Belgii regiones extendiſſet, hortumque noſtrum & noſtras oras diligenter viſitaret, in Patris mei amicitiam venit, mihique adeo ducem ſe & comitem facilis dedit, quocum agros noſtros et ſuburbia perquireret. Quo factum eſt, ut et primus ille meus botanices amor ultra exarſerit, et ipſe, quod gratus commemoro, ad examen cryptogamicarum aliarumque cognitu difficiliorum plantarum, in quibus Gorteri opera plurimum deficit, aptior evaſerim. Ehrhartus igitur, quum, in ipſo hoc itinere, plures a Gortero omiſſas plantas in Belgio inveniſſet, brevem earum enumerationem dein in *Promptuario Hannoverano* dedit (*), noſtratibus tamen vix notam. Hanc itaque opuſculo noſtro inſeruimus, prouti laudata a nobis Ehrhar-

(*) *Hannoveriſches Magazin* 1783, 12-18 *ſtück.*

ti auctoritas, plantas illas, quae ab ipſo repertæ ſunt, indicat.

Secutus fui in hoc libello ordinem atque rationem Floræ Gorterianæ, ut ipſi meſſi ſpicilegium eo melius accommodarem. Plantas igitur meas diſpoſui ad methodum Linnæi, & hujus viri ſummi characteres ſpecificos, ſubinde tamen ad naturæ obſervationem mutatos, ſingulis adſcripſi ex ultima, quam ill. Murray curavit, *Syſtematis Vegetabilium* editione. Plura quidem variorum auctorum ſynonyma Linnæano nomini & characteri, Gorteri exemplo, addere, facile profecto fuiſſet: ſed ratum habui his libelli molem non augere. Dum enim tironibus talia ſynonyma majorem fere parere confuſionem ſolent, quam veram illuſtrationem, rei herbariæ periti hæc facili opera, ſi tanti rem faciant, ex *Syſtemate Plantarum* Linnæi a Cl. Reichard edito, quod omnium teritur manibus, eruere poterunt. Illis vero ſtirpibus, quas recentiſſimorum auctorum induſtria ab eo tempore detexit vel extricavit, præ-

Digitized by Google

fixo aſteriſci ſigno diſtinctis, nomina impoſui & characteres auctorum illorum, qui primi illas Linnæana methodo definiverunt; atque his ſolis, quum in *Syſtemate Plantarum* non reperiantur, ſelecta quoque aliorum botanicorum ſynonyma addenda eſſe duxi. Quia denique una etiam alteraque plantæ ſpecies hic a nobis poſita ſit, quas fruſtra tum apud Linnæum, tum apud alios auctores botanicos quaeſivimus, has ipſi definire pro virili debuimus.

Quod ſupereſt, *quæ huic opuſculo deſunt ſuppleat ætas, & ſi quæ dicta ſunt juveniliter, pro indole accipiantur* (*).

Dab. Hardervici, Id. Sept.
MDCCLXXXVIII.

(*) Quintilianus *Inſt. Orat. L. XII.*

* * *
* *
*

Digitized by Google

PLANTARUM BELGII CONFOEDERATI INDIGENARUM SPICILEGIUM.

EX CLASSE II

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

1\. VERONICA floribus ſolitariis, foliis digitato partitis, pedunculis calyce brevioribus. *Linn. Syſt. vegetab.* gen. 25. ſpec. 36. *verna.*

Op zaailanden aan de Zandſteeg en elders by Harderwyk.

Digitized by Google

EX CLASSE III

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

fuſcus. 2. SCHOENUS culmo (ſubtriquetro) folioſo, ſpiculis ſubfaſciculatis, foliis filiformibus canaliculatis. *Syſt. veg.* 65. 5.

By Hengelo *en* Venbrug *in* Overyſſel (Ehrhart).

Op veenachtige lage heide-velden by Harderwyk.

Diſtincta omnino videtur ſpecies a ſequente, quacum tamen conjunxit Hudſonus. Bene illam nuperius deſcripſit Roth in *Beiträge zur Botanik II th. ſ.* 125.

albus. 3. SCHOENUS culmo ſubtriquetro folioſo, floribus faſciculatis, foliis ſetaceis. *Syſt. veg.* 65. 13.

Tuſſchen Zwol *en de* kleine Haar, *en tuſſchen* Hardenberg *en* Venbrug *in* Overyſſel (Ehrhart).

Op dezelfde gronden en plaatſen, als de voorgaande; niet zeldzaam op de lage heidevelden van de Veluwe.

DIGYNIA.

Canarienſis. 4. PHALARIS panicula ſubovata ſpiciformi, glumis carinatis. *Syſt. veg.* 74. 1.

Digitized by Google

Langs de wegen, aan meſthopen, en op de Stadswallen van Arnhem, Harderwyk, Naarden *en andere plaatſen.*

Hæc utique Floræ indigenæ inſerenda eſt, niſi velimus etiam *Ilicem Aquifolium*, *Linum uſitatiſſimum*, *Galanthum nivalem*, *Prunum domeſticam*, ipſum *Erigeron canadenſe*, ſimilesque ſtirpes, exoticas quondam, nunc vero civitatis jure donatas, excludere.

5. PANICUM ſpica tereti, involucellis unifloris fasciculato piloſis, ſeminibus nervoſis. *Syſt. veg.* 76. 5. *viride.*

By Heemze (Ehrhart).
Op zandige bouwlanden by Harderwyk, Putten, *en* Naarden.

Anne hæc eadem planta ac n. 34. *Floræ Gelro-Zutphanicæ p.* 12 & 243? Sic ſuadet ſynonymon C. Bauhini; ſed quare igitur poſtea in ſuis ſcriptis eam omiſerit Gorterus, non perſpicio.
Involucella non biflora. Neque calyx trivalvis.

6. AIRA foliis ſetaceis, vaginis angulatis, floribus ſubſpicatis, floſculis baſi ariſtatis. *Syſt. veg.* 81. 12. *præcox.*
By Hengelo (Ehrhart).
Veel by Harderwyk *op droge zandige plaatſen.*

Ariſta dorſalis contorta! Adeoque Avenæ ſpecies.

*7. POA panicula diffuſa, ſpiculis multifloris linearibus, culmo baſi ſubrepente, ſpicula- *maritima.*

Digitized by Google

rum glumis obtuſiſſimis. *Pollich hiſt. plantarum in Palatinatu Electorali ſponte naſcentium tom. I. p. 89.*

Aan het zee-ſtrand van de Zuider-zee by Nykerk, Harderwyk en Elburg.

Sit ne hoc gramen mera varietas Airæ aquaticæ, an vero diſtincta ſpecies ad Poæ genus referenda, uti Pollichius d. l. & Ehrhartus (*Beiträge zur Naturk.* 1 *band. ſ.* 68.) volunt, nondum certo conſtat. Mihi quidem, qui non ſemel in eodem Airæ aquaticæ, procul a mari creſcentis, ſpecimine, ſpiculas vidi & bifloras, & tri-, quadri-, quinque-, imo ſex-floras, prior ſententia probabilior videtur.

Poa maritima Rainvillii, quam cl. de Gorter (*Flor.* VII. *prov. n.* 87.) deſcribit, multis modis, non tamen omnibus, cum noſtra planta congruit. Doleo hujus ſpecimen, quod dubium ſolvere poſſet, non ſupereſſe in horto ſicco Gorteriano, cujus copiam Academiæ huic nuper fecit cl. viri vidua.

rubra. 8. FESTUCA panicula ſecunda ſcabra, ſpiculis ariſtatis, floſculo ultimo mutico, culmo ſemitereti. *Syſt. veg.* 88. 3.

Op droge zandige plaatſen langs de wegen by Harderwyk.

maritimum. *9. HORDEUM floſculis lateralibus (maſculis &) ſpuriis ariſtatis, involucris (omnibus) ſcabris. *Oeder in explic. tab.* 630 *ſuæ*

Floræ Danicæ, *Roth Beiträge zur Botanik* II *th. ſ.* 97.
Gramen ſpicatum ſecalinum maritimum minus. *Tournef. Inſt. rei herb. t.* I. *p.* 518, *Scheuchzer Agroſtogr. p.* 18. *n.* 4.
Gramen ſecalinum paluſtre & maritimum. *Rai Catal. plant. Angl. p.* 152., *Synopſ. method. ſtirp. Britann. p.* 242., *Hiſt. plant. vol.* II. *p.* 1258.

Veel op de hooilanden aan het zee-ſtrand tusſchen Harderwyk *en* Nykerk.
„ Invenitur menſe Majo & Junio in maritimis Belgii ", Scheuchzer l. c.

Recte jam Raius l. l. dixit, differre ab Hordeo ſpurio, i. e. *murino*, quod culmus ſit procerior & gracilior, ariſtæ breviores. Idem confirmant icon præclara Oederi, & diſtinctionis notæ a Rothio d. l. exhibitæ; antherarum tamen quod ille delineat, hic deſcribit, diſcrimen, nullum obſervare potui. Neque omnes floſculi laterales ſpurii & inanes ſunt, uti iidem volunt, ſed illi tantum qui ſuperiorem ſpicæ partem tenent.
Non commemoratur a Linnæo, uti recte dixerunt ill. Hallerus *in Append. I. ad Scheuchz. Agroſtogr. p.* 4., & Rothius d. l. Quam enim huc pertinere contendit Ehrhartus (*Beitr. zür Naturkunde III b. ſ.* 155.), varietas β Hordei murini Linn., referenda eſt ad *Hordeum ſecalinum* Schreberi.

*10. HORDEUM floſculis lateralibus maſculis (& ſpuriis) ariſtatis, involucris ſeta- *ſecalinum.*

ceis ſcabris. *Schreber ſpicileg. Floræ. Lipſ. p.* 148.
Hordeum murinum β. *Linn. Fl. Suec. ed.* 2. *n.* 113., *Spec. plant. t.* 1. *p.* 126.
Gramen ſpicatum ſecalinum minus. *Tournef. d. l.*, *Scheuchz. Agroſtogr. p.* 17. *n.* 3., *Vaillant. Botan. Pariſ. p.* 83. *tab.* 17. *f.* 6.
Hordeum ſpicis diſtichis, folliculo brevi, glumis calycinis ariſtatis. *Haller Hiſt. ſtirp. Helv.* n. 1538.
An Hordeum murinum microſtachyon *Ehrharti? Conf. Hannov. Magaz.* 1780. 14 *ſtück.*

Op Doreweerd *in* Gelderland.

Simillimum præcedenti gramen; neque ſpecie ab eo differre, mihi, cui utriusque plantæ plurima ſpecimina colligere & conferre licuit, videtur. Separat tamen Scheuchzerus, quem Hallerus (*l. c. & Append. ad Scheuchz. Agroſt. p.* 4.) ſequitur. Hic vero non conſpexiſſe videtur Hordeum maritimum; ille ſæpiſſime, ſpecierum nomine, varietates deſcribit.

TRIGYNIA.

umbellatum. 11. HOLOSTEUM floribus umbellatis. *Syſt. veg.* 104. 4.

Niet zeldzaam in 't voorjaar op zandige bouwlanden by Harderwyk.

In noſtris ſpeciminibus vidimus ſtamina 3 vel 5,

nec 4, ſtylos ſemper 3, petala inæqualiter tridentata, pedunculos 6-12. Alium harum partium numerum & figuram obſervarunt Loefling, Linnaeus, Heiſter, Pollich, Leers, alii.

EX CLASSE IV

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

12. Galium foliis ſenis obovatis obtuſis, caule ramoſiſſimo procumbente *Syſt. veg.* 125. 8. *ſaxatile.*

Aan droge wallen by Harderwyk (Ehrhart).

DIGYNIA.

13. Cuscuta floribus ſeſſilibus quinquefidis, bracteis obvallatis. *Syſt. veg.* 170. 2. *Epithymum.*

Vry gemeen op de heide-velden van de Veluwe, Gooiland, Utrecht *en* Friesland, *om de heide-ſtruiken geſlingerd, of over dezelve uitgeſpreid.*

Gorterus noſter hanc non diſtinxiſſe videtur a vulgari C. europæa. Conf. loca natalia hujus, quæ deſcribit *Floræ VII. prov. n.* 153. Meeſius itidem utramque confudit; vid. *Flor. Friſ.* n. 71.
Flores pentandri.

Digitized by Google

TETRAGYNIA.

grami-neum. 14. POTAMOGETON foliis lineari-lanceolatis alternis ſeſſilibus ſtipulâ anguſtioribus. *Syſt. veg.* 174. 10.

Tuſſchen Hardenberg *en* Venbrug, *en by* Heemze (Ehrhart).

marinum. 15. POTAMOGETON foliis linearibus alternis diſtinctis inferne vaginantibus. *Syſt. veg.* 174. 11.

Te Harderwyk *in de Stadsgraft by de Zee.*

EX CLASSE V

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

Belladon-na. 16. ATROPA caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Syſt. veg.* 249. 2.

Raram cæterum hanc, quod minime dolemus, neque antea in Belgio repertam, ſtirpem, in tractu tamen Oldamptino Provinciæ Groninganæ non deeſſe, ſingulari caſu detectum fuit. Conf. cl. S. J. Brugmans *Diſſert. de plantis inutil. & venenatis pratorum p.* 30.

DIGYNIA.

Amarel-la. 17. GENTIANA corollis quinquefidis hypocra-

Digitized by Google

teriformibus, fauce barbatis. *Syſt. veg.* 322. 33.

In de duinen by Scheveningen *en* 's Gravenhage (Ehrhart).

18. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus, caule dichotomo filiformi. *Syſt. veg.* 322. 38. *filiformis.*

Op lage heide-gronden op de Veluwe, *onder andere kleine planten, als* Scirpus ſetaceus, Linum Radiola, Blaſia, Anthoceros *en diergelyken, als by* Harderwyk *aan 't eind van de hoge Sypel en Zandſteeg, en by* Vanenburg.

Tuſſchen Poppen *en* Hengelo, *en tuſſchen* Zwolle *en de* kleine Haar (Ehrhart).

Flores ſemper tetrandri monogyni.

19. SIUM foliis pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis, involucro univerſali pinnatifido. *Syſt. veg.* 348. 2. *anguſtifolium.*

In verſcheide ſlooten en beeken by Harderwyk, *als aan het eind van de hooge Sypel, in* Tonſel *en aan de* Nykerker *weg.*

Eſt *Sium nodiflorum* a Gortero in Flora VII. Prov. recenſitum; quod non tantum ex loco natali, ibi commemorato, diu ſuſpicatus fueram, ſed quod ex ipſo viri cl. horto ſicco manifeſtum eſt, ubi, nomine Sii nodiflori, Sium anguſtifolium aſſervatur. Non rarus eſt inter Botanicos hic error,

Digitized by Google

quum etiam Hallerus (*Hiſt. ſtirp. Helv. n.* 778), Weigelius (*Obſerv. botan. p.* 26.), Retzius (*Obſerv. botan. faſc.* I. *p.* 16.), & Oederus (*Flor. Dan. tab.* 247.) Sium noſtrum anguſtifolium vocent nodiflorum.

graveolens. 20. ANETHUM fructibus compreſſis. *Syſt. veg.* 364. 1.

By Zutphen (de Gorter *Flora Zutphanica p.* 21.).

An vere indigena?

EX CLASSE VI

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

multiflora. 21. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis multifloris. *Syſt. veg.* 425. 7.

By Harderwyk *op ſchaduwachtige plaatſen in de bosſchen.*

By Heemze (Ehrhart). *By* Overveen *in de duinen* (Loosjes *Flora Harlemica n.* 82., quem tamen locum Gorterus, adſignat C. Polygonato.)

Attenta partium & attributorum in loco natali inſpectio omnino comprobare videtur, hanc ſpecie non diſtinctam eſſe a Convallaria Polygonato. Eadem antea Linnæo ſtetit ſententia. „ Varie-

Digitized by Google

„ tates, " inquit, „ hæ ſatis manifeſtæ & evi-
„ dentes ſunt; ſpecie tamen non diſtinctas eſſe,
„ docuit attenta inſpectio partium & attributo-
„ rum in loco natali. Diſtinguat itaque eas,
„ qui velit; ego convictus ſum, quod ſpecie di-
„ ſtingui non debeant, licet pedunculi in aliis
„ uniflori, in aliis multiflori ſint." Vid. *Hort. Cliffort. p.* 125. Miror igitur, deinde ſententiam mutaſſe virum ill.

*22. JUNCUS annuus, culmo ramoſo paniculato, floribus ſolitariis ſeſſilibus, petalis ovato oblongis, capſula ſubgloboſa. *Linn. fil. Supplem. plantar. p.* 208. *Tenageia.*
Juncus foliatus minor, floribus per ramum ſparſis. *Vaillant. Botan. Pariſ. p.* 109. *tab.* 20. *f.* 1.

By Delden *en* Hengelo (Ehrhart).

Novam hanc ſpeciem primus deſcripſit, & cl. Linnæo ſuppeditavit Ehrhartus. Mirari autem hac occaſione ſubit, ill. Murraium novæ ſuæ Syſtematis vegetabilium editioni, neque hanc inſeruiſſe plantam, neque plurimas alias, quas a cl. Ehrhart, ſibi indicatas, Supplemento plantarum inſerere nullus dubitaverat Linnæus filius.

*23. JUNCUS culmo nudo filiformi, foliis ſetaceis erectis, capitulis terminali lateralique ſubfolioſis. *tenellus.*

Op vogtige plaatſen op de heide-velden by Harderwyk.

Digitized by Google

Diverſa a Linnæanis Junci ſpeciebus. Proxime autem ad noſtram accedunt:

Juncus caule brachiato, foliis ſetaceis, floribus faſciculatis ad ramos ſeſſilibus. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 1320. Sed culmus noſtræ ſimplex eſt, non brachiatus.

Juncus (*capitatus*) foliis ſetaceis, capitulis terminali alarique ſubfolioſis, petalis acutis integris, pericarpio æqualibus. *Weigel Obſerv. botan. p.* 28. — Sed non ſemper adeſt capitulum alare, magisque accedit ad Juncum ſquarroſum quam ad bufonium; neque icon *tab.* 2. *f.* 5. noſtræ ſatis reſpondet.

Juncus (*ericetorum*) culmo nudo filiformi, foliis linearibus canaliculatis, capitulo ſubrotundo ſeſſili terminali triphyllo. *Pollich hiſt. plant. palat. n.* 350. Sed noſtra non ſemper unicum habet capitulum terminale, neque occurrit in pratis ſiccis ſabuloſis.

nemoroſus. *24. JUNCUS foliis planis piloſis, floribus faſciculatis. *Pollich d. l. n.* 350.

Juncus planifolius umbellatus, petalis aequalibus. *Haller hiſt. ſtirp. Helv. t. II. n.* 1327.

Gramen hirſutum anguſtifolium majus. *C. Bauh. Pin. p.* 7, *Scheuchz. Agroſtogr. p.* 318.

In het Puttenſche *en* Spulder *bosch op de* Veluwe.

Sitne hæc vere diſtincta ſpecies, an vero varietas Junci piloſi, dubitaverim.

Trigynia.

*25 Rumex floribus hermaphroditis, valvulis linearibus obtuſis integerrimis graniferris, verticillis remotis, ramis patentibus, foliis inferioribus cordato lanceolatis. *Linn. fil. Suppl. Plant. p.* 212. *Nemolapathum.*

Rumex (glomeratus) floribus hermaphroditis, ad alas foliorum conglomeratis, foliis lanceolatis integerrimis. *Boehmer Flor. Lipſ. p.* 240. *n.* 576. *& Schreber conſpect. floræ Lipſ.*

Rumex conglomeratus. *Leers Flor. Herborn. n.* 275. *& Murray prodr. deſign. ſtirp. Götting. p.* 52. Nullam tamen vir ill. ejus mentionem facit in Syſt. vegetab.

An Lapathum Hydrolapathum? *Scopoli flor. Carniol. n.* 442.

Rumex criſpus β. *Pollich l. c. n.* 356.

Rumex acutus β. *de Gorter flora* VII. *prov. n.* 323.

Lapathum petiolis lateſcentibus, foliis longe lanceolatis, floribus verticillatis verrucoſis. *Hall. l. c. n.* 1590.

Lapathum minimum. *C. Bauh. pin. p.* 115.

Lapathum acutum minimum. *J. Bauh. hiſt. t. II. p.* 985.

Op verſcheide plaatſen aan de kanten van ſlooten, als by Harderwyk, *en aan de kant van trekvaarten in* Holland.

By Hengelo (Ehrhart).

Digitized by Google

POLYGYNIA.

natans. 26. ALISMA foliis ovatis obtuſis, pedunculis ſolitariis. *Syſt. veg.* 460. 5.

In ſlooten by Delden *en* Hengelo (Ehrhart).

EX CLASSE VIII

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

multiflora. 27. ERICA antheris muticis exſertis, corollis cylindricis, ſtylis exſertis, foliis quinis, floribus ſparſis. *Syſt. veg.* 484. 71.

By Harderwyk (Linnæus *Flora Belgica, in Amœn. Acad. vol. VI. p.* 52.).

TRIGYNIA.

dumetorum. 28. POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili lævi, floribus carinato alatis. *Syſt. veg.* 495. 30.

Vry gemeen in Gelderland *aan de heggen der tuinen, en tusſchen het hakhout.*
Op ſommige plaatſen in Overysſel (Ehrhart).

Huc pertinet Convolvulum nigrum *Dodon. pempt. p.* 396. quod ſynonymon Gorterus refert ad Polygonum Convolvulum, a quo noſtram ſpeciem

non ſatis diſtinxiſſe v. cl., patet inſuper ex loco natali, quem P. Convolvulo tribuit „ *in heggen*;" atqui in ſepibus hæc non creſcit,

EX CLASSE X

DECANDRIA.

DIGYNIA.

29. CHRYSOSPLENIUM foliis oppoſitis, *Syſt. Veg.* 558. 2. *oppoſitifolium.*

Habitat in Belgio (Linnæus *Syſt. plant. t. II. p.* 308.).

30. DIANTHUS floribus ſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. *Syſt. veg.* 565. 10. *deltoides.*

By Zwol (Ehrhart).

TRIGYNIA.

*31. STELLARIA foliis lanceolatis, petalis bipartitis, calycem longitudine æquantibus. *Pollich d. l. n.* 422. *aquatica.*
Alſine foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petiolis unifloris. *Haller Helv. n.* 885.

An Alſine folio gramineo anguſtiore, paluſtris. *Dillen. Append. p.* 69., quæ Linnæo varietas eſt Stellariæ gramineæ? Eſt autem S. aquatica vere ab hac diſtincta ſpecies.

Digitized by Google

Aan het eind van de hoge Sypel, aan de Weibeek, en elders op vogtige plaatſen by Harderwyk.

Tuſchen Hardenberg *en* Venbrug *in* Overysſel (Ehrhart).

PENTAGYNIA.

reflexum. 32. SEDUM foliis ſubulatis ſparſis baſi ſolutis, inferioribus recurvatis. *Syſt. veg.* 579. 11.

Aan den voet der bergen langs den Rhyn by de Doreweerd, *en op de wallen en fortificatien van* Naarden.

Varius petalorum & ſtaminum numerus, ſtyli & capſulæ plerumque 6-9, evidenti ſunt argumento, ſeparationem generum Sedi & Sempervivi eſſe mere artificialem, imo ne quidem in ſyſtemate plantarum artificiali bene procedere.

aquaticum. 33. CERASTIUM foliis cordatis ſeſſilibus, floribus ſolitariis, fructibus pendulis. *Syſt. veg.* 585. 13.

By Zandvoort, Muiden, Muiderberg, *aan de* Helder *en op* Texel.

Conf. de Gorter *Flor. Belg. n.* 376, ubi hanc plantam recenſet; omiſit autem iterum in Flora VII. Prov., motus quibusdam, manu Chirurgi Alcmarienſis Timmer ſcriptis, animadverſionibus, quæ tamen parvi ponderis eſſe videntur (Conf. *Flor. VII. Prov. Plant. dub. n.* 1076.); & quidquid de-

mum de illis ſit, tum ipſe Ao. 1784. *aan de Helder*, tum Ao. 1782. cl. Ehrhart *by Muiden* genuinum Ceraſtium aquaticum Linn. invenimus.

34. SPERGULA foliis verticillatis, floribus pentandris. *Syſt. veg.* 586. 2. *pentandra.*

Hier en daar by Harderwyk *en* Haarlem. *In* Vriesland *onder de gemeene Spurrie* (Meeſe).

EX CLASSE XI

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

35. ASARUM foliis reniformibus obtuſis binis. *Syſt. veg.* 589. 1. *europaeum.*

Boerhaavius indigenam eſſe ſignificavit. *Ind. alt. plant. hort. L. B. T. II. p.* 95. „ Creſcit in umbroſis opacis ſepibus, praeſertim corylaceis, in variis locis Hollandiæ ”, Linnæus *Hort. Cliffort. p.* 178.; vid. & *Floram Belg.* in *Amoen. Acad. t. VI. p.* 52.

TRIGYNIA.

*36. EUPHORBIA umbella multifida dichotoma, involucellis ſubcordatis, petalis integris, foliis lineari lanceolatis ſubimbricatis acutis glaucis. *campeſtris.*

Zeer veel aan den Yſſeldyk *by* Campen, Deventer, Zutphen *en* Voorst.

Proxime ad noſtram accedunt, neque tamen in omnibus conveniunt:

Euphorbia Eſula *Pollichii, t. II. n.* 460.

Euphorbia Paralias *Scopolii, Flor. Carniol. n.* 581.

Euphorbia Cajogala *Ehrharti, Hannov. Magaz.* 1783. 14 *ſtück, Beiträge II. b. ſ.* 102.

Tithymalus foliis linearibus ariſtatis imbricatis, ſtipulis umbellaribus ovato lanceolatis, floralibus cordatis. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 1055., quod Synon. ad Euph. Paraliam refertur in *Syſt. Plant.*

Eſt fere intermedia ſpecies inter Euphorbiam *Eſulam* & Paraliam, ab utraque tamen probe diſtinguenda. Creſcunt jam per plures annos hæ tres ſpecies in horto noſtro Academico, neque una in alteram, ſatione aliquoties a me inſtituta, tranſiit.

EX CLASSE XII

ICOSANDRIA.

DIGYNIA.

monogyna. *37. CRATÆGUS foliis ſubtrifidis acutis, floribus monogynis. *Jacquin Flor. Auſtr. vol. III. t.* 292. *f.* 2. *Syſt. veg.* 622. 10.

Op dezelfde plaatſen, als de gemeene Haagdoorn (Cratægus Oxyacantha); *gemeen by* Harderwyk.

Digitized by Google

Pro nova ſpecie deſcripſit JACQUINUS. Pace tamen viri ill., non differre videtur a C. Oxyacantha, niſi numero ſtylorum; ſed ut in plurimis hujus claſſis arboribus numerum hunc variare, res eſt notiſſima, ſic quoque plura vidi ſpecimina C. Oxyacanthæ floribus trigynis. Anne igitur hæc etiam ad diſtinctam ſpeciem erunt referenda? Sed & vidi in eadem arbore ſæpius flores alios monogynos, alios digynos, adeoque, juxta Jacquinum, duas has ſpecies in eadem ſtirpe conjunctas.

POLYGYNIA.

38. ROSA germinibus globoſis petioliſque aculeatis, aculeis recurvis, foliis ſubtus rubiginoſis. *Syſt. veg.* 631. 2. *rubiginoſa.*

Aan zee-kant by Harderwyk, *op* Doreweerd, *langs de weg tusſchen* Nymegen *en* Arnhem, *by* Velzen, *en elders by* Haarlem.

Roſam Eglanteriam cum noſtra confudiſſe videtur cl. de Gorter (*Flor.* VII *prov. n.* 428.). Idem alii botanici plurimi fecerunt.

39. FRAGARIA caule decumbente, (ſeminibus receptaculo exſucco affixis). *Syſt. veg.* 633. 3. *ſterilis.*

By Harderwyk *in het Ribbenboſchje.*

Demonſtrat hæc planta, arte, non naturâ, diſtincta eſſe Fragariæ & Potentillæ genera.

Digitized by Google

EX CLASSE XIII

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

dubium. 40. PAPAVER capſulis oblongis glabris, caule multifloro, ſetis appreſſis, foliis pinnatifidis inciſis. *Syſt. veg.* 648. 6.

Op zandige bouwlanden en wegen by Arnhem, Harderwyk, Haarlem, Naarden, Noorddorp, Groningen, *en andere plaatſen.*

EX CLASSE XIV

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

hirſuta. 41. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis ſerratis ſubſeſſilibus pubeſcentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Syſt. veg.* 713. 7.

Habitat in Hollandia (Linnæus *Syſt. plant. t. III. p.* 43.).

* * *
* *
*

Digitized by Google

EX CLASSE XV

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

42. MYAGRUM ſiliculis lentiformibus orbiculatis punctato rugoſis. *Syſt. veg.* 796. 8. *paniculatum.*

In de koornlanden by Emaus *buiten* Harderwyk.

SILIQUOSA.

43. ISATIS foliis radicalibus crenatis, caulinis ſagittatis, ſiliculis oblongis. *Syſt. veg.* 824. 1. *tinctoria.*
Weede Belg.

In Holland, *vooral op de duinen* (van Berkhey *Verhand. van de Holl. Maatſch.* VIII *d. bl.* 116.). *In* Noord-Holland (van Hazen *Verh. v. d. Holl. Maatſch.* XIX *d.* 1. *ſt. bl.* 271.). *Op de bouwlanden van* Vriesland (Brugmans *Orat. de plant. indig. accurat. not. max. commend. p.* 36.).

44. CRAMBE foliis cauleque glabris. *Syſt. veg.* 825. 1. *maritima.*

Op het uiterſte der ſtranden van Holland (Dentan *Verhand. van de Holl. Maatſch.* XIX *d.* 3 *ſt. bl.* 31.).

Digitized by Google

EX CLASSE XVII

DIADELPHIA.

OCTANDRIA.

amara. 45. **POLYGALA** floribus criſtatis racemoſis, caulibus erectiuſculis, foliis radicalibus obovatis majoribus. *Syſt. veg.* 851. 5.

Op ſchrale gras-landen en lage heide-velden; by Harderwyk *op de Gagel-kampen, en by* Hartskamp *op de* Veluwe.

Equidem conjungendam iterum putaverim cum Polygala vulgari; vidi enim plura ſpecimina inter utramque quaſi ſpeciem media; & Polygalæ vulgaris in horto cultæ folia radicalia latiora fiunt, ita ut vix ab amara dignoſcantur.

DECANDRIA.

ſpinoſa. *46. **ONONIS** floribus racemoſis ſolitariis, foliis ternatis ſolitariisque, ramis ſpinoſis. *Murray Syſt. veg.* 862. 2.

Anonis ſpinoſa flore purpureo. *C. Bauh. Pin. p.* 389.

Anonis. *Dodon. Pempt. p.* 743.

Ononis arvenſis *α*, *β*. *Gorter Flor.* VII. *prov. n.* 596.

Veel langs de wegen, dyken en bouwlanden, en op ſchrale weilanden.

A Gortero noſtro, ut olim a Linnæo, refertur ad

Digitized by Google

Ononidem arvenſem; a qua tamen ſpecie hanc differre, plurimi hodie, & inter hos Murraius quoque, contendunt; num recte? dubitare liceat.

47. Pisum petiolis ſupra planiuſculis, caule angulato, ſtipulis ſagittatis, pedunculis multifloris. *Syſt. veg.* 870. 3. *maritimum.*

Creſcit in littoribus Belgii (Linnæus *Hort. Cliffort. p.* 369.).

48. Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, ſtipulis lanceolatis. *Syſt. veg.* 872. 20. *paluſtris.*

In de Ooſter-mehen by Harderwyk.

49. Trifolium ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, caulibus procumbentibus. *Syſt. veg.* 896. 43. *procumbens.*
Rys-klaver Hardervicenis.

Langs het zee-ſtrand by Harderwyk *en* Doornſpyk.

50. Trifolium ſpicis ſubimbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus pedicellatis, caulibus procumbentibus. *Syſt. veg.* 896. 44. *filiforme.*

By Elburg, Bysſelt *en* Oldebroek *op de* Veluwe.

Simile admodum præcedenti, quocum recte, quantum video, junxit ill. Hallerus (*Hiſt. ſtirp. Helv. n.* 364.), qui cæterum augere magis amat, quam imminuere ſpecierum numerum.

EX CLASSE XVIII

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

montanum. 51. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ſerrato glandulofis, caule tereti erecto, foliis ovatis glabris. *Syſt. veg.* 902. 29.

Op de bergen langs den Rhyn; *op* Doreweerd.

pulchrum. 52. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ſerrato glandulofis, caule tereti, foliis amplexicaulibus cordatis glabris. *Syſt. veg.* 902. 35.

In de boſſchen van Doreweerd *en* Staverden *op de* Veluwe.

EX CLASSE XIX

SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

hirtum. 53. LEONTODON calyce toto erecto, foliis dentatis hirtis, ſetis ſimpliciſſimis. *Syſt. veg.* 912. 2.

Digitized by Google

Langs de wegen en op de gras-landen aan zee-kant by Harderwyk.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

54. INULA foliis amplexicaulibus ovatis rugoſis ſubtus tomentoſis, calycum ſquamis ovatis. *Syſt. veg.* 956. 1. *Helenium.*

Op vogtige plaatſen by Almelo.
Creſcit in pratis ſucculentis & humidioribus per Belgium (Linnæus *Hort. Cliffort. p.* 407. *Syſt. plant. vol. III. p.* 824.). Indigenam ſtirpem eſſe, etiam Boerhaavius ſignificavit (*Ind. alt. horti Lugdb. tom. I. p.* 94. *n.* 1.).

55. CHRYSANTHEMUM foliis pinnatis multifidis, caule ramoſo diffuſo. *Syſt. veg.* 966. 10. *inodorum.*

By Harderwyk, Elburg *en* Nykerk *aan de wegen, vooral aan zee-kant.*

EX CLASSE XX

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

56. OPHRYS bulbis aggregatis oblongis, caule ſubfolioſo, floribus ſpirali ſecundis, nectarii labio indiviſo crenulato. *Syſt. veg.* 1011. 3. *ſpiralis.*

By Hengelo *in* Overyſſel (Ehrhart).

Digitized by Google

EX CLASSE XXI

MONOECIA.

TRIANDRIA.

ſylvatica. *57. CAREX ſpicis pendulis, maſcula erecta, femineis filiformibus pedunculo brevioribus, capſulis acutis diſtantibus. *Hudſon. Flor. Angl. p.* 353. *n.* 22.
Carex veſicaria β. *Syſt. plant. t. IV. p.* 114., ubi ſynonyma enumerantur.

Op de Gagel-kampen by 's Heeren-loo, *niet verre van* Harderwyk.

Jure hanc a Carice veſicaria diſtinguunt hodie botanici tantum non omnes.

SYNGENESIA.

dioica. *58. BRYONIA foliis palmatis utrimque calloſo ſcabris, floribus dioicis. *Jacquin Flor. Auſtr. vol. II. p.* 59, *Syſt. veg.* 1093. 2.
Bryonia alba. *Pollich Palat. n.* 915, *Leers Herborn. n.* 744, *Hudſon Flor. Angl. ed.* 2. *p.* 337.
Bryonia foliis palmatis utrimque calloſo ſcabris. *Haller. Helv. n.* 547.
Bryonia aſpera ſ. alba baccis rubris. *C. Bauh. Pin. p.* 297.
Vitis alba ſive Bryonia. *J. Bauh. Hiſt. v. II. p.* 243.
Bryonia alba. *Dodon. Pempt. p.* 399.

Digitized by Google

Multis in Belgio locis reperitur (Dodonæus l. c.).

Aan de heggen der tuinen en langs de wegen op ſchaduwachtige plaatſen by Harderwyk.

Ad hanc ſpeciem plura ſynonyma & loca natalia pertinent, a Gortero relata ad Bryoniam albam, a qua noſtram non ſatis diſtinxit vir. cl. In *Flora* enim VII. *prov. n.* 801., dicit ſuam plantam monoicam eſſe, & baccas nigras ferre; excitat autem eodem loco *Floram Gelro-Zutph. n.* 536, ubi expreſſe dicit, dioicam eſſe.

En autem genuina Bryoniæ albæ ſynonyma, quæ Gorterianis ſubſtitui queant:

Bryonia alba. *Scopoli Fl. Carn. n.* 1200.
Bryonia nigra. *Dodon Pempt. p.* 395.
Bryonia alba baccis nigris. *C. Bauh. Pin. p.* 297.
Vitis ſ. Bryonia nigris baccis. *J. Bauh. Hiſt. vol.* 2. *p.* 146.

EX CLASSE XXII

DIOECIA.

DIANDRIA.

59. SALIX foliis ſerratis glabris, floribus triandris. *Syſt. veg.* 1098. 2. *triandra.*

By Hengelo (Ehrhart).

60. SALIX foliis integerrimis utrinque villoſis obovatis appendiculatis. *Syſt. veg.* 1098. 22. *aurita.*

C 5

By Hengelo (Ehrhart).

incubacea. 61. SALIX foliis integerrimis lanceolatis ſubtus villoſis nitidis, ſtipulis ovatis acutis. *Syſt. veg.* 1098. 26.

By Oldebroek *op de* Veluwe (Ehrhart).

repens. 62. SALIX foliis integerrimis lanceolatis utrinque nudiuſculis, caule repente. *Syſt. veg.* 1098. 27.

Aan het eind van de hoge Sypel, en elders op zandige vogtige plaatſen by Harderwyk.

EX CLASSE XXIV

CRYPTOGAMIA.

MUSCI.

ſubulatum. 63. PHASCUM (cauleſcens), foliis (lineari-) ſetaceis patulis. *Syſt. veg.* 1189. 3.

Op de bouwlanden in het voorjaar by Harderwyk.

Neque ipſa planta acaulis, neque capſula ſeſſilis eſt. — In unico ſurculo non ramoſo binas ſemel vidi capſulas.

muticum. *64. PHASCUM acaule, foliis ovatis muticis concavis conniventibus. *Schreber de Phaſco*

Digitized by Google

obſſ. p. 8. *tab. I. fig.* 11, 12., *Spicileg. flor. Lipſ. p.* 72. *n.* 779., *Weber Spicil. flor. Götting. p.* 126. *n.* 195.
Phascum acaulon β. *Linn. Syſt. pl. v. IV. p.* 450, *Hudſon Fl. Angl. p.* 396, *Weis Pl. cryptogam. floræ Götting. p.* 267.
Dillen. Hiſt. musc. XXXII. 12.

By het vorige, en by het Phascum acaulon.

Linnæus pro varietate habuit ſui Phaſci acauli. Diſtinxerunt vero Dillenium ſecuti, Schreberus, Weberus, Hedwigius. Hactenus Linnæi magis placeret ſententia; quod enim Ph. muticum ſit acaule, cuspidatum vero (i. e. acaulon Linn.) caulescat, non ſufficere videtur ut diſtinguantur; ſæpe enim eodem modo ſpecimina occurrunt Phaſci ſubulati vere acaulia, quæ tamen nemo ad diſtinctam ſpeciem retulerit. Sed ipſe cl. Schreberus agnoſcit: „ Phascum ſubulatum & cuspidatum „ pro varietate ſoli natalis, magnitu„ dine & habitu admodum variare, ita ut ſæ„ pius novas ſpecies mentiantur ". Vid. *Obſſ. cit. p.* 9.

65. Phascum caulescens, foliis oblongis piliferis erectis. *Schreb. de Phasco p.* 8. *tab. I. f.* 6. 7., *Spicil. p.* 74. *n.* 1029. *piliferum.*

Op eenige muren te Nykerk *op de* Veluwe.

Hæc a reliquis omnino diſtincta videtur ſpecies.

66. Buxbaumia aphylla, pedunculo elongato. *Syſt. veg.* 1188. 1. *aphylla.*

Primum legi rariorem hunc muſcum Aprili 1786, *in het* Puttenſche *boſch op de* Veluwe.

urnigerum. 67. POLYTRICHUM caule ramoſiſſimo, pedunculis axillaribus. *Syſt. veg.* 1192. 4.

By Elmerink *niet verre van* Deventer (Ehrhart).

fontanum. 68. MNIUM (caule ramoſo, capſulis ſubrotundis obliquis). *Syſt. veg.* 1193. 4.

By Harderwyk *aan de oorſprong van de hoge Sypel, en by* Arnhem *aan het begin van kleine beekjes.*

Pedunculi radicales perichætio manifeſto ſquamoſo, (quod etiam Dillenius *Hiſt. muſc. tab.* XLIV. *f.* 2. *d. e. f.* delineat), cincti ſunt. Raro caulis vere ſimplex cernitur, neque in omnibus geniculis inflexus.

paluſtre. 69. MNIUM caule dichotomo, foliis ſubulatis. *Syſt. veg.* 1193. 5.

Tusſchen Heemſe *en de* kleine Haar *in* Overysſel (Ehrhart).

annotinum. 70. MNIUM foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedunculis ſubradicalibus, antheris nutantibus. *Syſt. veg.* 1193. 10.

By Harderwyk *aan den kant van ſlooten, en op vogtige plaatſen in de boſſchen.*

Digitized by Google

71. MNIUM calyptra villoſa. *Syſt. veg.* 1193. 16. *polytrichoides.*

α. capſulis ſubrotundis, foliis integerrimis.

In het Puttenſche *boſch.*
In de boſſchen by het Loo (Ehrhart).

β. capſulis ſubcylindricis, foliis ſerrulatis.

In de boſſchen by het Loo (Ehrhart).

Merito has varietates Linnæanas plurimi hodie ſpecie diſtinguunt, & Polytrichi generi utràmque inſerunt.

72. HYPNUM ſurculis vagis erectiuſculis, foliis ſecundis recurvatis. *Syſt. veg.* 1195. 11. *rugoſum.*

Habitat in Hollandia (Linnæus *Syſt. plant. t. IV. p.* 485).

73. HYPNUM ſurculis ſubproliferis plano pinnatis, cuſpidatis, pedunculis aggregatis. *Syſt. veg.* 1195. 18. *delicatulum.*

In de boſſchen by het Loo (Ehrhart).

74. HYPNUM ſurculis vagis teretibus, foliis ovatis acutis patulis. *Syſt. veg.* 1195. 35. *curtipendulum.*

By de voorgaande (Ehrhart).

75. HYPNUM ſurculis vagis ramoſiſſimis, ramis filiformibus, antheris obliquis. *Syſt. veg.* 1195. 37. *filifolium.*

Digitized by Google

Boerhaavius indigenam eſſe notavit (*Ind. alt. horti Lugd. B. p.* 22. *n.* 42.).

muticum. *76. HYPNUM (*compreſſum*) ſurculis plano pinnatis, ramulis ſimplicibus proliferisque, pedunculis bipollices adæquantibus. *Necker Deliciæ Gallobelg. ſylv. t. II. p.* 477.

Hypnum cuſpidatum β. inerme. *Weis Plant. cryptog. fl. Götting. p.* 253., *Weber Spicil. fl. Gött. p.* 59.

Hypnum purum β. *Pollich. Plant. Palat. t. III. n.* 1044.

Hypnum (*compreſſum*) ſurculo erecto ramoſo, ramis baſi ſetiferis planis recurviusculis ſtipite triplo brevioribus. *Neck. Method. p.* 159.

Hypnum (*compreſſum*) ramis apice attenuatis, foliis ovato lanceolatis, ſetis elongatis, capſulis inclinatis, operculo conico. *Schreb. Spicil. p.* 96.

Hypnum ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis, ſetis prælongis, *capſula* craſſa, operculo conico. *Haller Helv. n.* 1742.

Hypnum cupreſſiforme tenuius & compreſſius. *Dillen. Muſc.* XL. 47.

Muſcus erectus, foliis anguſtis, caulibus appreſſis. *Vaillant Bot. Pariſ. p.* 139. *tab.* 29. *f.* 10. (opt.)

By Harderwyk *in de Zandſteeg, het Klaver-boſch en elders.*

Indigena etiam dicta planta a Boerhaavio. (*d. l. p.* 20. *n.* 10.)

Nomen triviale *compreſſi* minus convenit, quam

ſic facile cum H. compreſſo Linnæano confundatur.

*77. Hypnum ſurculis ramoſiſſimis, ramis teretibus ſubulatis, capſulis erectis. *Necker Delic. p.* 475. *viviparum.*

Hypnum (*myurum*) ſurculo multifloro, ſuperne præprimis ramoſo, ramis recurvis rigidiuſculis, foliis ovatis acuminatis, capſulis lanceolatis erectis. *Pollich Palat. n.* 1054.

Hypnum myoſuroides γ. *craſſius. Weber Spicil. p.* 94.

Hypnum foliis ovato lanceolatis, ramis teretibus compreſſis. *Haller Helv. n.* 1754.

Hypnum myoſuroides craſſius, capſulis erectis *Dillen. Muſc.* XLI. 50.

Muſcus denticulatus minor noſtras ſericeus, capitulis Adianthi. *Vaill. Bot. tab.* 28. *f.* 4.

Aan de bomen op het Loo, *en aan zee-kant tusſchen* Harderwyk *en* Doornſpyk (Ehrhart).

Diſtinguunt Dillenius, Hallerus, Pollichius, Neckerus. Huic tamen aliter dein viſum eſt, dixitque varietatem ſpeciei affinem Hypni myoſuroidis. Vid. *Method. muſc. p.* 183.

*78. Hypnum ſurculis vagis procumbentibus, foliis ovatis lanceolatis ſubulatis ſtriatis, capſulis obliquis. *Hudſon Flor. Angl. p.* 421., *Schreber Spicil. p.* 98. *luteſcens.*

Hypnum (*ramoſum*) ſurculis ramisque ſparſis, foliis ovatis obtuſis, antheris ſubcernuis. *Neck. Delic. p.* 484.
Hypnum ſericeum β. *prælongum. Weis Cryptog. p.* 255.
Hypnum ſtrigoſum β. *ramoſum. Neck. Method. p.* 180.
Hypnum myoſuroides δ. *prælongum. Weber Spicil. p.* 94.
Hypnum caulibus teretibus, foliis pilo terminatis, capſulis obliquis ariſtatis. *Haller Helv. n.* 1753.
Hypnum ſericeum, ſurculis longioribus & rectioribus, capſulis incurvis. *Dillen. Muſ.* XLII. 60.

By de voorgaande (Ehrhart).
Aan de bomen in de Haarlemmer Hout.

nitens. *79. HYPNUM ramis breviſſimis, foliis lanceolatis ſubulatis nitentibus. *Linn. fil. Meth. muſc. p.* 34., *Syſt. veg.* 1195. 50.
Hypnum (*trichodes*) ramis erectiusculis approximatis apice ſetiferis. *Necker Delic. p.* 483.
Hypnum (*trichodes*) ſurculo erecto, ramis approximatis, ſeta terminatis, foliis lanceolatis ſtriatis, capitulis erectis. *Necker Meth. p.* 161.
Hypnum (*nitens*) ſurculis erectis, ramulis breviſſimis, foliis lanceolatis appreſſis ſtriatis, perichætiis longiſſimis, capſulis obliquis. *Schreber Spicil. p.* 92., *Weber Spicil. p.* 86.

Hypnum ramis compreſſis, foliis pilo ariſtatis nitentibus, capſulis erectis, operculis conicis. *Haller Helv. n.* 1784.

Hypnum paluſtre trichoides, ramulis crebris luteo & ruſo virentibus glabris. *Dillen. Muſc.* XXXIX. 37.

Aan de zee-kant tuſſchen Harderwyk *en* Doornſpyk (Ehrhart).

A L G Æ.

80. JUNGERMANNIA frondibus ſimpliciter pinnatis (baſi & medio floriferis), foliolis planis nudis (ovatis). *Syſt. veg.* 1196. 3. *viticuloſa.*

Op vogtige beſchaduwde plaatſen, onder andere moſſen, in het Puttenſche *boſch op de* Veluwe.

81. JUNGERMANNIA frondibus ſimpliciter pinnatis lanceolatis, apice floriferis, foliolis integerrimis. *Syſt. veg.* 1195. 5. *lanceolata.*

Aan de Vecht *by* Heemze (Ehrhart).

82. JUNGERMANNIA frondibus ſimpliciter pinnatis, apice floriferis; foliolis bidentatis. *Syſt. veg.* 1196. 6. *bidentata.*

By de voorgaande (Ehrhart).
By Harderwyk *aan de wallen der wegen, aan het eind van de hoge Sypel, op het Heerepad, en elders.*

Digitized by Google

bicuſpidata. 83. JUNGERMANNIA frondibus ſimpliciter pinnatis, medio floriferis, foliolis bidentatis. *Syſt. veg.* 1196. 7.

By de vorigen (Ehrhart).

Huc pertinere videtur *Hall. Hiſt. ſtirp. Helv. n.* 1865.

quinquedentata. 84. JUNGERMANNIA frondibus pinnatis ramoſis, apice floriferis, foliolis quinquedentatis *Syſt. veg.* 1196. 8.

By de vorigen (Ehrhart).
In het Puttenſche *boſch, aan de wortels van boomen.*

Cl. Necker recte ad hanc ſpeciem retulit ſynon. *Halleri Helv. n.* 1866, invito tamen Webero; Hallerus enim, nec male, ut videtur, Jungermanniam quinquedentatam & trilobatam conjunxit.

undulata. 85. JUNGERMANNIA frondibus ſupra bipinnatis, apice floriferis, foliolis ſubrotundis integerrimis undulatis. *Syſt. veg.* 1196. 9.

By de vorigen (Ehrhart).

nemoroſa. 86. JUNGERMANNIA frondibus ſupra bipinnatis, apice floriferis, foliolis ciliatis. *Syſt. veg.* 1196. 18.

Op de heide, en in de boſſchen op beſchaduwde plaatſen, by Harderwyk.

Granula illa rubra, caliculo terminali quaſi inclu-

ſa, Webero obſervata, etiam mihi ſæpius videre contigit.

87. JUNGERMANNIA frondibus ſupra bipinnatis, foliolis crenulatis imbricatis rotundis. *Syſt. veg.* 1196. 11. *reſupinata.*

In het Elſpeeter *bosch op de* Veluwe.

88. JUNGERMANNIA frondibus ſubtus bipinnatis, foliolis quadratis obſolete trilobis. *Syſt. veg.* 1196. 13 *trilobata.*

In het Puttenſche *bosch; en aan het Heerepad by* Harderwyk.

*89. JUNGERMANNIA ſurculis erectiusculis confertis, foliis ovatis imbricatis ſubbifidis ciliatis. *Linn. fil. Method. muſc. p.* 35., *Syſt. veg.* 1196. 23. *pulcherrima.*

Jungermannia pulcherrima. *Weber Spicil. p.* 150., *Dickſon Faſcic. plantar. cryptog. Brittann. p.* 7.

Jungermannia (*ciliaris*) ſurculis repentibus, foliolis duplicato imbricatis, inferne auriculatis ciliatis? *Linn. Flor. Suec. n.* 1044., *Spec. plant. t. II. p.* 1601., *Pollich Palat. n.* 1073., *Leers Flor. Herb. n.* 907.

Jungermannia (*ciliaris*) ſurculis repentibus pinnatis impubibus, foliis bifidis punctatis ciliatis, ſtipulis nullis, amphigaſtriis bifidis ciliatis, periſphæriis punctatis nudis. *Ehrhart Hann. mag. d. l., & Beitr. z. naturk. II th. ſ.* 149.

Lichenaſtrum ſcorpioides pulchrum villoſum. *Dillen. Muſc.* LXIX. 3.

By Heemze *aan de Vecht* (Ehrhart).

Non confundenda cum Jungerm. ciliari Linn. & Gorteri (*Flor.* VII *prov. n.* 932.), quam Ehrhartus d. l., neſcio quare, vocat Jungerm. Tomentellam.

pinguis. 90. JUNGERMANNIA acaulis, fronde oblonga ſinuata pingui. *Syſt. veg.* 1196. 30.

Op vogtige lage plaatſen van heide-velden, als aan het eind van de hoge Sypel by Harderwyk.

Blaſiæ affinis.

cruciata. 91. MARCHANTIA calyce communi quadripartito, laciniis tubuloſis. *Syſt. veg.* 1198. 3.

„ In Belgio, juxta foſſam Lugdunenſem, intra primum lapidem ab urbe (Harlemo), vidi." Linnæus *Hort. Cliff. p.* 477.

puſilla. 92. BLASIA. *Syſt. veg.* 1199. 1.

Aan het eind van de hoge Sypel, voor aan de Elſpeeter *weg, aan het eind van de Zandſteeg, en op diergelyke vogtige plaatſen by* Harderwyk.

cryſtallina. 93. RICCIA frondibus ſuperficie papilloſis. *Syſt. veg.* 1200. 1.

Digitized by Google

By Harderwyk *aan het eind van de hoge Sypel.*

94. RICCIA frondibus glabris canaliculatis bilobis obtuſis. *Syſt. veg.* 1200. 2. *glauca.*

By de voorgaande, ook op braakliggende bouwlanden aan den Enck en de Zandſteeg, by Harderwyk.

95. RICCIA frondibus obcordatis ciliatis. *Syſt. veg.* 1200. 3. *natans.*

In de ſlooten onder het kroos (Lemna) *by* Elburg.

96. ANTHOCEROS frondibus indiviſis ſinuatis punctatis. *Syſt. veg.* 1201. 1. *punctatus.*

Niet zeldzaam by Harderwyk, *op dezelfde plaatſen als de* Riccia cryſtallina *en* glauca.

97. LICHEN leproſus viridis, margine tuberculisque atris. *Syſt. veg.* 1202. 3. *atrovirens.*

Op de ſteenen langs de zee-dyk by Nykerk *op de* Veluwe.

98. LICHEN leproſo farinaceus, peltis ſtipitatis ſubgloboſis. *Syſt. veg.* 1202. 4. *byſſoides.*

Tuſſchen Zwolle *en de* kleine Haar (Ehrhart).

Non differre ab hac ſpecie videtur Lichen fungi-

formis Scopolii, *Fl. Carn. n.* 1864. & *weberi*, *Spicil. p.* 896.

pertuſus. 99. LICHEN leproſus, verrucis ſubteſſelatis lævigatis pertuſis, poro uno alterove cylindrico. *Syſt. veg.* 1202. 7.

Vry gemeen aan de beuke- en ſommige andere bomen by Harderwyk, *het* Loo, Arnhem *en* Doreweerd.

Welgelius & Weberus hunc ad novum Sphæriæ genus retulerunt. Monuit autem jam Dillenius, hanc ſpeciem non recte ad ſuum Lichenoïdis genus referri, *Hiſt. musc. p.* 128.

atro-albus. 100. LICHEN leproſus niger, tuberculis atro alboque mixtis. *Syſt. veg.* 1202. 14.

Op keiſteenen op de heide by Doreweerd.

In noſtris certe ſpeciminibus color ater cruſtam conſtituit.

carpineus. 101. LICHEN leproſus cinereus, tuberculis albidis rugoſis. *Syſt. veg.* 1202. 19.

Aan de bomen by Harderwyk *en het* Loo (Ehrhart).

Ex his locis natalibus ſuspicor, cl. Ehrhartum hunc cum Lichene pertuſo confudiſſe, quod etiam Neckerus fecit.

corallinus. 102. LICHEN leproſus ramoſus teres faſcicula-

tus faſtigiatus confertiſſimus albus. *Syſt. veg.* 1202. 20.

Op de ſteenen langs de zee-dyk by Nykerk (Ehrhart).

*103. LICHEN leproſus, cruſta cinerea tenui, tuberculis fuſcis planis, adultioribus convexis. *Weber Spicil. p.* 188. *cinereo fuſcus.*
Lichen cruſta tenuiſſima cinerea, ſcutellis fuſcis. *Haller Helv. n.* 2069.

Aan de bomen by het Loo, *en* Oldebroek *op de* Veluwe (Ehrhart).

*104. LICHEN cruſtaceus farinaceus obſcure flaveſcens, tuberculis rubris immerſis. *ochroleucus.*
Lichen (*ochroleucus*) rugoſus obſcure flaveſcens, ſcutellis rubris planiuſculis. *Necker Method. p.* 52.
Lichen (*Hæmatomma*) cruſtaceus farinaceus palleſcente albidus, ſcutellis ſanguineis, junioribus concavis, adultioribus convexis, margine granulato craſſiuſculo, cruſtæ coloris. *Ehrhart Hannov. magaz.* 1786. *p.* 285, *Beiträge z. naturk. II. th. ſ.* 158.
Lichen (*coccineus*) cruſtaceus farinaceus ex viridi ſulphureus, tuberculis immerſis rubetrimis. *Dickſon Faſcic. plant. cryptog. Brit. p.* 8. *tab. II. f.* 1.

Huc etiam pertinere omnino videtur Lichen (*cruentus*) *Weber Spic. p.* 232. *tab.* 1.

Digitized by Google

Lichen cruſtaceus tartareus glaucus, ſcutis difformibus planis ruberrimis. *Haller Helv. n.* 2050.

Op de ſteenen aan de zee-dyk by Nykerk.

tartareus. 105. LICHEN cruſtaceus ex albo vireſcens, ſcutellis flaveſcentibus, margine albo. *Syſt. veg.* 1202. 25.

By het Loo (Ehrhart).

Parellus. 106. LICHEN cruſtaceus albus, peltis concavis obtuſis pallidis. *Syſt. veg.* 1202. 32.

Op de ſteenen langs de zee-dyk by Nykerk (Ehrhart).

ater. *107. LICHEN cruſtaceus albicans, ſcutellis rugoſis nigris, *Hudſon. Flor. Angl. p.* 445., *Schreber Spicil. p.* 132.
Lichen (*nigricans*) cruſtaceus albicans, ſcutellis atris, margine cinereo lævi. *Necker Delic. p.* 504.
Lichen *ſubfuſcus* α. *ater. Weis. Plant. cryptog. p.* 49.
Lichen cruſta glauca verrucoſa tenace. *Haller Helv. n.* 2056?
Lichenoides cruſtaceum & leproſum, ſcutellis nigricantibus majoribus & minoribus. *Dillen. Muſc.* XVIII. 15.

Op ſteenen en muren op verſcheide plaatſen, by Harderwyk *en* Nykerk.

108. LICHEN imbricatus, foliolis obſolete multifidis lævibus albidis centrifugis, ſcutellis rufo-fuſcis. *Syſt. veg.* 1202. 34. *centrifugus.*

Op de ſteenen aan de zee-dyk by Nykerk.

109. LICHEN imbricatus, foliis lobatis truncatis crenatis atroviridibus, ſcutellis concoloribus. *Syſt. veg.* 1202. 40. *criſpus.*

Op de ſteenen langs de zee by Harderwyk; *op ſommige muren te* Leyden *en* Haarlem.

*110. LICHEN imbricatus, foliolis oblongis obtuſe multifidis, ſcutellis ſubfuſcis. *Necker Delic. t.* II. *p.* 509. *orbicularis.*

Lichen (*orbicularis*) fronde germinante deformi ſcutellifera ſubrotunda, primordialibus farinoſis. *Necker Meth. p.* 88.

Lichen (*pulverulentus*) imbricatus, foliolis lobatis crenatis obtuſis viridibus polline conſperſis, ſcutellis nigris margine crenatis. *Schreber Spicil. p.* 128., *Hagen Hiſtor. Lich. p.* 66. *tab.* II. *f.* 8.

Lichen fronde cinerea profunde laciniata, rotunde lobata, ſcutellis nigris. *Haller Helv. n.* 2016.

Lichenoides glaucum orbiculare, ſegmentis latioribus, ſcutellis nigris. *Dillen. Muſc.* XXIV. 71.

Aan de wilge-bomen by Harderwyk, *en in de* Haarlemmer Hout.

Digitized by Google

Aan de bomen tuſſchen Harderwyk *en* Doornſpyk, *en tuſſchen* Utrecht *en* Amersfoort (Ehrhart).

pullus. *111. LICHEN imbricatus, foliolis nitidis lobatis, ſcutellis margine lævibus. *Necker Delic. t.* II. *p.* 510.

Lichen (*pullus*) fronde lævi ſcutellifera germinante diſtorta, primordialibus granuloſis. *Necker Meth. p.* 94.

Lichen (*pullus*) imbricatus, foliolis lobatis olivaceis, ſcutellis integerrimis. *Schreber Spicil. p.* 131.

Lichen fronde ſemipinnata rotunde lobata olivacea, ſcutellis lævibus. *Haller Helv. n.* 2013.

Lichenoides olivaceum, ſcutellis lævibus. *Dillen.* XXIV. 77.

Lichen cruſtæ modo arboribus adcreſcens pullus. *Boerh. Ind. alt. hort. L. B. part. I. p.* 16.

Boerhaavius l. c. indigenam eſſe notavit.

Acetabulum. *112. LICHEN imbricatus, foliolis obtuſis, ſcutellis folio concoloribus ſubtus rugoſis. *Necker Delic. t. II. p.* 5.

Lichen (*Acetabulum*) fronde ſuborbiculata luteo vireſcente lævi, ſcutellis folio concoloribus ſubtus rugoſis. *Necker Meth. p.* 94.

Lichenoides acetabulis cutaneis & rugoſis. *Dillen. Muſc.* XXIV. 79.

Lichen pulmonarius cinereus, ſive arboreus

Digitized by Google

e cinereo viridis. *Vaillant. Bot. Pariſ. tab.* 21. *f.* 13.

Aan de bomen tuſſchen Utrecht *en* Amersfoort, *en by* Zwol (Ehrhart).

*113. LICHEN foliaceus gelatinoſus ſubrotundus lobatus rugoſus atrovirens, ſcutellis confertis rufis. *Hudſon Fl. Angl. p.* 450., *Linn. fil. Suppl. Plant. p.* 451., *Syſt. veg.* 1202. 72. *nigrescens.*

Lichen (*criſtatus*) foliaceus gelatinoſus membranaceus lobatus, ſcutellis concavis criſtatis rubris. *Scopoli Flor. Carniol. n.* 1410.

Lichen (*Lactuca*) gelatinoſus membranaceus exasperatus convolutus atroviridis, ſcutellis rubris. *Haller. Helv. n.* 2037., *Weber Spicil. p.* 252.

Lichen pulmonarius membranaceus gelatinoſus pullus, in ſegmenta latiora diviſus, receptaculis florum exiguis obſcure rubris numeroſiſſimis, *Michel. Gen. plant. p.* 87., *Meeſe Flor. Friſ. n.* 492. †.

Lichenoides gelatinoſum membranaceum tenue nigricans. *Dillen. Muſc.* XIX. 20.

Op de baſt van ypen-bomen te Hytzum *in* Vriesland (Meeſe l. c.).

Aan verſcheide bomen, vooral ypen, by Harderwyk *en* Elburg.

*114. LICHEN foliaceus laciniatus albus, laciniis ſuberectis obtuſis piloſis, ſcutellis *tenellus.*

ſeſſilibus. *Scopoli Flor. Carn.* ed. 1. p. 110., ed. 2. n. 1406., *Hagen Hiſt. Lich.* p. 80.
Lichen *hiſpidus*. *Schreber Spicil. p.* 126.
Lichen *ciliaris β. albidus*. *Weis Plant. cryptog. p.* 63., *Necker Meth. p.* 102.
Lichen fronde profunde laciniata ſemitubuloſa ciliata. *Haller Helv. n.* 2019.
Lichenoides hiſpidum minus & tenerius, ſcutellis nigris. *Dillen. Muſc.* xx. 46.
Lichen cinereus arboreus, marginibus fimbriatis. *Vaillant. Botan. Pariſ. tab.* 20. *f.* 4. *a. b.*

By Arnhem, Harderwyk, *het* Loo, Amersfoort, Haarlem, Leyden, *en elders, op de bast van de ſleedoorn, wilg, denne en andere bomen.*

Eſt omnino ſpecies a L. ciliari diſtincta.

aphtoſus. 115. LICHEN coriaceus repens lobatus obtuſus planus, verrucis ſparſis, pelta marginali adſcendente. *Syſt. veg.* 1202. 76.

In het denne-boſch op Staverden *op de* Veluwe.

perlatus. 116. LICHEN coriaceus repens lobatus glaber, ſubtus ater, ſcutellis pedunculatis integris. *Syſt. veg.* 1202. 82.

Aan de baſt der bomen by Harderwyk, *aan de weg naar* Elburg.

Digitized by Google

*117. LICHEN foliis adſcendentibus multifido *foliaceus.* laciniatis, ſubtus niveis, ſcyphiferis, ſcyphulis conicis breviſſimis. *Hudſon Flor. Angl. p.* 457.
Lichen qui Muſcofungus terreſtris minor crispus &c. *Moriſoni. Boerh. Ind. p.* 17. *n.* 18.

Boerhaavius d. l. indigenam eſſe ſignificat.

118. LICHEN fruticuloſus ſolidus, tectus folio- *paſchalis.* lis cruſtaceis. *Syſt. veg.* 1202. 111.

Op hoge ſchrale heide-velden van de Veluwe, *by* Harderwyk, Elſpeet, *en* Putten.
Tusſchen Zwol *en de* kleine Haar (Ehrhart).

*119. LICHEN fruticuloſus ramoſus nudus, cau- *ſpinoſus.* le retrorſum aculeato, ramulis acutis tuberculatisque. *Necker Delic. p.* 521., *Hagen Hiſt. p.* 126. *tab.* 2. *f.* 11.
Lichen (*ſpinoſus*) fronde tereti ramoſa retrorſum aculeata, ramulis acutis tuberculatisque. *Necker Meth. p.* 64.
Lichen (*ſpinoſus*) fruticuloſus tubuloſus ramoſiſſimus ſpinòſus, ramulis tuberculatis ſubdigitatis. *Oeder Enum. plant. flor. Dan. p.* 29., *Hudſon Fl. Angl. p.* 459.
Lichen fruticoſus vage ramoſus folioſus, extremis ramis palmatis fungiferis. *Haller Helv. n.* 1952.
Coralloides ſparſum, caulibus tortuoſis & ſpinoſis. *Dillen. Muſc.* XVI. 25.

Op eenige riet-daken in Veldwyk *by* Harderwyk.

aculeatus. *120. LICHEN foliaceus diffuſus compreſſus ramoſiſſimus, ramulis furcatis ſpinuloſis. *Schreber Spicil. p.* 125., *Weber Spicil. p.* 207.

Lichen fruticoſus durus caſtaneus, ſurculis ſpinoſis. *Haller. Helv. n.* 1965.

Coralloides fruticuli ſpecie fuscum ſpinoſum. *Dillen. Musc.* XVII. 31.

Coralloides &c. *Boerh. Ind. t. I. p.* 19. *n.* 4.

Op de heide by Harderwyk, *en op de duinen by* Haarlem.

Boerhaavius d. l. *indigenam eſſe ſignificavit.*

Papillaria. *121. LICHEN fruticuloſus fiſtuloſus aphyllus albidus, ramis pauciſſimis *obtuſis* breviſſimis, tuberculis terminalibus carneis. *Ehrhart Hannov. magaz.* 1783. *ſ.* 218, *Beiträge II. b. ſ.* 105., *Dickſon. Faſcic. p.* 13.

Lichen *fragilis α. minimus. Weber Spicil. p.* 206.

Lichen caule fruticoſo ramoſo erecto denſiſſime cæſpitoſo. *Hall. Helv. n.* 1962.

Coralloides minimum fragile madreporæ inſtar naſcens. *Dillen. Musc.* XVI. 28.

Op de heide by Voorthuizen *aan den weg naar* Appeldoorn (Ehrhart.)

Digitized by Google

*122. Lichen fruticuloſus ramoſus tubuloſus, ramis erectis furcatis. *Hudſon Flor. p.* 458., *Oeder Enum. p.* 29. *furcatus.*

Lichen caule fruticoſo ſubfolioſo, ramis adſcendentibus repetito bifurcatis punctiferis. *Haller Helv. n.* 1954.

Dillen. Muſc. XVI. 27.

Op de heide by Harderwyk.

In Vriesland (Meeſe *Flor. Friſ. n.* 502 † *α.*).

*123. Valsa (*corticalis*). *Scopoli Flor. Carn. n.* 1416. *corticalis.*

Lichen - Agaricus ceſpitoſus acaulis nigricans, ſub cute Anagyridis non fœtidæ erumpens. *Michel. Gen. p.* 105. *tab.* 54. *f.* 5., *Meeſe Flor. Friſ. n.* 477., *Gorter Flor.* VII *prov.*, *plant. dub. n.* 1081.

Aan de ſtammen van zware eſchen-bomen in Vriesland (Meeſe l. c.).

Lichenoides tuberculoſum compreſſum nigrum, lignis putridis adnaſcens, Dillenii, quod huc refert Scopolius, potius ad Lycoperdon varioloſum Linn. pertinere videtur.

124. Tremella erecta plana, margine criſpo lacinulato. *Syſt. veg.* 1204. 5. *lichenoides.*

Onder andere moſſen op de vogtige heide-velden van de Veluwe.

Indigenam eſſe quoque notavit Boerhaavius *Ind. hort. Lugdb. t. I. p.* 17. *n.* 19.

loreus. 125. FUCUS fronde filiformi compreſſa dichotoma undique utrinque tuberculata. *Syſt. veg.* 1205. 20.

Aan het zee-ſtrand by de Helder, Katwyk *en* Scheveningen.

digitatus. 126. FUCUS fronde palmata, foliolis enſiformibus, ſtirpe tereti. *Syſt. veg.* 1205. 37.

Aan het zee-ſtrand by Roptazyl *in* Vriesland (Meeſe *Beſchryving en afbeelding ding van eene zonderlinge zee-plant* &c. gevoegd agter de *Opheldering van de* xix *claſſe van de* Genera plantarum *van* Linnæus).

umbilicalis. 127. ULVA plana orbicularis ſeſſilis peltata coriacea. *Syſt. veg.* 1206. 2.

Aan het zee-ſtrand by de Helder.

reticulata. 828. CONFERVA filamentis reticulato coadunatis. *Syſt. veg.* 1207. 11.

By Harderwyk *in de Wei-beek, en te* Velp *in de graft van de Pastory.*

gelatinoſa. 129. CONFERVA filis ramoſis moniliformibus, articulis globoſis gelatinoſis. *Syſt. veg.* 1207. 13.

Aan houte palen in de Hierder-*beek op den* Esſenburg *by* Harderwyk.

Digitized by Google

Recte aſſeruit cl. Weis, hanc plantam male ad genus Conſervæ a Linnæo relatam eſſe. Sed neque præcedens, neque variæ ſpecies aliæ, uno eodemque Conſervæ genere contineri commode queunt.

130. BYSSUS pulverulenta cinerea rupes operiens. *Syſt. veg.* 1208. 9. *ſaxatilis.*

Veel aan oude ſteenen en muren.

F U N G I.

131. AGARICUS ſtipitatus, pileo plano carneo lacteſcente, lamellis rufis, ſtipite longo carneo. *Syſt. veg.* 1209. 7. *lactifluus.*

In de boſchen by Harderwyk.

*132. AGARICUS pileo fuſco murino ſpadiceo cinereo, verrucis & lamellis albis, annulo magno, tubere craſſo. *Scopoli Flor. Carn. tom. II. n.* 1461. *puſtulatus.*
Agaricus cauleſcens, pileo convexo cinereo, verrucis lamelliſque albis, ſtipite baſi craſſiuſculo. *Linn. Flor. Suec. n.* 1236.
Amanita petiolo procero fiſtuloſo annulato, pileolo plano ſtriato verrucoſo ſordido, lamellis albis. *Haller. Helv. n.* 2397.
Agaricus *&c. Schaeffer Fung. tab.* 90.
Agaricus ampliſſima volva exceptus, pileolo plano ſpadiceo verrucoſo in margine ſtriato, lamellis candidis, petiolo an-

nulato & fiſtuloſo, radice tuberoſa. *Gleditsch Fung. p.* 85. *c.*
Fungus puſtulatus. *Sterbeek Campernoeillen p.* 206. *tab.* 20. *k.*

By Harderwyk *en* Putten *in de boſchen.*

luteus. 133. BOLETUS ſtipitatus, pileo pulvinato ſubviſcido, poris rotundatis convexis flaviſſimis, ſtipite albo. *Syſt. veg.* 1210. 16.

Op verſcheidene plaatſen in de boſchen by Harderwyk.

bovinus. 134. BOLETUS ſtipitatus, pileo glabro pulvinato marginato, poris compoſitis acutis, porulis angulatis brevioribus. *Syſt. veg.* 1210. 17.

By de voorgaande, doch menigvuldiger.

Plures hujus apud nos occurrunt varietates.

imbricatum. 135. HYDNUM acaule arcuato rugoſum tomentoſum. *Syſt. veg.* 1112. 6.

Aan neergehouwene boomen, te Putten *op de* Veluwe.
In ons land groeiende gevonden (Houttuyn Natuurl. hiſt. II deel XIV ſt. bl. 634.)

pineti. 136. HELVELLA acaulis. *Syſt. veg.* 1214. 2.

In het boſch van Vanenburg *op de* Veluwe.

Digitized by Google

137. CLAVARIA clavæformis ſimpliciſſima. *Syſt. veg.* 1216. 1. *piſtillaris.*

Aan het eind van de hoge Sypel, en op de agterſte Stads-weide by Harderwyk.

138. CLAVARIA clavata integerrima compreſſa obtuſa. *Syſt. veg.* 1216. 5. *ophiogloſſoides.*

Aan het eind van de Zandſteeg, en op andere vogtige plaatſen, op de heide by Harderwyk.

139. LYCOPERDON paraſiticum ſubrotundum truncatum. *Syſt. veg.* 1217. 14. *truncatum.*

In de boſchen van het Loo (Ehrhart).

* * *
* *
*

PLANTÆ DUBIÆ, QUARUMQUE HABITATIO IN BELGIO INCERTA VIDETUR.

fruticoſa. 140. SALICORNIA caule erecto fruticoſo. *Syſt. veg.* 10. 2.

Inter indigenas Belgii ſtirpes numeratur a Linnæo (*Flora Belgica in Amœn. acad. vol.* VI. *p.* 44.). Vix tamen crediderim, plantam hyemes noſtras ægre ferentem, in patria noſtra vere indigenam reperiri.

latifolia. 141. VERONICA racemis lateralibus, foliis cordatis rugoſis dentatis, caule ſtricto. *Syſt. veg.* 25. 30.

Op het kerk-hof te Donjum, *en in moes-hoven tusſchen de vruchten, ook op akkers met bomen beplant in kweekeryen* (Meeſe *Flor. Friſ. n.* 12.).

Videtur vir induſtrius hanc cum Veronica Chamædry confudiſſe. Planta enim, hucdum non niſi in Helvetia, Auſtria & Bithynia viſa, vix adeo vulgaris in Friſia eſſe poteſt.

142. GRAMEN paniculatum alpinum latifolium, panicula miliacea ſparſa. *Scheuchzer Agroſtogr. p.* 134.
Milium *confertum. Linn.*

„ Cum hoc conferri meretur gramen, quod

„ menſe majo copioſe creſcit in nemore Ha-
„ gæ Comitum adjacente," Scheuchzer l. c.

143. LONICERA floribus verticillatis terminalibus ſeſſilibus, foliis ſummis connato perfoliatis. *Syſt. veg.* 233. 8. *Ccaprifolium.*

In Vriesland, *op veele plaatſen in de Wouden in boſchen en wildernisſen* (Meeſe *Flor. Friſ. n.* 96).

Loniceram Periclymenum intellexiſſe videtur Meeſius.

144. ERICA antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtigmate exſerto peltato, foliis ternis. *Syſt. veg.* 484. 14. *ſcoparia.*

Linnæus inter ſtirpes Belgii noſtri indigenas recenſet (*Flora Belgica, Amœn. acad. l. c. p.* 52). **Sed videtur E. Tetralicem voluiſſe.**

145. RANUNCULUS (*Philonotis*) radice faſciculata, herba piloſa, caule erecto ramoſo, foliis ternatis, foliolis trilobis, lobis crenato inciſis, apicibus puncto albo terminatis, pedunculis ſulcatis, calyce reflexo, fructu globoſo, ſeminibus compresſis acuminatis. *Ehrhart Hannov. Magaz.* 1783. *ſ.* 270.

Aan zee-kant tuſſchen Harderwyk *en* Doornſpyk (Ehrhart). **Quo tamen loco ipſe non**

alias Ranunculi ſpecies, præter repentem, acrem & ſceleratum inveni.

Ranunculus Sardous Crantzii, quem huc refert Ehrhartus, alia planta eſſe videtur.

146. ORCHIS batavica ſexta. *Cluſius Rarior. plant. hiſt. p.* 268.

„ Rara inventu creſcit in marinis aggeribus —; interdum etiam reperitur circa Hagam Hollandiæ " (Cluſius l. c.).

147. CAREX ſpicis femineis pedunculatis laxis, maſculina erecta, fulcris petiolorum aphyllis ſpathæformibus. *Linn. Hort. Cliff. p.* 439. *n.* 7.

Creſcit in nemoribus Belgii rarius (Linn. l. c.).

Ceterach. 148. ASPLENIUM frondibus pinnatifidis, lobis alternis confluentibus obtuſis. *Syſt. veg.* 1178. 9.

Indigenam ſignificavit Boerhaavius (*Ind. alt. t. I. p.* 25.). Vix autem veriſimile, filicem hanc, quæ ob frigoris impatientiam in hybernaculis noſtris aſſervari ſolet, ſponte in Belgio creſcere.

149. LICHEN, qui muſco-fungus lichenoides arborum hybernicus ſcutellatus Moriſoni. *Boerh. Ind. alt. t. I. p.* 17. *n.* 20†.

Digitized by Google

Huc pertinet *Dillen. Muſc. xxv.* 98, qui eſt *Haller Helv. n.* 2002.

Boerhaavius d. l. indigenam eſſe ſignificat.

150. Lichen fruticuloſus ſolidus aphyllus ſubramoſus, tuberculis alternis. *Syſt. veg.* 1202. 115. *Roccella.*

Coralloides n. 3†. *Boerh. Ind. alt. n.* 3. *p.* 19.

Ex inſulis Archipelagi & Canariis ad uſus tinctorios afferri ſolet. Boerhaavius d. l. Belgii etiam indigenam eſſe notat; de quo tamen vehementer dubitaverim. Pluresque alias ſtirpes, gramina imprimis & cryptogamicas pro indigenis idem vir ſummus recenſet, quas vix credas revera in Belgio noſtro reperiri. Videtur autem Boerhaavius ſtirpium exoticarum notitia multo magis imbutus fuiſſe, quam minimarum & difficilioris indaginis indigenarum; (qua de re conferri merentur, quæ Hallerus in *præf.* ad *Agroſtographiam Scheuchzerianam* de litterario quodam inter Boerhaavium & Scheuchzerum duello narrat); quod quidem, quum etiam hodie, poſt illuſtratas, a Scheuchzero Graminum, a Dillenio Muſcorum & Algarum, familias, de multis botanicis nimis verum ſit, Boerhaavio ſane, eximiis his ſubſidiis plane deſtituto, & maximo in reliquis viro, quivis facile condonaverit.

* * *

* *

*

Digitized by Google

VARIETATES IN FLORA VII PROVINCIARUM NON RECENSITÆ.

ERICA *vulgaris*, corollis albis.
Hier en daar op de heide-velden by Harderwyk.

SAPONARIA *officinalis*, floribus plenis.
In den Enck by Harderwyk.

ANEMONE *nemoroſa*, flore ex purpura rubente. *Boerh. Ind. alt. t. I. p.* 36. *n.* 2.
In het Haagſche *boſch* (Boerhaave l. c.).

ANEMONE *nemoroſa*, flore pallide purpuraſcente. *Boerh. l. c.*
Op dezelfde plaats (Boerhaave).

ANEMONE *nemoroſa*, flore pallide virideſcente. *Boerh. l. c.*
By de voorgaande (Boerhaave).

GLECOMA *hederacea*, antheris in tubo floris ſeſſilibus.
Gemeen in het begin van het voorjaar by Harderwyk.

Talia ſpecimina unice conſpexiſſe videntur ill. Hallerus, quum inter characteres Glecomæ ponat: „ Stamina breviſſima in tubo floris latentia " (*Hiſt. ſtirp. Helv. n.* 245.); & forte Scopolius, dum antherarum

ſtum cruciformem, ſatis cæterum manifeſtum, plane neget (*Flor. Carniol. t. I. n.* 730.). Tales quoque flores fefelliſſe Retzium videntur, dum dicat, Glecomam hederaceam primo vere plerumque deſtitui floribus maſculinis (Vid. *Comm. Lipſ. de rebus &c. t. xxiv. p.* 675.). Quum autem tales flores quaſi-feminei primo tantum vere maxime frequentes obſerventur, haud alienum videtur ſtatuere, providam naturam ideo antheras in tubum corollæ recondidiſſe, ut, hac ratione, tenella illa generationis inſtrumenta adverſus aëris inclementiam defenderet.

THYMUS *Serpillum*, anguſtifolium glabrum, *Linn. varietas* ζ.
Op de heide-velden by Harderwyk.

PRUNELLA *vulgaris*, corollis albis.
Op Doreweerd.

PRUNELLA *vulgaris (grandiflora)*, coerulea, magno flore. *Syſt. veg.* 735. 1α.
In den Enck by Harderwyk.

Hallerus & Pollichius pro diſtincta ſpecie deſcribunt. Videtur autem varietas tantum eſſe Prunellæ vulgaris; quamvis tamen ab hac, eodem forte jure, diſtingui poſſet, ac P. laciniata, quam ipſe Linnæus ex vulgari ortam dicit.

PEDICULARIS *ſylvatica*, corollis albis.
Op de Gagel-kampen by Emaus *buiten* Harderwyk.

CARDAMINE *pratenſis*, floribus plenis.
Op vogtige weilanden aan de zee by Harderwyk.

Digitized by Google

ANTIRRHINUM *Linaria*, floribus inferioribus perfectis, ſuperioribus monſtroſis Peloriæ.

Op een bouwland aan den Enck by Harderwyk, *en aan den weg even buiten* Naarden.

Flores, in pleriſque mihi viſis ſpeciminibus, 4 vel 5 ſuperiores in Peloriam degeneraverant, reliquis Linariæ naturalibus; in nonnullis unicus tantum Peloriæ flos aderat. Ergo Peloria non eſt planta hybrida.

Flores inferiores Peloriæ, ſuperiores Linariæ, vidit cl. Kraſcheninikof. Vid. *Scopoli Fundam. botan. p.* 111.

BRYUM *ſtriatum* ulophyllum, δ. *Linn.*

Weiſſia ulophylla. *Ehrhart Beiträge zur naturk.* I th. ſ. 191.

Aan de bomen by Harderwyk, Haarlem, Leyden. *en andere plaatſen.*

BRYUM *exſtinctorium* majus, β. *Linn.*

Op den Esſenburg *by* Harderwyk.

BRYUM *hypnoides* vireſcens, β. *Linn.*

Op de heide-velden by Harderwyk.

LICHEN *islandicus* anguſtifolius, β. *Linn.*

Aan het zee-ſtrand tusſchen Harderwyk *en* Doornſpyk (Ehrhart).

LICHEN *islandicus* tenuiſſimus, γ. *Linn.*

Op de heide-velden by Harderwyk.

Digitized by Google

INDEX.

A.

Agaricus lactifluus. pag. 65
pustulatus. ibid.
Aira præcox. 17
Aliſma natans. 28
Anemone nemoroſa β, γ, δ. 72
Anethum graveolens. 24
Anthoceros punctatus. 53
Antirrhinum Linaria β. 74
Aſarum europæum. 31
Aſplenium Ceterach. 70
Atropa Belladonna. 22

B.

Blaſia puſilla. 52
Bryonia *dioica*. 40
Bryum exſtinctorium β. 74
hypnoides β. ibid.
ſtriatum δ. ibid.
Buxbaumia aphylla. 43
Byſſus ſaxatilis. 65

C.

Cardamine pratenſis β. 73
Carex *ſylvatica*. 40
. . . . 70
Ceraſtium aquaticum. 30
Chryſanthemum inodorum. 39
Chryſoſplenium oppoſitifolium. 29
Conferva gelatinoſa. pag. 64
reticulata. ibid.
Convallaria multiflora. 24
Crambe maritima. 35
Cratægus *monogyna*. 32
Cuſcuta Epithymum. 21

D.

Dianthus deltoides. 29

E.

Erica multiflora. 28
ſcoparia. 69
vulgaris β. 72
Euphorbia *campeſtris*. 31

F.

Feſtuca rubra. 18
Fragaria ſterilis. 33
Fucus digitatus. 64
loreus. ibid.

G.

Galium ſaxatile. 21
Gentiana Amarella. 22
filiformis. 23
Glecoma hederacea β. 72

H.

Helvella Pineti. 66
Holoſteum umbellatum. 20

Digitized by Google

Hordeum *maritimum.* pag. 18
ſecalinum. 19
Hypericum montanum. 38
pulchrum. ibid.
Hypnum curtipendulum. 45
delicatulum. ibid.
filifolium. ibid.
luteſcens. 47
muticum. 46
nitens. 47
rugoſum. 45
viviparum. 47

I.

Inula Helenium. 39
Iſatis tinctoria. 35
Juncus *nemoroſus.* 26
Tenageia. 25
tenellus. ibid.
Jungermannia bicuſpidata. 50
bidentata. 49
lanceolata. ibid.
nemoroſa. 50
pinguis. 52
pulcherrima. 51
quinquedentata. 50
reſupinata. 51
trilobata. ibid.
undulata. 50
viticuloſa. 49

L.

Leontodon hirtum. 38
Lichen *Acetabulum.* pag. 58
aculeatus. 62
aphthoſus. 60
ater. 56
atroalbus. 54
atrovirens. 53
byſſoides. 53
carpineus. 54
centrifugus. 57
cinereofuſcus. 55
corallinus. 54
crispus. 57
foliaceus. 61
furcatus. 63
islandicus β. & γ. 74
nigreſcens. 59
ochroleucus. 55
orbicularis. 57
Papillaria. 62
Parellus. 56
paſchalis. 61
perlatus. 60
pertuſus. 54
pullus. 58
Roccella. 71
ſpinoſus. 61
tartareus. 56
tenellus. 59
. . . 70
Lonicera Caprifolium. 69

M.

Marchantia cruciata. 52

Mentha hirſuta. pag. 34
Milium confertum. 68
Mnium annotinum. 44
fontanum. ibid.
paluſtre. ibid.
polytrichoides α. & β. 45
Myagrum paniculatum. 35

O.

Ononis *ſpinoſa*. 36
Ophrys ſpiralis. 39
Orchis. 70

P.

Panicum viride. 17
Papaver dubium. 34
Pedicularis ſylvatica β. 73
Phalaris canarienſis. 16
Phaſcum *muticum*. 42
piliferum. 43
ſubulatum. 42
Piſum maritimum. 37
Poa *ſalina*. 17
Polygala amara. 36
Polygonum dumetorum. 28
Polytrichum urnigerum. 44
Potamogeton gramineum. 22
marinum. ibid.
Prunella vulgaris α. β. 73

R.

Ranunculus *Philonotis*. 69
Riccia cryſtallina. 52
Riccia glauca. pag. 53
natans. ibid.
Roſa rubiginoſa. 33
Rumex *Nemolapathum*. 27

S.

Salicornia fruticoſa. 68
Salix aurita. 41
incubacea. 42
repens. ibid.
triandra. 41
Saponaria vulgaris β. 72
Schoenus albus. 16
fuſcus. ibid.
Sedum reflexum. 30
Sium anguſtifolium. 23
Spergula pentandra. 31
Stellaria *aquatica*. 29

T.

Thymus Serpillum β. 73
Tremella lichenoides. 63
Trifolium filiforme. 37
procumbens. ibid.

U.

Ulva umbilicalis. 64

V.

Valſa corticalis. 63
Veronica latifolia. 68
verna. 15

Digitized by Google

CORRIGENDA.

Præfat. pag. xi. not. lin. 4., leg. *Phytophylacium.*

pag. 17. lin. 27. *maritima*, leg. *Jaſmin.*

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google